




E. XV. e

18

40689/A

772/10  
23/5





CASPARIS PEZOLDI  
Poliatri Vratislaviensis  
OBSERVATIONES  
MEDICO-  
CHIRUR-  
GICÆ  
SELECTIONES.

---

*VRATISLAVIÆ,*  
Prostant apud MICH. HUBERTUM.  
A. 1715.








†

PRÆFATIO  
AD  
LECTOREM.

 Uod sanitate mentis & corporis præcipua humanæ felicitatis pars contineatur, ut nemo inficiaturus est, nisi qui sanam mentem abjecerit, ita studium illud, quod tuendæ sanitati, ne lædatur, & reparandæ, si læsa fuerit, impenditur, sicuti maximo laudandum, ita ob insignissimam, quæ in genus humanum exinde redundat utilitatem, quâvis industria excolendum & perficiendum fuerit. Quia vero à sapientissimis viris deprehensum est, ad latifundium artis (quæ tam vasta & lata est, ut ipsius sapientissimi *Hippocratis* iudicio *longa* audiat, & is ipse de se confiteri

) 2 coga-



cogatur, *se quamvis senem, nondum tamen ad finem medicina pervenisse*) exhaustiendum, salutaremque artem perficiendam, nil æque magis congruum & adæquatum esse, quam, si partim præcipua, imò ex *Baglivii* sententia, *omnia etiam minima & vilia visa symptomata* accuratè describantur, partim filum curationis, & quæ vel profuisse, vel nocuisse medicus observaverat, fideliter delineantur & recenseantur. Hinc factum est, ut tot præclari viri observationibus suis medicis edendis tantum industriæ insumerint, commendaverintque sedulò, ut medici in magnâ praxi constituti, nosodochiisque præfecti fideli diligentia rem medicam amplius augerent & perficerent. Horum monitis & exemplis ego motus, quanquam tantorum virorum ingenium, eruditionem, stylique facundiam (mediocritatis quippe meæ mihi probè conscius) parum assequar, tamen credidi non sine omni fructu futurum, si observationes aliquot medico-chirurgicas in rempublicam medicam conferrem: reputans si non practicis veteranis arrideant, certè junioribus



bus & tyronibus aliquo usui futuras. Ut igitur opellæ hujus aliqua ratio constet, adnotata in iis B. L. videbit, rariora quorundam morborum phænomena, consignatas leget difficiliorum nonnullorum affectuum qua pharmacis, qua chirurgicâ manu institutas therapias, quas ut fide constanti aliquando brevius, aliquando longius enarro, ita semper nullius addictus jurare in verba magistri medicamenta quædam subinde aliis mutavi, ratus, omnia probanda esse, & ut sit amicus *Plato*, amicus *Socrates*, magis tamen cuivis debeat esse veritas. A varietate & multitudine medicamentorum abstinui, persuasus, pauca esse, quæ medicum nobilitant, sique per pauca & quidem certius scopus obtineri possit, stolidum esse, (nisi forte ægri delicato genio aliquando cedendum sit) illum per plura laboriosè quidem & cum majoribus ægrorum sumtibus, at non æque certè attingere studere. Sanè quantum momenti pro sanatione morbotum situm sit in prudenti medicamentorum continuatione, in ægris præsertim apud A. A.



R. R. F. F. Misericordiæ decumbentibus  
deprehendi. His enim sicut sub dire-  
ctione A. R. DN. P. Clementis Mengel  
Vicarii Conventus A. A. R. R. F. F. Vra-  
tislaviæ munere suo pari fide & pruden-  
tiâ fungentis, diligentiaque A. R. Dn. Fr.  
Burcardi Streubel officinæ pharmacev-  
ticæ præfecti, ac dexteritate peritiâque  
insigni pollentis A. R. Dn. Fr. Cosmæ  
Armbruster / omnia quibus ex fonte  
diætetico, pharmaceutico, & chirurgico  
egent sufficienter subministrantur &  
adhibentur, ita ab inutili, modo non no-  
xia varietate tot medicamentorum bo-  
nis ipsorum cum rebus salutariter abar-  
centur. Quo loco non possum non  
commendare, ut medici tum alii, tum  
qui ægris laudatissimi ordinis A. A.  
R. R. F. F. Misericordiæ prospiciunt,  
meum exemplum secuti, id quod ego  
parum feliciter assecutus sum, ipsi ma-  
jori ingenio, curatiorique industriâ pe-  
nitius perficiant. Sanè intimè in sinu  
gaudebo, si leviculus meus labor in-  
citamentum extiterit magnis bonisque  
viris, ut quæ suâ industriâ paraverint,  
in commodum rei medicæ elargian-  
tur.




tur. Cæterum dum sectiones morbis demortuorum non minimum quoque artem medicam promoveant, celeberrimorumque virorum vota, consilia, & conatus hâc in re passim laudanda occurrant, inprimis etiam medicos nosodochiis A. A. R. R. F. F. Misericordiæ præfectos (quod his præ aliis hæc *εὐρυχία* cadavera cum libuerit scrutandi contingat) exoratum volo, quo laboris fastidium non subterfugientes, ad vivorum utilitatem extispicia crebra morbis demortuorum instituant, quæque tunc compererint, publico non invideant. Ut stylum meum rudem multis exculpem, vix videor ratione aliqua grandi urgeri; quanquam enim non is sum, qui contemptâ elegantîâ styli unicè rebus studeam, (siquidem hæ non doceri, saltem non æquè gratè aliis tradi possunt, nisi nitore styli quasi condiantur) tamen quia ab exercitio latinæ linguæ desuefactis facile aliquid stribliginis, & quod puræ latinitati adversum sit adhærescere possit, benevoli lectoris gratiam (quâ defectus styli condonatos volo)



eò libentitius mihi promitto, quod is sine dubio mecum fatebitur, majorem debere esse curam rerum, quam verborum. Illos in fine non moror, qui naso etiam omnia sæpe suspendere adunco sueti sunt; ut enim iudice Magno *Hippocrate lib. 1. de diata §. I. immerito aliquis reprehenditur, quod invenire non potuerit, imo laudandi potius omnes sint, quod investigare conati sunt, optimus enim ejusdem judicio est medicus minimum delinquens*, ita talibus censorio typho inflatis, prurigineque taxandi laborantibus illud in calce præfationis ipsorum auribus infurratum volo, non tam dum meam tenuem opellam mordaci sua censurâ fortassis perstringent, sed quod scriptis etiam cedro auroque dignissimis parcere non desinunt

ῥᾶον μὲν μωμεῖσθαι, χαλεπὸν δὲ  
μιμεῖσθαι.





I. N. 7.

CASPARIS PEZOLDI,

POLIATRI VRATISLAVIENSIS,

OBSERVATIONES ET CV-  
RATIONES MEDICO-CHIRVR-  
GICÆ SELECTIONES.

OBSERVATIO I.

*Febris quotidiana duplex vario-  
lis innoxie juncta.*



Rigus variolis admissum fu-  
nestam iisdem *μετάστασι* or-  
dinarie causari, notius est  
quàm ut exemplis indigeat.  
Ast quod à Causâ internâ  
horroriis innoxie complice-  
tur, res est non quotidianæ observationis.  
Accidit hoc rarum phænomenum sub finem  
Decembr. A. 1692. filiolo nostratis factoris  
7. annorum, variolis cohærentibus laboranti  
impunè. Siquidem quamvis hic ipse à die  
morbi quinto ad decimum inclusivè, ita bis  
quotidiè, per quadrantem horæ statuto tempo-  
re horrore concuteretur, ut dentibus stride-

A

ret,

ret, æstuque postea corpus, & facies rubore suffunderetur, noxa tamen exinde nulla despumationis variolosæ negotio accrescebat, quin puer ac si citra hoc metuendum symptoma morbus decurrisset, feliciter variolis defungebatur. Pariter A. 1711. Mense Martio in generosi Equitis filio 8. annorum Variolis discretis laborante à primo eruptionis die per quinque ex ordine dies quotidie circa vesperam frigus, subsequo æstu deliriis interstincto per totam noctem durante, observavi. Interim itidem salutariter morbo defungebatur.

## OBSE RVATIO II.

### *Paralysis scorbutica purpurâ solutâ.*

**V**ir temperamenti sanguineo-phlegmatici, habitus carnosus, 32. annorum, in Zythopolio subterraneo illustris nostri senatus muneri suo quotidie fungens, postquam strenuum potatorem egisset, in Oenopoliis quidem vini Hungarici, in officinis verò Pharmaceuticis ∇ physogonarum aliarumq; Spirituosarum, concurrente simul voracitate iræq; non rarò æstro, initio in dolores nephriticos colicosque, ipsumque renum calculum incidebat, quos affectus deinde, prægresso prius per vices linguæ quodam torpore, die 14. April.





April. 1692. noctu subita brachii & femoris dextri ad motum impotentia cum aphoniâ primum, dein loquelâ difficiliori excipiebat. Proinde ad Diætâ prægressâ viventemque faciem respiciens post venæ sectionem in brachio sinistro celebratâ (â quâ per bihorium pessimè degebat) internè propinabam (1) Liqueur. cephalic. Wedel. (2) pulv. cachect. Wed. cinnabarin. sassaphrat. externè verò vertici, temporibus & linguæ ∇ Apoplect. Spir. sal. armoniac. & oleum spic. roboratum, sicut nuchæ, Spinæ dorsi & partibus paralyticis unguent. Nervin. c. pingv. Castor. Oleum Zetr. alb. rut. spic. succ. administrabam, eo cum effectû, ut d. 15. vitium in loquela amplius vix sentiretur, femurque flectere, eisdemque insistere valeret, licet brachium (ut semper solet difficilius & tardius quàm femur restitui) torpidius adhuc remaneret, persistente etiam circa frontem livido rubore. Igitur ut porrò tonum nervorum blandè roborarem, lymphæque novum Characterem imprimerem, Spec. pro infuso theiformi, ex rad. helen. chin. sassap. trifol. fibr. herb. rosmar. salv. meliss. majoran. flor. anth. til. stœchad. arab. ras. l. sassaf. cubeb. cardamom. cinn. costo vero, sem. coriand. ordinabam, quibus d. 17. quod in somnum pronior esset, spir. sal. armoniac. additâ essent. castor. succ. maritabam, his efficiebatur ut hodiè primum ma-

nus aliquatenus cibo ori ingerendo sufficeret, quæ prævio pruritu purpurâ per totum d. 18. erumpente multò validius moveri ipseq; æger ambulare paulò poterat. Proinde in usu dictorum, quibus essent. lignor. ultimò accedebat, pergens, plenè ægrum restitui. Interim quia inordinatam suam plenam & ebriam diætam emendare nollet, d. 4. Sept. 1693. post perceptam manè titillationem in digitis vesperi in cellâ cerevisiaria ἀφωος concidens frustrâ adhibitâ venesæctione, clysmate, aliisque congruis remediis noctis hora XI. mâ sub epilepticis motibus mortem obibat.

### OBSERVATIO III.

#### *Error Pharmacopœi puero verminosò salubris.*

**S**Olet aliquando fieri, ut ægrum, quem consilium non restituit, casus à morbo absolvat, pariter & error Pharmacopœi aliquando in salutem ægri vertitur. Commitebatur talis error Anno 1693. salutariter, cùm puero 3. annorum lumbricis, cùm siti, pruritu narium, tumore abdominis, atrophîâ, & □ sedimento albo mucido, laboranti, post frustrâ datam ℞ ♂ cydon. ℞ violar. & pulverem laxativ. vegetabilem, pulvis ex sem. fanton. ꝯj. rhabarb. corallin. ā ʒß. ʒ dulc. gr. VI. in 6. dosès dividendas eâ quantitate pro 6. præbiis



biis oscitantiâ Pharmacopœi pararetur, inde enim effectum est, ut post datas priores duas doses nimîâ mole obrutus ventriculus ad vomitum concitaretur, quatuorque ingentes lumbrici per inferius guttur excluderentur, quos frustra deinde deprehensio errore pulveribus dictis granorum viij. jam pondere datis sollicitabam, donec repetitis prioribus medicamentis, quibus arcanum  $\text{¶}$ ri. arcanum dupl.  $\nabla$  c.  $\text{¶}$  viv. decoctam sociabam, id impetrarem, ut post deturbatam fœdam saburram intra 4. septimanas 38. magni lumbrici expellerentur, ortâque postea septimanæ unius intervallo purpurâ, alacritas animo, & corpori nutritio rediret. Cernere ex hoc casu licet, nos sæpe medicamentorum sufficiente successu destitui, quod nimis parcâ dosi subinde eadem porrigimus. Sed quis medicus tam accuratam semper dosin conjecerit, ut nec nimietate ejus excedat, nec paritate deficiat. Sumus nimirum homines. conf. de erroribus in medicinâ quandoque salutaribus *Dacur. II. Miscellan. Natur. Curios. A. VII. Obs. 216.*

## OBSERVATIO IV.

### *Tertiana spasmodica.*

**Q**uantopere nonnunquam febres tertianæ ferociant, anxietates indicibiles, li-

pothymias, spasmos artuum, & epilepsiam ipsam (ne alia gravia symptomata laudemus) producendo, norunt medicinæ clinicæ operantes. Talem, & quidem vernalem, etiam sentiebat Zythopola quidam nostras A. 1694. Hic temperamento & habitu melancholico præditus tanto horrore per 2. horas de paroxysmo in paroxysmum invalescente quatiebatur, ut non solum sub illo particulam dentis demorderet, sed etiam ab uxore quamvis detentus epilepticorum more in altum jactaretur; aderant simul anxietates magnæ præcordiales, lancinationesque, imò contorsiones artuum spasmodicæ. Urinæ, ut scorbuticorum teste *Eugaleno* & experienciâ solent, variæ erant. Succurrebam quidem ægro congruis medicamentis, artusque imprimis pedilaviis ex lixivio ante paroxysmum à tortura dolorificorum spasmodorum liberabantur, interim ob variabilem vulgi genium therapiam meam tandem fastidians ægrè post 3. menses convaluit, mihi postea confessus lancinationes & spasmos artuum denuò rediisse.





## OBSERVATIO V.

*Maculae sanguineae per totum corpus efflorescentes post hæmorrhagiam subito adstrictam, eâdemque recurrente statim iterum cessantes.*

QUàm periculosè adstringentibus hæmorrhagiæ maturius sistantur, & experientia loquitur, & pluribus celeberrimus Stahlius in dissert. de adstringentium usu ostendit. Idem quoque præsens observatio declarabit. A. 1694. d. 19. Sept. piscator in pago Ult. Scheutnich / 35. an. habitus macilentus per triduum continuâ naris sinistræ hæmorrhagiâ laborabat, affectu qui non solum ipsi consuetus erat, sed quo etiam soror non raro laborabat, & pater obierat. Itaque ego V. S. in pede institutâ ob virium fatiscientiam obicem fluxui internè per R ♂ adstringentem, R ♂ cydoniato remixtam, externè verò stercore suillo succo urticæ nutrito positurus, fluxum quidem repressi, cujus tamen adstrictionem è vestigio quasi maculae rubrae sanguineae per totum corpus efflorescentes excipiebant, quæ sicut effluxum sanguinis interceptum statim sequebantur, ita quoque post paucos dies ortâ denuò hæmorrhagia subito iterum disparebant: quam recurrentem hæmorrhagiam cum eâdem methodo, propina-

A 4                      tâque



tâque insuper R. violar. reprimere conarer, non quidem successu fraudabar, ast vestigia nunc ejus legebat diarrhœa, anxietate præcordiali, doloreque hypochondrii finistri stipata. conf. similem Obs. apud *Hæchstetterum Decad. 2. Obs. 9.* In posterum verò hæmorrhagiis sedandis aliâ methodo succurri, quam sequens observatio ostendet.

## OBSERVATIO VI.

*Hæmorrhagia universalis cum maculis varii coloris.*

**H**Æmorrhagias nimias scorbuto complicari non insolens est, quas ut maculæ aliquando præcedunt, ita nonnunquam sequuntur. Consignavit harum cum maculis exempla aliquot *Lister. de scorbuta cas. 7. 8. 9. & 10. it. Borellus C. 2. Obs. 35.* Præsens tamen observatio universaliozem exhibet, cum ex omnibus ferè cataractis sanguis largius exundaverit. Vocatus d. 7. April. A. 1705. extra portam viadrinam ad filium octennem late-  
rum excoëtoris, roseo vultu, dum sanus esset, & carne densâ præditum, obstupui non solum dum audirem, quod â d. 2. April. huc usque, post cursitationem multam in aëre æstuoso, (quem ultimis diebus tempestas frigida & ventosa exceperat) dolore dorsi prævio horrorem & æstum p. n. (nisi quod sitiret) san-

sanguis quotidie per nares, os, alvum & vesicam eâ quantitate, quæ judicio Patris singulis diebus facilè mensuram implere potuisset, emanaverit, sed & quod totum corpus & artus confertissimis maculis diversæ magnitudinis & coloris ( siquidem aliæ sanguineo, aliæ puniceo, aliæ violaceo colore comparebant ) distinctum cernerem. Ob pallorem ergò viriumque debilitatam præsentem turgescenti sanguini frænum injecturus & vires roboraturus ordinabam (1) pulverem in 8. doses dividendum ex lap. ☉ ʒij. † d. corall. rub. ☉ purif. ā ʒj. quorum quamlibet dosin quovis bihorio ex ∇ plantag. dandam præcepi. (2) potionem ex ∇ plantag. ʒiij. millefol. ʒij. cinn. cyd. ʒß. conf. de hyac. diascord. Fracast. ā ʒj. fir. acet. cit. ʒß. quibus debite administratis brevi sanguis intra limites redactus, maculæ dissipatæ sanitasque restituta fuit. Conf. *Hildan. Cent. 6. Obs. 76.* qui similis licet non adeò enormis hæmorrhagiæ maculis sociatæ meminit, cui curandæ ☉ ceu principale ingrediens adhibuit, *quoniam*, ut scribit, *â præceptore suo in periculosâ hæmorrhagiâ cum magno fructu exhibitum viderit.* Legas item *Obs. 22. Vol. 1. Act. Hafniens.* ubi maculæ tales â sanguinis copia peccante & ebulliente V. S. discussæ & plethorâ per ægritudinem aliquam imminutâ non comparuisse leguntur.





## OBSERVATIO VII.

*Quartana comatosa.*

**J**Am indole suâ illud medicorum scandalum quartana scorbutum indicat, vel eundem procudit, ita ut axioma Magni Wedelii, quartana aut invenit, aut relinquit scorbutum, semper luce suâ radiet. Est tamen cum peculiariùs scorbutum symptomate aliquo singulari manifestat, talis est carus, quo comite si stipetur imprimis expertissimi de scorbutico scriptoris *Eugaleni judicio p. 58. 66. & 67.* scorbuticæ titulum mereri existimatur. Laborabattali febris A. 1994. in autumno civis quidam nostras crebrò ad aromata sua in variorum oppidorum nundinis vendenda iter inire suetus, homo aliàs strigosi & melancholici habitus, ac qui victu scorbutico ob rem satis angustam in angusta domo vitam tolerare cogebatur. Hujus quartana non solum hæmorrhagiis profusis, macularum eruptione, sudorumque valde foetentium effusione scorbuticum suum genium demonstrabat, sed imprimis etiam hoc symptomate, quod paroxysmi initium somnolentia, reliquum verò ad finem usque paroxysmorum & morbi profundus sopor occuparet, quo finiente & sudor manabat, & ipse evigilans cibos circumspiciebat; datis antiscorbuticis & libeis, antifebrili-



brilibus, purgantibus, & tandem cortice peruviano, post unum alterumque mensem, mense Januario perfectè tollebatur. Huic ægro suafum à me infusum trifol. fibrini sic emendabat sanitatem, ut lætus mihi diceret: *Es seye ihm darnach / als wäre er neu gebohren.* Observavi quidem deinceps plus vice simplici in nosodochio A. A. R. R. F. F. Misericordiæ idem symptoma penes aliquos quartanarios, non tamen soporem tam gravem per totum morbum, qualis in hoc ægro occurrebat. Cæterum de tali feбри intermittente tertianâ comatosâ funestâ legi potest *Observ. 138. Decur. 3. Miscell. Nat. Cur. A. 3.*

## OBSERVATIO VIII.

### *Catarrhus suffocativus infantis emetico sublatus.*

**G**enerosa quoque remedia infantes pueros tolerare, nec ipsa emetica in iis reformidanda esse, tum celeberrimus *Ludovici* in suâ Pharmaciâ monet, tum *Magnificus Wedelius*, cujus institutionem quondam grato animo recolo, non semel insinuavit. En hujus specimen. Filiola Zythopolæ nostratis  $\frac{3}{4}$  an. jam balneatori in nostrâ urbe maritata A. 1696. d. 3. Novembr. noctu Catarrho suffocativo corripiebatur, cum ronchis & livore faciei, vocatus post clysmâ injectum, spermaceti





ceti cū pulvere pectorali Wed. item potionem ex ▽ fœnic. Hyss. pect. Norimb. oxym. squill. & sir. nicot. corr. propino, inde cū copiosa pituita *ἀνω καὶ κάτω* cum aliquo levamine excerneretur, nox tamen sequebatur laboriosa & anxia, ob urgentissimos ronchos, quos, antequam summo mané accersitus hypocaustum intrarem, præ foribus audire poteram. Aëtiani igitur aphorismi memor, stertit infans ex pituitâ in ventriculo collectâ ob crassius alimentum, ac *Ludovicianum* monitum (quod *p. 157. Pharmacie sue* legere est) sequi certus, ♀ emet. gr.  $\frac{1}{4}$  cum spermate ceti statim infundendum curo, inde factum ut post quatuor biliosos vomitus, secutasque post meridiem aliquot alvinas dejectiones die sequenti penitus sanitati restitueretur, quam heri parentes ceu deploratam publicis ecclesiæ precibus commendaverant.

## OBSERVATIO IX.

### *Arthritis vaga rarior cum affectu febrili.*

**I**N arthritide articulos pati notum, non tamen facile occurrit ejus vim in apicem quoque nasi, auriculas, & extrema unguium diffundi. Talem ego arthritidem in fabri capillamentorum uxore 26. annorum, habitus crassi & pinguis, observavi. Hæc post 14. dierum

dierum vagas horripilationes d. 12. Nov. A. 1694. ita incaluit, ut tamen ex æstus vagæ horripilatione crebrò mutaretur, aderant statim ubivis dolores vagi, ordinariè duodecimâ horâ ☿ & ♀ ingravescentes, his non tantum artus, lumbi, pleura & plantæ pedum, sed & oculi (qui spasmus vago alternatim torquebantur) lobi aurium, nasi apex, dentes, cum sensu frigoris in vertice, mentum, imò extrema unguium lancinabantur. Durabat hæc tragædia cum anxietate præcordiali stipata per aliquot dies, licet pustulæ tam in linguâ (stupore hujus prævio) quàm reliquo corpore jam d. 15. efflorescerent, & tuberculum ad tempora sinistra elevaretur, d. tamen 17. cum urinas huc usque lateritias brunneæ instar cerevisiæ nostræ saturatioris (wie Schöpf) contentis saturatissimæ exciperent, vis morbi manifestè frangebatur, accedebant his urinis maculæ coloris miniati, sed vagæ, in utraque manu, quas in fine morbi die 18. pustulæ rubræ in dorso & natibus pilularum quasi formâ sequebantur. Cura instituta per V. S. brachio (quam ægra proprio consilio initio morbi celebraverat) pulvere bezoart. Wedel. qui aliis pulveribus ex lap. ☿ & ☿ cinnabar. laudano opiato refractâ dosi semper remixto in morbi progressu mutabatur, essent. lignor. castor. anod. His paucis medicamentis, præter diluentia domestica (à plu-



pluribus enim abhorrebat, nec facile tolerabat) dolorum plenus hic affectus plenè intra tam breve tempus tollebatur.

## OBSERVATIO X.

### *Febris maligna singultuosa curata.*

**A**Cutorum non dari certas prædictiones neque salutis, neque mortis, sapiens est oraculum Coi. Quemadmodum enim non rarò subito turbone funestorum symptomatum in lethi barathrum præcipitantur, quos imaginaria halcyonia in securo esse medico persuaserant, unde non æquè quàm in malignarum prognosi aliquando medici falli comperiuntur, non aliter ac dum blando vultu malignus deceptor circumspectissimum cautorem sæpe fallit; sic evadunt è contrario subinde naufragium, expediuntque se mortis laqueis, quos diritas symptomatum quasi necessario morti adjudicaverat. Sanè si æger periodum malignæ febris ingrediens non solum magnâ hæmorrhagiâ, sed & pertinaci singultu, vomituque assumptorum corripiatur, hunc non temerè nisi divinâ gratiâ adjutum salubrem exitum adepturum rectè quis dixerit. Et tamen evasit tam periculosum æquor è Zythopolarum tribu Vir-juvenis A. 1695. (quo ipso intra mensem Januarium, Februarium,

rium, & Martium febres petechiales epidemicè grassabantur.) Hic enim altero post invasionem die superabundanti narium hæmorrhagiâ correptus insuper quævis assumpta revomebat, crebroque singultiebat. Quamvis igitur tertio die vocatus nimiam hæmorrhagiam jam cessasse deprehenderem, restabat tamen adhuc vomitus & singultus, illoque statim sedato, hic nihilominus ad septimum usque morbi diem ferociter præcordia, imprimis circa noctem, quatiebat. Symptomata aderant non minùs mala, respiratio sublimis, anxietates, ἐκλυσις, summa virium prostratio, vigiliæ, deliria feria, motusque convulsivi artuum; ex bonis signis & quæ aliquam spem faciebant, erant sequentia, pulsus æqualis, mador cutis, & sudor per dies indices & criticos, signa coctionis in □ & tandem animus quantum memini si ullius certè hujus vitæ ut cupidissimus, sic sperabundus. Medicamentis obviam ibam variis, quæ itidem variè pro indicationum & symptomatum ratione miscebam & propinabam: sub iis erant pulv. bezoart. Wedel. stypt. Wed. c. cinnabar. & anod. pulv. epilept. March. electuar. ex pulpâ citri cond. diascord. Fracast. unic. foss. bol. arm. spec. de hyac. c. succ. cit. expr. potiones confortantes diapnoicæ variæ, R bezoart. Wedel. c. essent. castor. & anod. mixta. Externè adhibebatur cataplasma

ex



ex fermento c. nuc. mosch. menth. castor. zedoar. & † compositum, imponebantur quoque vesicatoria pro carpis, nuchâ, & femoribus. Quibus omnibus adhibitis Deo adjuvante feliciter restituebatur æger. In fine purgans non neglexi. Quod attinet ad vesicatoria, eorum efficaciam in malignis magnam sæpe deprehendi, ubi torpor naturæ adest, ægri pituitosi sunt, in ἐκλυσιν ubi propendent, vel tacitis & fixis deliriis vexantur, aut in soporem tendunt. Pariter eadem in pituitosis salutaria deprehendit minimè verò in biliosis *Borrichius Vol. 3. Aët. Hæsn. Obs. 44.* quæ *Thonerus* itidem *l. 1. Obs. 20. p. 36.* in lethargo aut sopore superveniente, neutiquam in principio vel augmento laudat: & quidni naturam ducem sequamur, quæ in malignis sæpe vesiculis protrusis morbum jugulat. Vid. *Dec. 3. Misc. Nat. Cur. A. 3. Obs. 17.* Certè. A. A. R. R. F. F. Misericordiæ in numerosis ægris eorum magnam vim experti sunt.

## OBSERVATIO XI.

*Colica spasmodica à supresso fœtore pedum.*

**S**Ecretionem congruâ partium noxiarum per varia corporis colatoria, earumque è corpore excretionem debitâ sanitatem vitamque hominis conservari, res est indubia. Ferendum

dum hinc est, si subinde molestiâ quâdam tam salubre negotium stipetur. Caveas fanè quàm studiosissimè, si serum scorbuticis salibus fœtum natura ad vilissimas partes pedes deponens illud non sine fastidioso fœtore per poros illorum exhalet. Sicut enim spontè cessans fœtor pedum podagræ adventum denunciat, sic parum prudenti consilio strigentibus abactus corpus in varia difficilia symptomata conjicit. Testis hujus rei est sequens etiam historia. Vir 44. ann. ex illorum tribu, quos nostro idiomate Zeugmacher vocamus, quondam circa mare Balthicum victu scorbutico usus, & imprimis hætenus acetariis libenter fruitus, cum pro fœtore pedum chronico tollendo, & quia ob acrimoniam sudoris à motu facilè pedes exulcerabantur, cinerem cupri adhibuisset, fœtore quidem & utore pedum statim caruit, ast ejus in locum successit initio tumor pedum, crurumque ad motum difficultas, mox cum lumborum dolore & stypticitate alvi tormina ventris secuta, quæ tandem in acerbissimam colicam spasmodicam finiérunt, aderat morbo contractio abdominis, pervigilium, sitis, & ☐ lateritia. Adhibebantur à d. 17. Jul. A. 1698. quotidie clysmata paregorica & lappantia, fœtus diversi, internè absorbentia, & lia, cinnabarina, castorina, & ob urgentiam dolorum anodina, levi tamen & inconstanti



cum affectu, donec post aliquot dierum torturam manifestius levamen ab enemate, ex rad. alth. hyosc. &  $\Theta$  gemmæ concinnato, sentiret, erumpentibus tunc maculis scorbuticis, quo deinceps quotidie intestina abstergendo, id effeci, ut post 3. dies effluxos solidissimi stercoris globuli, lapidei quasi, prodirent, hinc statim d. 26. Jul. appetitus, somnusque rediit, alvus officium suum fecit, maduereq; postea iterum pedes. De  $\Theta$  gemmæ proprietate quadam scybala indurata educendi vid. *Forestus l. 21. Obs. 5. f. 316.* ubi historiam leges cujusdam colici, qui irritis quinque clysteribus, cum septâ vice è  $\Theta$  gemmæ clyisma injiceretur, ejectis tunc scybalis è vestigio sanitati fuit restitutus.

## OBSERVATIO XII.

### *Abscessus saccatus ex uteri vagina exclusus.*

**A.** 1698. d. 21. Sept. domi medicamenta à me flagitabantur pro parturiente primiparâ, gibbosa, staturæ parvæ, quæ falsis copiosissimè & quotidie gavisa dicebatur. Hæc ob foetus capitis ossi pubis insidentis obliquum situm in quartum diem dolores nixios patiens, quanquam post situm emendatum pulvere ad partum Magni *Wedelii* juvaretur, tamen ex impatientiâ sua agere negligens

gligens fœtum enitentem potius perire, quam laboribus nixiis se accingere fatagebat; hinc quia altero mane motu fœtus cessante scybala per uterum prodibant, ejus excludendi causâ pulveres tres ex diptam. alb. cinnam. testic. equor. borrac. castor. myrrh. & succ. ordinabantur, post quorum continuatam dosin fœtus valdè quoad caput compressus & sugillatus unâ cum secundinis feliciter ejiciebatur. Ab eo die ad 30. Sept. nil de ipsius statu percipiebam, hoc ipso verò maritus meam præsentiam exorabat; proinde ægram invisens audio, â die partus hucusque cum dolore inguinis dextri (ubi diu tumor hæserat) continuo per alvum copiosissimum pus summè fœtens excerni, & quidem non sine insigni virium dejectione, siti, pulsu languido & frequenti, herique animadverso horrore. His perceptis ordinatam (1) R bezoard. Wedel. essent. theriac. bals. traumat. c. anod. (2) bals. peruv.  $\Delta$  anis.  $\bar{a}$   $\mathfrak{B}$ .gt. vij. pro dosi (3) spec. pro infuso theiformi ex rad. scrophular. simphyti, herb. scabios. heder. terr. bellid. fl. hyper. myrrh. (4) pulv. stypt. Wed. c. anod. Igitur post horum usum die 1. Octobr. dolor & alvi fluxus desinebat, ægrâ admodum bene sibi esse dicente. Tum oris causâ imponebam cataplasma cum lacte coctum, ex rad. alth. fl. chamom. R. melilot. & sem lini. His ordinatis & per



aliquot dies non requisitus â visitatione abstinui; die autem 6. Octobr. accersor iterum, præsentî narratur ab imposito catapl. tumorem statim disparuisse, successisse verò ☐ purulentam fœtidissimam cum magno inter excernendum dolore, & quidni dolorem sentiret, postquam lotricis manus, inter ablucendum linthea, acrimoniam ☐ non subterfugere poterant, enatis scilicet in manibus inde vesicis; rebus sic stantibus jubebam decocto rad. glycirrh. & alth. addi, & in jusculis succum ex cancris vivis expressum admisceri. Die 7. tertiâ vice unum alterumque frustum puris, præter continuo cum ☐ summopere fœtente profluens tenue & fluidum pus, prodibat; pergebatur igitur in dictorum usu, nisi quod succo cancror. vivor. quem averfabatur, terebinthinam in ovi vitello solutam substituerem d. 8. Hinc copiosius longè, non tamen ita fœtens pus excernebatur, unde mephitim ejusmodi in vaginâ uteri latitare conjecturans, clysterem ex rad. symph. herb. fanicul. veron. agrimon. scord. fl. hyperic. hord. c. terebinth. mell. rosar. & myrrh. injici in pudenda curabam, prodeunte paulo post frusto oblongo puris, præter copiosissimum pus fluidius fœtentissimum, pro singulis noctibus verò pilulas ex extracto agrimon. scabios. heder. terrest. sarsapar. troch. alkek. c. opio, magist. oss. sepiæ, ocul. ☉ & ☽ hyperic. præ-



præscriberebam; die 9. cum ægram accedere vellem, fœmina ministrans mihi consultura ut intolerandum fœtorem, qui à fluxu puris oriretur, vitarem, ingressum deprecabatur, simul narrans eo inguinis loco, ubi tumor à longo temporis spatio extiterit, jam cavitationem aliquam observari, unde inveteratum apostema judicans pro meliori abstersione & fœtidi puris correctione præscriberebam clysterem ex rad. scrophular. herb. scord. fl. hyper. centaur. min. in ▽ hord. decoqu. addito melle rosar. myrrh. ungu. apostol. & bals.  $\frac{1}{4}$  anis. in 2. partes dividendum, quod ipsum ultimò insignem iterum quantitatem puris fœdissimi & fœtentissimi proliciebat, subsequo post excretionem semper aliquo ægræ levamine: comitabatur autem, quod maximum stuporem adstantibus faciebat, hoc profluvium puris vesicæ cujusdam membranosæ (fœmina vocabat etwas wie eine Kälberne Blase) excretio, quam abjectam fuisse priusquam meis oculis lustrassem ægrè tuli. Die 10. pus adhuc cum □ prodibat, pulsus erat cum acriori calore celerior. D. 11. prior clyster iterum injectus, à quo primò aliquid sanguinis, & deinde ingens vis puris effluebat, (clinica dicebat ein ganßer Nachtschorb voll) quæ huic clinicæ fœminæ ad lucernæ fidem examinata cumulus vermiculorum videbatur; statim à clysmate hoc dorsum & in-



guina dolebant, indicio post deterfum pus parietes esse mundificatos, quia tamen nihilominus cum ☐ adhuc foetens viridescens pus excernebatur, d. 12. clyisma immisi ex rad. symphyti, scrophular. herb. scord. fl. hyper. rosar. coqu. in mucilag. sem. cydon. tenui, add. myrr. aloë, ∇ ⊕ dulc. & bals. ♀ anis. clyster hic egregiè partes affectas solabatur, pus etiam jam in quantitate parcius, & in qualitate amplius non ita foetens, meliorisque coloris effluebat. D. 13. peregrè abiens, admonitione iteratâ de vitandis tdis, ☉ sis & acribus, usum hujus clysteris alternis diebus commendabam, suadens simul, ut in usu decocti balsami, & mixturæ, exceptâ R bezoard. Wed. & Essent. anod. continuaret. Pro roborandâ vesicâ & fluxu ☐ involuntario (quem post partum statim incurrerat) tollendo, ∇ Japon. c. lap. ☿. exterius verò ☉ petr. alb. c. ☉ nuci st. exp. commendavi, præter diætam lacteam, siquidem hætenus semper æstu febrili carenti lactis avidissimæ illud loco cerevisiæ bibere permiseram. D. 17. rediens post hæc administrata nullum ferè amplius pus prodire & id absque omni foetore comperi, insuper ☐ diutius retineri, appetitumque vigere, adhuc tamen usum essent. traumat. & pulverem ex ∇ Japon. cum lap. ☿. ut continuaret suadens. Interim cum ☐ fluxus involuntarius nondum penitus cess-

cessaret, laudavi pudendum suillum assatum, quod præsentissimum affectum præstabat, nam postea urinam perfectè retinebat, à puris effluxu simul prorsus libera, vixitque ita sana, donec post aliquot demum annos partu difficili una cum foetu obiret, teste demum me accersito mortis in ultimo articulo mortis.

### OBSERVATIO XIII.

#### *Lipothymia & spasmi hypochondriaci periodici.*

**V**omitoriorum & chinatorum abusus sicut meritò censurâ notatur, ita debitus usus à quibusdam medicis vilipenditur. Sanè & hic valeat πολυβείλητον illud: tollatur abusus, maneat usus. Quidni enim utamur emeticis, quæ non rarò statim & unicè morbos non leves, sed sæpe Herculeos ceu vecte quodam excludunt, & quare chinatis in totum abstinemus, quæ præmissis præmittendis & ἰσχυρῶς præbita aliquando morbos periodicos ex toto sufflaminant. En insignissimum effectum utriusque hujus potentis remedii in duplici casu binorum nobilium fratrum. Generosi cujusdam Equitis filius 8. annorum habitus & temperamenti sanguineo-phlegmatici, domicilium inhabitans aquis circumfluum, postquam sub saginâ pleni & delicati victus nihilominus studiis nimium




vacare, parcius autem motui indulgere jubetur, domi vertigine & strepitu aurium cum artuum vago & transitorio dolore, puncti-  
onibusque abdominis recurrentibus ab aliquot diebus d. 8. Novembr. A. 1698. affectus scribebatur. Quamvis igitur sequentia medicamenta mitterentur, scilicet (1) R ↗ cydon. c. arcano ☿ (2) jalapp. pulver. ℥ss. ʒ. d. gr. iij. crysall ☿. gr. v. (3) pulv. cachect. cinnabar. Wedel. c. o cinnam. (4) essent. lignor. succ. castor. (5) linimentum nervinum Wedel. tamen d. 10. demum iis uti est cœptum, quâ eâdem die aliis litteris referebatur, heri bis vertigine caducâ ægrum affectum sensisse aliquem æstum & externè, & imprimis internè in abdomine cum puncti-  
onibus hypochondrii sinistri. D. 12. denuo scribitur, crebram propensionem in somnum mox plenam lipothymiam excipere, ægrumque postea ad se redeuntem anxium esse & pavere, continuantibus unâ capitis dolore, puncti-  
onibus hypochondrii sinistri, & æstu interno abdominis. Hinc seponi jussis pulvere cachect. & purganti nisi (1) liquor. cephalic. Wedel. (2) potionem confortantem cephalico-nervinam, (3) pulv. absorb. Wedel. (4) mixturam rosam externam. (5) balsamum cephalico-cordiale, cum monito, ut n. 1. 2. 4. 5. ante & intra paroxysmum, n. 3. extra illum darentur, puncti-  
onibus autem hypo-



hypochondrii sinistri litu ex  $\circ\circ$  hyosc. rut.  
 castor. succ. salv. chamom. anis. c.  $\square$  foetid.  
 prospiciebam. Eadem die rus evocatus ob-  
 servabam, quoties paroxysmus (qui aliquo-  
 ties per  $\sigma$  &  $\rho$  ingruebat) desineret, præter  
 dicta palpitare cor, & pectus cum dyspnœâ  
 abdomenque spasmodicè constringi. Quia  
 igitur ex diatâ prægressâ & nausêâ aliquâ jun-  
 ctâ indicatio *ἐμέσεως* aderat d. 16. dato  $\square$   
 emet. gr. j. c. cinnabar. unico vomitu ast satis  
 largo effecto illâ die bene degebat; conti-  
 nuatum hinc in usu dictorum. D. 20. litteris  
 certior fiebam, d. 17. & 18. quotidie octo pa-  
 roxysmos, d. 19. verò quinque secutos, ci-  
 bumque ante plures dies sumtum *ἀνω ἡγεῖται*  
*τῷ* non coctum excretum esse; vomitu igitur  
 largiori ex  $\square$  emet. gr. ij. c. cinnabar. nupto  
 proritato, adhibitaque deinde mixturâ ex  
 elix. stomach. Wedel. proprietat.  $\circ\circ$  mac. &  
 liquor.  $\sigma$  item bals. stomach. externo d.  
 21. solum bis affectu correptus fuit, diebus  
 tamen sequentibus modò ter, modò quater  
 eodem laboravit. D. 23. post evacuationem  
 superius memorato purgante factam & u-  
 surpato pulvere cachect. cinnabar. item  
 $\square$   $\sigma$  volat. à d. 27. & 28. paroxysmis caruit,  
 die verò 30. Novembr. iterum aliquoties mor-  
 bo cum pavoribus tentatus, post adhibitum  
 infusum ex rad. cichor. pœon. trif. fibr. chin.  
 sarsapar. herb. fumar. ceterach. bellid. fl.  
 B 5 rosmar,



rosmar. stœch. arab. fol. fenn. fibr. helleb. nig. cryst. ♀ limat. ♂ cubeb. cinn. cost. ver. & tandem pulverem ex chin. chin. ℥ij. cinnabar. ℥j. in quatuor doses divisum, magno generosorum parentum gaudio affectus ex toto divinâ gratiâ desiit.

Alter filius 16. ann. phlegmatico-cholerici temperamenti, præter errores diætæ in priori casu allegatos insuper crebrò irâ excandescere fuetus, eodem quasi tempore, quo fratrem morbus invaserat, vehementi vertigine cum succedente æstu, *ὁρδὸς ἀδίου* tamen adhuc, correptus scribebatur. Diē nono verò Nov. in templo denuò vertiginem cum strepitu aurium patiens, illam fortius sub cœnâ sensit, siquidem jam lipothymia, eâque cessante unâ constrictio thoracis cum palpitatione cordis & dyspnœâ, spasmodicaque contractio abdominis (alvo simul per plures dies stypticâ) jungebatur. Ordinatus hinc ante omnia clyster ex emollient. carminat. c. ὄο rutac. &  & d. 11. paroxysmi multò vehementiores secuti cum jectigatione membrorum, nuchæque & capitis insigni lancinatione, ac intercurrentibus lipothymiis, missus hinc (1) pulv. bezoard. Wed. c. cinnabar. (2) liquor cephal. Wed. præter dicta confortantia & excitantia. D. 12. status ægri melior. D. 14. evocatus video paroxysmos circa noctem & qui sequente die 15. invadebant leviores factos, in somnum

somnum tendebat antequam affectu prehendebatur, os amarum. D. 16. dato ☐ emet. gr. ijß. c. cinnabar. bis fortiter vomuit, vomitu pri-dianâ cœnâ rejectâ, datus postea pulv. absorb. Wed. insuper liquor cephalic. & potio confortans. Hinc simulatio solum aliqua paroxysmi secuta cum aliquo tantum languore & debilitate. D. 20. tali rerum statu misi elix. stomach. Wed. propriet. c. 50 mac. liqu. ♂ & pulv. cachect. cinnabarin. pro 4. dos. d. 28. â paroxysmo adhuc liber degebat, propinatum infusum supra descriptum. D. 30. crebra & vehemens iterum accessio secuta. D. 1. Dec. solum capitis & abdominis gravis dolor observatus est, quem d. 4. Decembr. duplex paroxysmus excepit. Missus hinc pulvis ex chin. chin. c. cinnabar. & dent. hippopot. pro 4. dos. item essent. ⊕ ♂ Ludov. denique species cerevisiæ confermentandæ ex trifol. fibr. rosinar. ceterach. & scolopend. quibus sumtis divinâ gratiâ plenissimè & constanter convaluit. Notabile erat, hos fratres eodem quasi morbo eodem tempore & correptos & ab eodem simul liberatos esse.

#### OBSERVATIO XIV.

*Gravida silens liberos mutos  
parit.*

**G**RAVIDIS ut sæpe morositas familiaris est, ita



ita non rarò fœtui pernicioſa. Deprehenſum hoc eſt in Textoris cujuſdam hic loci uxore, hæc enim dum uterum tribus vicibus gerens, præ ſive irâ, ſive triftitiâ, pythagoricum ſilentium erga maritum & cognatos exercet, tres ex ordine liberos parit, omnes mutos, quorum unum juvenem tunc 22. ann. ſub curâ meâ A. 1700. habebam.

## OBSERVATIO XV.

*Sphacelus αὐτοκατεία naturæ  
curatus.*

**V**Is αὐτοκατείας naturæ Herculeos morbos ſæpe citra artis concurſum ſubigentis, imprimis in funeſtiſſimo affectuum ſphacelo eradicando elucet. Ita vidit Bartholin. Cent. 1. Hiſtor. 69. pedem ſphacelatum ſpontè deciduum, quem chirurgus auferre formidaverat. Talem quoque caſum ego obſervavi. Puer nimirum 12. ann. parentes natus pauperrimos dum 1701. in eadem domo quatuordecim perſonæ feбри petechiali corripuntur & ipſe eâdem corripitur, correptus per octo dies delirat, hinc per aliquot ſeptimanas ἀφωτος jacet, tandem macula lata nigra in genâ dextrâ non procul à naſo effloreſcit, indicio ſphaceli. En verò efficaciam naturæ perficientis, quod nullus fortasſe chirurgus aggredi fuiſſet auſus, ſeparatur nempe  
& ex-

& excidit dextra medietas nasi, maxillaque pariter dextra superior unâ cum omni cute, carneque illa ossa contegente: nec satis erat naturæ emortuas partes propriis viribus abstulisse, quin carne quoque citra ministerium artis hiatum illum enormem explet. Ego sanè ostupui audiens talia & oculis contemplans tam horrendam cavitatem. Similem fiderationem malæ in variolosâ puellâ ab affricto unguento vidit celeberrimus *Lentilius in Eteodromo p. 153.* hæc enim sphacelata pariter cum omni carne ab oculi sinistri orbitâ usque ad genam excidit, dimidium quoque utriusque labii secum abripiens cum dentibus omnibus, & maxillæ superioris insigni frusto, sicut oculo ad fauces usque pateret aditus, quæ tamen itidem convaluit.

## OBSERVATIO XVI.

### *Raphani vis resolvens in-* *signis.*

**R**Aphani vires resolventes & diureticas passim apud autores deprædicatas legere est. Ita memorabilis historia de raphani succo durata in calculi ferè soliditatem ova dissolvente Vol. IV. Act. Hafn. Obs. 39. habetur. Quid in cachecticorum lentitiâ feri attenuandâ valeat, aliquando vidi in virgine chlorotica. Hæc ipsa enim cum prius multo  
tem-









tempore δύσπνοα & malè colorata fuisset, diurno & quotidiano esuraphani â me imperato εύχροα & facile respirans cum suorum gaudio evasit. Similiter fœmina 25. ann. anasarcodæ & ascitico tumore per 23. septimanas afflicta, postquam per aliquot hebdomadas quotidie succum tenerorum raphanorum (Monath Kettich) sumisset, referente filiâ ab omni suo hydrope feliciter liberata est. Interim cur miremur mucidas massæ sanguineæ partes acrimoniâ salis raphanacei posse dissolvi, si in solidum tumorem abiens humorum coagulum penetrans vis raphani dissiccare potens est. Tale verò narrante nobilissimâ & piâ matronâ contigit in infante suo proprio. Hæc enim dum aliquando raphanum prandens videret infantem suum (qui diu definito abdominis loco tumorem durum quævis medicamenta frustrantem circum gestaverat) avidè in raphanum ferri, eundem postea frequenter infantis ori ingerens, tandem id consecuta est, ut sensim durities tumoris molliretur, tandemque tumor penitus dissolveretur. conf. Illustr. Schrækii observationem de asthmate sicco convulsivo esu raphani sanato, decur. 2. A. IV. ob.

## OBSERVATIO XVII.

*Purpura lateralis retropulsa no-  
xa, hâc iterum efflorescente depulsa.*

Sicut quæ transpiratu per poros cutaneos  
emittuntur tenuissima sunt & maximæ  
energix massæ sanguineæ recrementa, ita il-  
lorum exhalatio studiosè promovenda est,  
nec impunè feres, si ad littus corporis eje-  
cta periculosâ metastasi ad interiora repellas.  
Experiebatur hoc infans futoris  $\frac{3}{4}$  ann. d. 25.  
Septembr. A. 1700. Hic enim purpurâ par-  
ticulari lateris sinistri affectus, cum nihilo-  
minus aëri frigido expositus fuisset, dispa-  
rente purpurâ in vomitum incidebat cum al-  
vo laxâ. Dato pulv. bezoard. Wed. pro 2. dos.  
primam dosin statim revomebat, externè cru-  
stâ pan. torrefact. c. nuce mosch. & vino mal-  
vat. adsperso imposita, d. 26. dens erupit d.  
25. eadem adhuc cum vigiliis & inquietudi-  
ne, non calebat, quin frigebat, facies collap-  
sa vinum malvaticum pani biscocto sachara-  
to irroratum & hætenus datum porro com-  
mendabam, unâ potio porrigebatur ex  $\nabla$  rub.  
id. menth. polyoph. cinn. c. v. spec. de hyac.  
fir. fl. tun. pro temporibus unguent. populn.  
c.  $\circ$  nucist. expr. & extr. croci, denique pulv.  
bezoard. Wed. c. theriac. ast frustra, vomitu  
ut prius continuante, d. 28. vomitus quidem  
recur-



recurrebat, non statim tamen ut prius post  
 cibos vel potum sumtum, vinum avidè appe-  
 tebat, brachii sinistri frigus sentiebatur, reli-  
 qua eadem, pulvis idem repetebatur cinna-  
 bar. juncta. D. 29. dato licet pulv. stypt. Wed.  
 cum theriacâ, tamen vomitus & diarrhœa  
 pariratione continuabat, lecto se tegi non  
 patiebatur, quovis modo illum â se demo-  
 liens, jacebat debilis, oculi visebantur lan-  
 guidi & tristes, anhelabat potum, corpus fri-  
 gidiusculum imprimis autem brachium fini-  
 strum. Potio iterata externè verò  cam-  
 phor. cum  serpilli applicatus. Hinc rebus  
 adeò periculosis celeberrimi Stahlî consili-  
 um  sa in vomitu variolarum commendan-  
 tis sequi certus, dent. hippopot. c. cinnabar.  
 & mithridat, propius & quidem eo cum  
 eventu, ut quamvis post primam dosin ad-  
 huc vomeret, pulvis tamen remaneret, hinc  
 statim quietus decubitus per duas horas suc-  
 cessit, & post alteram dosin vomitus planè de-  
 siit, redeunte simul externo corporis calore,  
 cum facie colorationi, somnoque quietiori.  
 D. 30. manè quietior, alacrior & vividior  
 comparebat, quamvis â vomituritione inani  
 nondum penitus liber, scybala non amplius  
 erant aquosa, sed spissiora, vegetè appetebat,  
 pulvis hinc repetitus, quo amplius sumto  
 vomitus deinceps ex toto cessabat, & in late-  
 re sinistro (quod jam cum dextro æqualiter  
 cale-

calebat) purpura denuò efflorescebat; summa, omnia iterum salva.

## OBSERVATIO XVIII.

### *In febris petechiali ἡχέων.*

**F**Ebricitantium deliria temperamentis ægrotorum congruere, observatio est circumsectorum practicorum veritati consentiens; ita enim sanguinei animus lætis, phlegmatici stupidis, cholericis furibundis, & melancholici seriis anxiiisque deliriis confundi ac agitari notamus. Tale ex rariorum sorte occurrebat in quodam Viro - juvene fabri rotarum filio 31. annor. Hic temperamento præditus sanguineo - melancholico cum facie prærubrâ annuis largis hæmorrhagiis tam per os quàm nares, insuper epilepticis motibus ad 25. ætatis annum, non rarò etiam calculi doloribus subjectus, cum morositati taciturnæ, solitudiniq; meticulosæ vacans constanter consuevisset concionatorum in templo sermones sacros altè memoriæ infixos domi in papyrus conjicere, ex consuetudine profundæ attentionis ad concionantium verba id consecutus est, ut febris petechiali epidemiâ mense Martio correptus, septimo morbi die (quo consilii causâ ad ipsum vocabar) omnia quorumvis in hypocausto præsentium verba, ceu vivus quidam echo & quidem illo tono, quo



vel submissius, vel fortius pronunciata fuerant, repeteret. Imposito itaque nuchæ veficatorio corrigebatur quidem hæc rarior delirii species, ita tamen, ut anxia deliria nunquam plenè cessarent: revertebantur etiam consueti olim motus epileptici, & non sine maximis cruciatibus calculus excernebatur. Quamvis igitur diapnoicis, absorbentibus, bezoardicis, ☉ sis, diluentibus, emulsivis, aliisque diligenter insisteretur, tamen ob lethalissima mox sub meum ad ægrum ingressum comparentia signa die decimo tertio morbi mortem obire coge batur, mente prius, ut ferè solet restitutâ, ægroque inter ardentissimas preces animam creatori reddente. *De puero cum bulimo ἡχέοντι confer. Decur. 1. Mis. Nat. Cur. An. 3. Obs. 51. item de alio dec. 1. An. 6. Obs. 108.*

## OBSERVATIO XIX.

*Febrilia symptomata à punctura vespe.*

**L**iquorem insectorum ictu emissorum ut plurimum acidâ, coagulatoriâ & fermentativâ acrimoniâ pollere, tum experimentum celeberr. *Ludovici dec. 1. Mis. Nat. Cur. An. 8. Obs. 67.* ostendit, siquidem is deprehendit apes ictu liquorem emittere saporis admodum mordacis, aquæque regiæ æmulantis,  
tum

tum sequens observatio. Mensis Julii d. 13. Villica valde carnosa & succulenta, dum graminem refecat, inscia nidum vesparum turbat, hinc illarum iram sentiens mox post ictum brachii & pedis tumorem dolentem erysipelaceum, statimque postea in toto horripilationem æstumque alternantem cum virium languore, cordisque anxietate incurrit. Datis R bezoard. Wedel. c. mixtur. simpl. remixtâ & pulv. bezoard. ejusd. sudore promotod. 14. æstus febrilis, dolor capitis, & reliqua quidem cessabant, interim restans tumor pedis erysipelatodes non ante diem 17. illius mensis post inspersum pulv. erysipelatod. dissipabatur. Alioqui celeberr. *Welschius Dec. 1. Misc. Nat. Cur. an. 8. Obs. 35. p. 65.* in se ipso ictum vespæ & aranei impositis parti læsæ foliis salv. nobil. recentissimis curavit. Hinc enim uno quasi momento tumor & inflammatio resedit, sedatoque dolore aculeus disparuit, quem ante imposita folia perspicuè visu perceperat. *Conf. Hildan. Cent. 4. Obs. 77.* ubi ex punctura vespæ circa carpum dolor ingens totius corporis & lipothymia, item *Cent. 4. Obs. 78.* ubi à punctura vespæ ulcus insanabile secutum esse scribitur.



## OBSERVATIO XX.

*Ira & terroris vis morbifera &  
medica.*

**A**Nimi commotionum vim morbiferam ut quotidianis documentis experimur, unde nil æque sanitatem turbat, hominesque in varios morbos ipsamque præmaturam mortem præcipitat, quàm malè gubernati animi motus, ita tamen aliquando videas vim medicam ad diritatem morborum tollendam iisdem, & quidem aliàs quam maximè nocivis (quales terror & ira esse comperiuntur) subesse. Pertractavit hoc argumentum egregiâ *de commotionum animi vi medica* dissertatione celeberrimus Lipsiensium Professor *D. Pauli*. Similes ego iræ furialis morbosos effectus vidi in quodam pectinum fabro, qui fortiter iratus sanguinem statim mejebat. Alius verò sutrinæ addictus, quoties vehementer ex-candescit, toties cum tremore artuum cutem maculis sanguineis distingui notat. Qualem itidem effectum â terrore in conjuge cujusdam collegæ Elisabethani deprehendi. Hæc enim Hypochondriaca & habitus teneri olim in juventute ex fulminis fragore non semel ita territa fuit, ut statim in facie & brachiis maculæ latæ, rubicundæ efflorescerent. Ast salutaris erat ira cuidam ex meis ægris gene-  
roso



roso equiti. Hic enim podagrâ habituali excruciatuſ, dum cruciatuſ ſuôſ ab informatore ſuâ juventutiſ ex ebrietate tunc importunè garrulo ſibi intendi ſentiret, nec ob pervicaciam hominiſ quicquam verba abituſ jubentia proficerent, en totuſ in fermentuſ actuſ, jam non jacenſ, ſed totiſ viribuſ curſitantiſ ſtriſto enſe non modò antagoniſtam ſuū fugientem inſequitur, ſed penituſ unâ fideliâ podagricuſ tortoreſ hac vice fugat & diſſipat; eâdem pariter ratione, ac ille nobiliſ, cujuſ D. D. Pauli in laudata diſſertat. §. 20. ex Horſtio meminit. In quadam verò ſœminâ, Zythopolæ cujuſdam hujus loci uxore, terror ex incendio per viciniâ orto febrim tertianam inferebat, qui tamen cum propriâ ædeſ poſt aliquot ſeptimanas die febrili incendio conflagrare inciperent, febrim deincepſ pariter extinguebat,


## OBSERVATIO XXI.

### *Æriſ per aurem ſiniſtram*

*emiſſio.*

**M**Eatuſ illiuſ, qui ab aure in palatuſ fertur, adeo patula aliquando obſervatur cavitaſ, ut ær inde emittatur. Obſervavit tale quid Cnöffel. Dec. 1. Miſc. Nat. Cur. Ann. VI. Obſ. 85. Tulpiuſ pariter l. 1. Obſer. 35. vidit duôſ orthopnoicoſ effuſo ſpiratu per iſtuſ du-



Etum liberatos. Unde etiam teste *Bartholino L. 3. Anatom. c. 9. p. 527.* aliqui nicotianæ fumum ore haustum per aures reddere norunt. Prius & ego deprehendi in hydropicâ vetulâ 74. annor, quæ â multis annis quoties â pastu eructatio conſequebatur, toties ex aure ſiniſtrâ ſibilus quidam & ſtrepitus flatu manum feriens prodibat. In hac vetulâ, cui ob  craſſam, ſitim, dolorem abdominis, & duri-  
tiem tumoris nullam ſpem reconvaſcendi facere poteram, obſervavi retropulſorium effectum aquæ Calcis vivæ unâ cum Stahlio, quem adnotavit in diſſert. de adſtringentium uſu noxiø p. 25. Inde enim poſtquam lintea  $\Delta$  Calcis vivæ madefactâ cum ſtriçturâ cruribus applicata eſſent, crura quidem tenuiora evadebant, aſt ob retropulſionem ad pectus dyſpnœa mox oriebatur, unde ſtatim removeri juſſi.

## OBSERVATIO XXII.

*Ophthalmia menſtrua poſt retro-  
pulſa ulcera capitis.*

**I**Nfantum & puerorum ulcerofa capita ſicut â fonticis affectibus illos præſervant, ita ſi temere topicis tententur, in periculoſos & quandoque funeſtos morbos eoſdem præcipitant. Experiebatur hoc puella, hæc enim poſt malè curatum ulcerofum caput medica-  
men-



mento quodam topico in ophthalmiam incidit, quæ postea semper singulis mensibus menstrua antevertens his prodeuntibus iterum recedebat. Menstruo fluxu verò emanante phthifica A.ætät.XIX.obibat. Pariter tutoris filia decem annorum, ophthalmiam incurrebat, postquam mater ulcera capitis externo remedio inconsultè aggressa fuisset, quibus per diaphoretica & balnea revocatis, ophthalmia iterum cessabat. Simili modo celebris cujusdam medici Vratislaviæ misus filiulus 7. annorum, post illita ulcera capitis unguento quodam catarrhum pectoris, dyspnœam, & statum semi-cachecticum totius incurrebat, qui tamen ulceribus curâ meâ iterum reproductis ab omnibus iis symptomatibus plenè vindicabatur. Ast non eandem bonam fortunam sentiebat senioris è tribu fabrorum pectinum filius 10. annorum. Hunc enim impatienter ferentem diuturna capitis ulcera, balneator quidam insperso quodam pulvere & litu unguent. de litharg. securè curaturum promittens, indurissimos capitis dolores è vestigio conjecit, qui febri malignâ excepti ægrum ad mortem ex meâ prognosi comitabantur. Jungebantur enim huic febri præter dolorum capitis tormenta, summa prostratio virium, deliria, anxietas præcordialis, dolores artuum vagi in semiparalyfin desinentes, diarrhœa foetentissima,



tissima, ☐ viridis, quibus purpura alba in fine morbi, & tandem die 14. mors superveniebat.

## OBSERVATIO XXIII.

### *Mamillarum tumor hæmoptysi sublatus.*

**U**T in via virtuti nulla via, sic etiam naturæ. Ostendet hoc sequens etiam casus. Faber lignarius 42. annor. temperamenti & habitus sanguineo-melancholici, dum puer esset frequentissimâ & copiosâ hæmorrhagiâ narium laborans, postquam relicto opificio molitorio (sub cuius tyrocinio imprimis ex circumvolitante pulvere tussi vehementi nunquam caruerat) fabrum lignarium deinceps ageret, atque tunc præsertim casibus ex alto, quibus jam antea fataliter quasi obnoxius fuerat, magis adhuc exponeretur, aliquando non solum casu ab alto fortiter nates concutiens sanguinem è faucibus excussit, sed etiam alio tempore pronus ligno acuto pectus allidens inde tumorem utriusque mamillæ sanguine grumoso distentum adeo magnum contraxit, non sinè dolore per vices punctorio, ut mammas muliebres mentirentur. Quamvis igitur proprio marte aliquibus medicamentis tumorem resolvere & discutere tentaret, tamen is per 1½ ann. non prius

prius refedit, quàm postquam fortibus stric-  
turis musculorum sub extensione laboriosâ  
brachiorum in altum hæmoptysis excitare-  
tur, quâ effectum, ut deinceps intra 14. dies  
hic mammillarum tumor plenè discuteretur,  
licet subsequo tempore etiam nonnunquam  
parum cruoris adhuc spueret. Quia igitur  
insuper crebris oculorum, aurium, & gena-  
rum vulnerationibus hæmorrhagicas con-  
gestionibus ad caput magis firmaverat, post-  
modum id secutum est, ut quolibet mense  
Martio (quo tempore scilicet motus hæ-  
morrhagici sensibilius fuscitantur) sangui-  
neas commotiones sentiens tandem etiam  
eodem mense in febrim inflammatoriam le-  
thalem multis vagis in- & externis doloribus  
stipatam incideret.

## OBSERVATIO XXIV.

### *Empyema sanatum.*

**V**ir 61. annorum temperamenti sangui-  
nei, animi sensibilis, postquam ex sutore,  
ob temporum injuriam, mendicantium mini-  
ster factus ratione sui muneris toto die in por-  
tâ ad oderam excubare, victuque vili & quo-  
tidiano casei acidi esu se sustentare cogere-  
tur, olim nephriticis doloribus exercitus,  
mense Decembr. Anno 1703. post dorfi &  
pectoris dolorem non sine tussi cruento-pi-  
tui-



tuitosa ejicere incepit, cui nocte die 8. Decembris post terrorem in somno fortis horror subsequo æstu jungebatur. D. 9. vocatus cum signa pleuritidis deprehenderem, V.S. celebrabam, quâ institutâ undique sudor erumpebat, cum levamine doloris; dabatur postea debito tempore essent. alexipharm. Stahl. pulvisque pleuriticus. Wed. c. ①. sequebatur nox satis quieta, virium tamen debilitas & sitis pro ratione pulsus & calor, quorum ille magnus satis & æqualis, hic mediocris, major, dolor in pectore sedem mutabat, tussis rara cum quâ pituita viscida eiciebatur: ordinata hinc R bellid. c. ♀ ⊖ in potum pro decocto verò scabiosam c. fl. papav. rhead. abnuebat, d. 11. ob clamorositatem ab uxore parum salutariter exauditus, ♀ frigidam obtinuit, unde respiratio mox difficilior, cum vago dolore, rarâ adhuc tussi, & visci de meracâ pituitâ excretionem. Dum in dictorum usu sic pergitur, d. 12. flavum pus sputo remixtum facile & copiosè expectorabatur cum respirationis levamine. Continuabat sic, copiosior tamen adhuc, rejectio ejusmodi materiæ d. 13. cum bonis reliquis signis, quibus die 15. sudor nocturnus post comestas avidè in cœnâ rad. petroselinî exquisitè petroselinum olens jungebatur; ab itinere verò mihi reduci tædiosum erat audire, ægrotum d. 19. fortiter horruisse, subsequo calo-

calore, dolore pleuræ dextræ punctorio, respirationeque difficili & tussi; dabam proinde pulver. pleuritic. decoctumque herbarum dictarum c. butyro ☿ conditum (â quo tamen ob nauseam vomebat) denique essent. Alexiphar. Stahl. c. elix. pect. Wed. bals. peruv. His obtinebatur, ut eodem die mensuram pituitæ cruentæ expectoraret, faciliusque respirare inciperet. Sed hoc solum prodromus erat copiosioris *ἀνακαθάρσεως*, ad diem enim usq; 29. quatuor ferè mensuræ puris & quidem hâc ipsâ crassissimum pus dicente ægro caseum acidum veterem sapore referens, maleque olens sequebatur, respiratio hinc multò facilior, doloris sopitio, ☐ prius enæoremate instructæ jam crassæ, pulsusque naturalis evadebat: medicamentis itaque dictis bals. peruv. ʒj. ♀ anis. ʒß. saccharo instillatum addebatur, inde d. 31. ultra mensuram puris iterum tussi ejiciebatur, injunctus hodie succ. ☿ vivor expressus cum lacte caprino, d. 2. Januar. mensura iterum puris cruenti & foetentis rejecta; illo loco ubi dolor erat macula rubicunda efflorescebat, æstus, sitis, & pulsus iterum febrilis, balsamum & succ. ☿. homo mollis & sensibilis averfabatur, igitur ordinavi potionem ex ∇ fl. acac. cerefol. extr. scabios. bellid. heder. terr. c. fir. viol. item emulsionem ex amygdalis dulcibus card. ben. &c. quibus sumtis d. 9. denuo ultra men-



mensuram puris longê quam prægressum fœ-  
 tentioris rejiciebatur, non tamen sine siti,  
 corporisque consumptione, unde usus balsa-  
 mi, conservæ rosar. lac. caprin. & passulæ mi-  
 nor. c. ▽ borag. diversis quæque tempori-  
 bus sedulo suasa, & diligenter adhibita fue-  
 re, quibus effectum, ut post usum balsami  
 horribilis puris fœtor cessaret, per □ adhuc,  
 quod ultimis diebus factum, purulenta ma-  
 teria amplius excerneretur, egoq; ægrum d. 7.  
 facie vividâ c. pulsu & calore naturali siti ca-  
 rentem, & in hypocausto sedentem offende-  
 rem; ast quia adhuc dorsum sub scapulis do-  
 lebat, suspicabar non vanè, nondum omnia  
 esse salva, igitur ut sedulo in usu dictorum  
 pergeret suasi, quibus observatis d. 11. præ-  
 viâ angustîâ pectoris & dyspnœâ circa no-  
 ctem materiam peculiaris tetri fœtoris, cum  
 prior constanter caseum acidum veterem  
 oluisset, exclusit, respiratione mox redditâ  
 faciliori. Unde cum adhuc aliquid materiæ,  
 purulentæ subindè rejiceret, locusque ubi  
 pus delituisse senserat quasi intertriginosus  
 esse perciperetur, insuper post pastum cum  
 pulsu celeri aliquantum adhuc caleret, quam-  
 vis appetitus, somnus, pulsus faciei que &  
 oculorum status s. n. redderetur, jussi ut in  
 herbarum heder. terr. scabios. veron. &c. usu  
 diu adhuc continuaret, interim quia has aver-  
 sabatur, amplectens illarum loco o o olivar. c.  
 balsam.

balsam. supra dicto maritatum, divinâ gratiâ sic est restitutus, ut benè spirans adhuc A. 1714. sanus vivat, munusque suum sedulo exequatur. Eadem methodo pariter opificii saponarii tyronem, textorisque & rustici uxores omnes empyicos perfectè restitui, quorum iste & illa simul per diarrhœam & ☐ pus evacuabant. Quantum Casei veteres & impr. acidus noceat, bene norunt Calendariographi, dum hunc versum in suis calendariis ponunt: *Versaulte Kâse machen* francf. Et ego duas fœminas imprimis exinde in hydropem lapsas novi.

## OBSERVATIO XXV.

### *Febris tertiana comatosospasmodica.*

**G**enerosa quædam Virgo 50. annorum temperamenti cholericomelancholici, habitus macilenti, olim ante 12. ann. epilepsiâ hæreditariâ, postea melancholia hypochondriacâ & ante annum purpurâ vesiculari scorbuticâ correpta, d. 15. Sept. A. 1704. circa noctem primo paroxysmo tertianæ tentatur, qui d. 17. vesperi increscens d. 19. meridie fortius adhuc cum nausæâ doloreque genuum lancinatorio, alvo in sextam & stypticâ & ☐ lateritiâ rediens, ægram, ut ipsi succurrerem compellebat. Clyisma igitur fasti-

diente



diente ad celeberr. Hoffmanni ductum infusum ( quod expertissimum sapissimè deprehendi) ex rad. polypod. fol. fenn. fibr. helleb. nigr. herb. fumar. capill. ♀ sum. cent. min. cort. cit. rec. ☿ ☿ ris. c. ~ ⊖ \* c. irrorat. die ἀπυρετίας sumendum ordino. D. 21. frigus ingens à 10 m̃a ad 2dam durans mitiori tamen quàm prius æstu excipiebatur, sub æstu valde ciborum avida erat, & tenesmo vesicali ☐na sub hoc & sequentibus paroxysmis aquosam, uti diebus ἀπυρετοῖς lateritiam fundebat, carens semper sudore. D. 23. quod contra meum iussum brevi antè paroxysmum infusum sumserat, sub illo priori non multum dissimili vomituriebat. D. 25. stata horâ accessio facta cum solito magno & diuturno frigore, sub cuius statu hypochondrium sinistrum semper dolebat cum eructatione & nausæâ, hac vice finiente æstu in manibus maculæ flavæ efflorescebant non sine pruritu manuum pedumque vehementi, & diuturno, fluebatque sudor nunquam hætenus visus ab horâ secundâ ad sextam usque quam effusissimè, & quidem tam enormiter fœtens, ut adstantes accessum formidarent, interim parum ἐν Φόρῳ, languebat enim inde non parum. D. 26. licet dies intermissionis esset, adeo languida decumbebat & sitiens, ut adstantes mortem timerent, & quamvis hora quarta p.m. paulo levaretur, dyspnoos tamen esse

esse non desinebat, oris exulceratio hodie animadversa, d. 27. paroxysmus duabus horis tardius, adeoque 12 m<sup>a</sup>, accessit, frigus quidem jam longum, ast mitius, sitis in locum appetitus in paroxysmo hodie succedebat, sudor non sequebatur, interim ☐ saturatissima ut die ἀπυρέτω excernebatur, d. 28. post consumptum nodulum mixtur. antiscorb. Wedel. R ☿ hellebor. mixta dabatur, d. 29. levis solum horripilatio cum conspicuo calore aderat, sudor iterum adeo copiosus & foetidus, sicut d. 29. fluebat, pariter ☐ abominandum foetebat, ultimis his duobus paroxysmis comparebant sub frigore lancinationes brachiorum & crurum, contractiones digitorum, crurumque motus convulsivi & deliramentis confusio, quo modo domestici epilepsiam sine dubio occultabant; d. 30. ἐν Φόρως degebat, obrepebatque hora 12 m<sup>a</sup> meridiana somnus reficiens, ad undecimam antemeridianam sequentis diei, adeoque per 23. horas durans, ut eo soluto sibi regenerata videretur. D. 1. Octobr. dato pulv. febril. Wed. ex conch. arc. ʒ d. & ʒ caryoph. levissima solum velitatio febrilis succedebat. D. 3. per totum corpus purpura pruriginosa efflorescebat, ☐ remissior jam, quæ prius flammea & crassa fuerat, adeoque post adhibitam adhuc R ☿ hellebor. c. arc. ʒ & pulverem priorem iteratum morbo gravissimo feliciter defungebatur.

OBSER.

## OBSERVATIO XXVI.

*Circa hydropis pathologiam & therapiam aliqua notabiliora.*

**S**icut ordinaria in morbis occurrentia phænomena ne minimo quidem excepto ad perficiendam pathologiam describere præstat, ita rariores morborum circumstantias non negligere itidem expedit. In talium classem poni meretur appetitus hydropicorum integer non solum, sed & auctior. Moriebatur hoc morbo chronico Virgo 60. ann. & Sabaudus ille, cujus in sequentibus observationibus mentio fiet; illa suctum appetitum ad finem vitæ retinebat, huic quoque valdoperè augebatur, ut alcalibus domari nequiret: utrorumque verò victus constiterat inter alia dispepta copioso casei acidi, & acetariorum cibatu. Virgini (aliàs ante hydropem non semel inflammationibus diversarum partium ad gangrænam tendentibus tentatæ) id rarum quoque phænomenon sub ultimis morbi diebus contingebat, ut non solum rubor Scarlatinus omnes partes hydrope obsessas (quæ erant scapulæ, femora & crura) invaderet, sed etiam ex crurum dilatatis poris copiosè serum deplueret, quo phænomeno ego motus, insuperque experientiâ tam propriâ (quâ meis oculis vidi rusticum ob hy-



hydropes abdominis & crurum, post profundas scarificationes furarum κατὰ σφυρὸν factas, procurato sic largo stillicidio feri, rite convaluisse) quam Severini & celeberr. Slevogtii in programmate de Scarificatione hydropicorum inductus, statuebam scarificationem experiri. Tentatis igitur à balneatore scapulâ, cruribus & pedibus (licet ego solum femora jussissem) statim feri sanguinei bonâ quantitas ad 1. mensuras ferè effluebant, cum subsidentiâ tumoris in scapulâ ex toto, sensibili etiam abdominis: posteris insuper diebus partim ex incisis, partim è sponte dilatatis poris tantum feri effluebat, ut loci continuè madefierent, quin adeo continuus & densus sudor toto corpore prorumpibat, ut patientis in frigidâ camerâ decumbentis corpus atmospharâ aliquâ cinctum compareret. Quamvis igitur nulla gangræna succederet, tamen ægra quod sitis, calor p. n. & urinæ crassæ ac rubræ viscerum ἐν σπλαγχνίαν abesse significarent, post aliquot dies nihilominus moriebatur. De simili rubore totius in anafarcâ gangrænâ tamen excepto vid. *Salmuth. Cent. 2. Obs. 99.* Stillicidii sudoris in hydropico parum saltem ægrum levantis & tandem morte pariter excepti meminit etiam *Bartholin. Cent. 3. Histor. 23. Dec. 2. Misc. Nat. Cur. Ann. 1. Obs. 79.* Verò effluxus feri è poris hypochondriorum dilata-

latatis salutaris morbumque solvens describitur.

## OBSERVATIO XXVII.

### *Salivatio chronica & vomitus quotidianus hypochondriaci sublatus.*

**S**I aliquod argumentum peritorum medicorum studio perfici meretur, sanè id sunt artificum morbi. Glaciem quidem in hac materiâ cum magnâ laude fregit eruditissimus *Ramazzini*, sed quia propriâ confessione incitamentum potius tanto operi perficiendo (in quo multorum medicorum calami satis in quo se exerceant inventuri sunt) vocari debeat, quam plenè perfectum opus, proinde commendandum est eruditæ posteritati, quo egregios viri conatus juncta operâ magno reipublicæ medicæ emolumento amplius augeat & perficiat. Quemadmodum igitur artibus sellulariis addicti necessitate quâdam malo hypochondriaco urgentur, ita hoc ipsum inprimis sudores exercet. Experiebatur illud juvenis sutoris socius, qui ut hypochondriacis solenne prærubrâ facie existens â duobus annis, inprimis autem ultimis quatuordecim diebus, aliquot post pastum horis non infrequenti hypochondriacis symptomate salivatione vexabatur. Accedebat nimirum hæc quotidie post meridiem statâ hora quin-

quintâ, uti hora secundâ vomitus præcurrebat. Datis die 11. Nov. An. 1700. (1) pulv. stomach. Wed. c. alcohol. ☿ coral. r. ppt. & ☿ cinam. (2) R ☿ cum vino malvat. parata, & (3) essent. ⊕ ☿ Ludov. die 12. & vomitus & salivatio cessabat, remanente solum nausêa; quia igitur alvus jam dum styptica penitus officio suo per 5. dies, & quidem non sine abdominis tensione deesset, d. 16. pilul. aloëticis frustra datis infusum passular. c. fol. fenn. fibr. helleb. nigr. & ⊖ ♀ subjungebatur, hinc d. 17. gutture inferiori cum dolore lumborum gravi nondum exsoluto, clysmate injecto 9. dejectionibus copiosissimis per duos ex ordine dies proritatis plenè convaluit æger, liberatus sic â salivatione biennali & vomitu 14. dierum periodico molestissimo.

## OBSERVATIO XXVIII.

### *Hæmoptysis ab omisâ venæ sectione adsuetâ.*

**E**Xperientia teste celeberr. Stablius in dissertation. de patholog. fundament. c. 4. p. 35. scribit quotidianum esse, quod homines venæ sectioni â multis annis circa superiores partes corporis assuesciti, augescente ætate tales affectus incurrant circa superiora loca, qui â congestione vel enisu sanguinis pendeant, licet hi ipsi tunc jam sint præter ætatem, maximè verò id fieri, si has evacuationes assuesca-



*Etas neglexerint.* Inter alios plures id ipsum quoque casus sequens senioris è tribu futurum confirmat. Hic 59. annor. temperamenti melancholico - cholericì, habitus macilenti, animi activi & sensilis, postquam juvenilibus annis in Suecia cibis crassis, infumatis, falsis, & viscidis frequenter usus, corpus etiam non parum frigore boreali læsisset, & postea sub sedentario vitæ genere & parcissimo potu, (quod ipsi quasi hæreditarius mos erat, dum mater sæpe post quartum diem demum non rarò bibere sueverat) caseo, acidis, viscidis, flatulentis, fructibus horæis aliisque dyspeptis libenter gavissus esset, ut de animo ad vehementes tristitiæ, iracundiæque motus proclivi fileam, olim juvenis adhuc in sodalitiis plus justo adbibens, tum statim frequentes cephalalgias, nariumque hæmorrhagias sensit, quibus tollendis & præcavendis non rarò V. S. cum fructu celebraverat. Postquam verò sequentibus annis cum alvo stypticâ & morante hæmorrhoides cæcæ sequerentur â cephalalgia inde & hæmorrhagiâ immunis factus, sanguinis educationem inutilem postea fore ratus, eam per 3. annos neglexerat, licet frequentes circa ver & autumnum recurrentes circa caput & pectus catarrhi, ceu enisus sanguinis, prædictorum affectuum vestigia legerent. Igitur A. 1700. mense Sept. & Octobr. diurnâ tali & gravi  
tussi

tussi humidâ iterum afflictus, cui phlegma-  
torrhagia narium tandem cum levamine ac-  
cesserat, tristisque prognostico medici celebris  
phthisin funestam non minus ignoranter,  
quam imprudenter prædicentis consterna-  
tus, me conveniens dato infuso laxante, dia-  
pnoicisque & pectoralibus levius quidem  
paulò habuit, ast cum remanente adhuc levi  
tussi (cui phthisin medici prioris iudicio sub-  
esse metuebat) iter instituisset, eo peracto  
d. 14. Octobr. noctu cum tussi sanguinem  
floridum modica copiâ spuebat; aderant  
huic sputo artuum lassitudo, frigus pedum  
& crurum cum simultaneo æstu & rubore fa-  
ciei, alvusque cum stricturâ abdominis sty-  
ptica. Suasâ proin ante omnia venæsectione,  
(cum de alvi obstructione fileretur) sensibi-  
lis & trepidans æger hoc audito ita consterne-  
batur, ut in ἐκλυσι laboretur, eatenus tamen  
salutarem, quia exinde alvus per triduum ob-  
structa cum remissione stricturæ abdominis  
solvebatur. Administrata hinc V. S. in bra-  
chio, pedilaviis tepidis adhibitis, datisque  
simul pulveribus ex coroll. r. lapid. ☉ c.  
cinnabar. item conserv. rosar. quibus vehe-  
mentiori tussi præsentem sem. hyposc. albi dosi  
parcâ junctum, potiunculisq; congruis, mor-  
bus tam feliciter cessabat, ut d. 20. hæmoptysis  
extoto, & dein quoque imaginaria tussis  
phthisica desineret. Cæterum notabilis phæ-

nomeni, horroris nempe in toto & frigoris genuum ac pedum (quo in hæmoptysi sanguis ad thoracem mechanismo quodam congeritur) jam *Platerus* meminit li. 3. *Obs.* p. m. 740. dum scribit: *horrorem in toto corpore, maxime pedibus & genibus, in ejusmodi rejectionibus evenire solere.*

## OBSERVATIO XXIX.

*Hæmorrhoidum dolor calculum vesicæ mentiens.*

**E**ffato celeberr. *Baglivii lib. 1. prax. p. 83.* hæmorrhoidum internarum dolores aliquando dolores calculi mentiuntur in vesica latentis, nisi quod hi multò atrociores & frequentiores sint quam illi, hinc etiam observamus in graviore hæmorrhoidum cæcarum dolore per sympathiam vesicam quoque stillicidio ☐ laborare, de quo conf. *Forest. l. 23. Obs. 6. p. 429. & Dodon. Obs. 50.* Idem in futuro in præcedenti observatione memorato eveniebat. Hic enim dum tam à cibis crassis, crudis & viscidis sibi non temperaret, quam frigus præsertim partium inferiorum crebrò susciperet, mense Martio A. 1703. in tumorem bubonum, & postea 19. April. in totalem ischuriam triduanam cum dolore & duritie circa vesicam incidebat. Consultus tunc me absente Pharmacopœus *πολυπράγμων* calculum



culum adesse ratus R ♀ & purgans mittit, succedit hinc □ sed tam viscida, ut duci posset, subsidentque unà in fundo vitri citra arenulas corpora rotunda albicantia conspicuæ magnitudinis (cujusmodi corpora teretia instar lumbricorum sanguine leviter tincta in quodam mobili varicibus vesicæ non sine maximo cruciatu laborante cum □ emissa postea observavi, quorum etiam alicubi *Wedelius* meminit.) His ego visis, perpensoque quod æger plus vice simplici hæmorrhoides cæcas sensisset & facie viseretur è flavo-viridescente (qualis faciei color Foresti judicio, adstipulante sæpe experientiâ, hæmorrhoidariorum quasi proprius est) non calculum vesicæ, sed hæmorrhoides latere penes me concludo, & ægro edissero, nec illud in vanum; emergebant enim, fluxu □ libero prius reddito, d. 2. Maj. hætenus occultæ, jam verò oculo contemplabiles, hæmorrhoides cæcæ. Cæterum quod bubones hæmorrhoidibus complicentur, non insolens est. Curavi enim eodem anno, mense Aprili filium Zythopolæ 14. annorum, qui ex casei frequentique ciborum frigidorum & dyspeptorum abusu colorem fuscum totius corporis incurrebat, aderant simul dolores pectoris punctorii, tormina abdominis bubonumque tumor cum fluxu hæmorrhoidiali, quibus omnibus per medicamenta congrua sublatis, color quoque

postea emendabatur. His ὡς ἐν παρόδῳ libatis, iterum ad nostrum futozem redeat oratio! Pergens ille in abusu casei aliorumque dyspeptorum ac viscidorum mense Aprili A. 1707. tempestate frigidâ & ventosâ uxorem navi propinquorum invisendorum causâ Berolinum proficiscentem dum Glogaviam usq; comitari intendit, post frigus susceptum Steinaviæ iterum totalem obstructionem □ stypticitati alvi junctam incurrit, quæ licet post infessus & clysmata injecta cessaret, tamen □ pallida & aquosa cum longis pituitosis filamentis semper adhuc ut prius excernebatur. Tandem pravum victum non derelinquens, cum urina non alio quam memorato modo constituta, semper tamen arenulis priva, excerneretur, imò dimidio anno ante mortem involuntariè, quamvis semper cum dolore pressorio, exstillaret, mense Augusto Anno 1711. post appetitum â longo tempore debilem, in morbum, quem statim feralem futurum prædicebam, labebatur, comitabantur enim illum virium magna prostratio, pulsus debilis, extremorum frigus, vomituritio, singultus spasmodicus, tumor pedum, □ cum dolore pressivo glutinosa & viscida stillans, tandemque in fine morbi sedes brunneæ & cruentæ, quæ symptomata die morbi 10. mors excipiebat. Quia igitur ego (inductus partim arenularum perpetua absentia, partim

tim indole doloris, dum æger adhuc in articulo mortis magis imò unicè de pressorio quam acuto dolore, & quidem his verbis ultimo inehmt mir doch den Keil weg/querebatur) nunquam calculum vesicæ, ast solùm circa collum vesicæ callosum quid latere edixeram, æger unicè de calculo persuasus sponte vesicæ sectionem unâ vel alterâ die ante mortem, cum expressa clausulâ de sola vesica aperiendâ, desiderabat. Discissâ itaque vesicâ (quæ angustior & crassior solito comparebat) ecce dum uxor & uterque gener, è quibus unus litterario gravi officio fungitur, calculum expectant, ne quidem arenula in toto latifundio, ast ut sagaci conjectura prædixeram, circa collum vesicæ interius utrinque tumor durus se exhibebat, qui discissus similem materiam glutinosam, qualis cum □ excreta, sistebat. Conf. simil. cas. apud. *Bonett. Anat. Pract. l. 3. sect. 24. Obser. 10. §. 8. Obs. 12. §. 10. Obs. 18. in primis Reiseliuss Dec. 2. Misc. Nat. Cur. Ann. 2. Obs. 114.*

### OBSERVATIO XXX.

*Fonticulus naturalis annuus periodicus fonticulo artificiali exsiccatus.*

**V**Ere naturam despumare & morbos salubres plurimos tunc excitari notum est. Id deprehendit in se fœmina temperamenti  
D 5 cho=



cholérico - sanguinei, hæc in plethoram cacochymicam per diætæ & vitæ generis rationem incidens cum post semilaxationem pedis dextri olim ganglion reportasset, illo rescisso eodem loco tumor durus ovi gallinacei magnitudine succrevit, qui sequente vere sponte apertus post effluxum fœdæ materiæ, (wie Kröten Gerecht) dein disparuit, ita tamen ut per quinque annos successivos quolibet vere iterum extuberaret, & pari modo spontè aperiretur. Ast cum à chirurgo quodam folliculus penitus excisus esset, in posterum quidem periodica vernalis protuberatio desiit, ita tamen ut postea vehementes lancinatorii dolores illud crus & pedem invaderent, qui fonticulo per artem in crure illo excitato postea in perpetuum desiere, claro documento, quantum usum fonticuli, in specie etiam ulceribus curandis præstent.

### OBSERVATIO XXXI.

*Spastica tractiones artuum à nimia doli Tinctura bezoardica.*

**Q**Uantum in proportionem moventis ad movendum situm sit, ratio & experientia passim docet. Si enim in corpore strictiori crassisque succis prædito, adeoque ad motum præcipitem indisposito fortior animi corporisque motus instituat, aut succi minus sequa-

sequaces medicamento calidiori impellantur, necessitate quadam dolores, tumores, inflammationes, hæmorrhagiæ, alique nimii fluxus, tremores, tensionesque artuum, quin epilepsiæ ipsæ & apoplexiæ, & qui non alii morbi facillime consurgent. Juvenis futrinæ addictus temperamenti sanguineo-melancholici, habitus macilenti, acidis lubentissimè & frequentissimè gavisus, adeò ut acetum in copiâ forberet, exindeque sudoribus largis noctu & interdiu obnoxius fieret, postquam socio suo cum febris malignâ epileptico ministrans prophylaxeos causâ integrum vitrum R bezoardicæ ex officinâ petittum unâ vice exhaustisset, epilepsia subitâ socii simul territus, mox lassitudinem, cephalalgiam, tensionesque & tractiones omnium artuum & membrorum vagas incurrit, propinatis pulveribus ex cinnabar. corall. r. dent. hippop. essent. succ. castor. c. ~. cochlear. & ☉ \* paulo quidem tensiones illæ remittebant, multò verò magis post scarificationem institutam; ast quia levius licet, pertinaciter tamen adhuc, per plures dies continuabant, post 3. Sept. V. S. celebrabatur, quâ in brachio sinistro factâ mox eo latere tractiones illæ desinebant, quæ tamen dextrum latus adhuc infestabant: propinato verò succo lumbricorum cum inf. theif. ex rad. helen. h. trif. fibr. serpill. fl. anth. circa quartam â primo



mo insultu hebdomadam liber ferè ab iis red-  
debatur, penitus verò ipsum absolvebat di-  
arrhœa, aphthæ & tandem d. 18. Sept. (cum  
medio Julio morbus cepisset) pustulæ pruri-  
ginosæ supervenientes.

## OBSERVATIO XXXII.

### *Catalepsis.*

**I**Nter rarissimos affectuum merito catalepsis  
collocatur; quo de morbo sub tit. *de cata-  
lepsi rarissimo affectuum* Magnif. *Wedelius disser-  
tationem* edidit. Mihi ex relatione fœminæ  
cujusdam probæ & candidæ, quam aliquan-  
do sub cura meâ habebam, sequens casus de  
sua cognatâ narrabatur. Ancilla 18. annor.  
quæ olim epilepsiâ laboraverat, memoriæ  
acris, fixæque phantasiæ, arithmeticam edo-  
cta ab aliquot annis unicè ferè circa mensium  
tempus catalepsi prehenditur. Affectus  
ipsam ubicunque locorum sit corripit, stat  
tunc instar statuæ marmoreæ, sui ignara, ocu-  
lis apertis membrisque eodem situ, quem  
cùm cataleptica fit, obtinebant rigentibus.  
Mensæ assidens, brachiumque ad jusculum  
capiendum extendens non prius cochlear  
cum manu rigente ad se retrahit, quam cum  
ex hoc somno vigilante emergit. Cognata  
illius, quæ mihi hæc de ipsâ referebat, ali-  
quando in via publicâ ipsam oculis irretortis  
instar



inſtar marpeſiæ cautis rigentem offendit, obſervans cum ex hac ecſtaſi eluctatur, quod poſt profundum ſuſpirium oculis ferocibus caput ad utrumque latus contorſerit, epilepſiæ ſupervenientis indicio. Ipſa ægra ob longitudinem morbi admodum contriſtari dicebatur. Similem catalepticum affectum in quodam Paſtore oppidano obſervavi. Is habitus macilenti & temperamenti cholericomelancholici inveterato malo hypochondriaco laborans, cum aliquando inopinatum incendium in ſuâ domo ortum eſſet, ad ejus rumorem, è veſtigio in ſtatuam vivam mutatus, apertis oculis non videns, nec auribus ſuorum clamores percipiens rigidus aliquandiu ſtetit. Quanquam igitur affectus hic amplius non rediret, tamen ex hoc terrore aliisque cauſis tremorem manuum incurabilem incurrit.

### OBSERVATIO XXXIII.

#### *Cachexia à ſuppreſſione menſium brevi ſublata.*

**Q**uantopere doctrina de tono partium â celeb. Stahlîo tam clarè & plene dilucidata medicam artem illuſtraverit, omnes attenti medici animadvertunt, & qui boni ſunt non ſine encomio viri deprædicant. Utut enim in ipſo jam Hippocrate textus inſignis  
ad

ad hoc negotium spectans lib. de locis in homine §. 15. legatur, quando scribit: fluxiones propter frigus fiunt, cum caro in capite & venæ tensæ fuerint. Hæ enim horrente carne & ad angustias perveniente adstrictæque & excludente humiditatem exprimunt. Et simul carnes ipsæ contra exprimunt ad angustias pervenientes, & capilli fursum erecti fiunt, utpote simul undiquaque fortiter compressi. Quicquid igitur inte expressum fuerit, id ipsum quoque quocunque contigerit fluit: Insuper Truſton. de respirat. p. 25. motus corporis systaltici meminerit, quo, ut scribit, partes ab influente sanguine paululum distentæ factâ undique lenissimâ compressione subsidunt aliquatenus & se restitunt, adeoque sanguinis motum versus cor remeantis promovent & adjuvant; Tamen & hodie post inventam à *Colono* Americam quidam jam in Platonis Atlanticâ hanc magnam mundi plagam sibi reperisse videntur. Sane non possum mihi temperare, quin quâ mothodo naturæ medicamentis adjuncta in quadam cachectica se à ferossâ colluvie mediante tonicâ constrictione liberaverit, recenseam. Ancilla 30. annorum melancholico-phlegmatica, hypocaustum situ madidum inhabitans, acidis diu abusa, post perfrigerationes totius & imprimis inferiorum partium in parcitatem mensium delapsa, inde hæmoptysi

men-

menstruæ menses semper præcedenti obnoxia fiebat, à qua licet opera mea vindicata, non multo tamen interjecto tempore ex eadem causâ ulceribus manuum, & iterum alio tempore erysipelaceis, jam ad gangrænam vergentibus manuum inflammationibus subiciebatur. Tandem verò concepta ex elatione panni menstruata nausea in catameniorum suppressionem iterum incidens, cachexiam incurrebat, tumentibus pedibus & toto cum dyspnœa anxîâ inflationeque ventriculi. Datis igitur  $\mathcal{R}$   $\text{♂}$  hellebor. c. arc.  $\text{♀}$  & postea  $\mathcal{R}$   $\text{♂}$  hellebor. volatili observavit se quam primum priori mixturâ uteretur statim faciem præ figore contractam pallidiorē evasisse, hinc decubitus feri non sine inclinatione in  $\epsilon\kappa\lambda\upsilon\sigma\iota\nu$  versus inferius clima manifeste sensisse, cumque per triduum hæc phænomena continuarent, omne serum in habitu corporis stagnans frequenti  $\square$  emissionē ita evanuit, ut ægra quæ non sibi solū, sed & adstantibus mortem oppetitura visa fuerat, perfecte restitueretur.

#### OBSE RVATIO XXXIV.

*Auditus difficilis siccatis lacrimis factus, iisque iterum erumpentibus solutus.*

**F**oemina pauperem culinæ in conviviis  
nu-



nuptialibus infervientem aliquando curabam: Hæc 46. ann. temperamenti cholericomelancholici olim maniaco, postea melancholico affectu laborans, circa festum paschatis A. 1701. δυσηκολίαν sex septimanis durantem incurrebat, inde enatam, quod lacrymarum familiarium rivus siccaretur, iis enim postmodum iterum largiter fluentibus mox illa auditus difficultas desiiit.

### OBSERVATIO XXXV.

#### *Hæmorrhoides vesicæ menstruæ.*

**H**Aemorrhoides ani menstruæ sicut non adeo rarò observantur, ita easdem menstruatim è vesica prodire inter rariora recenseri meretur. Socius quidam opificii figulini homo pallidus (ut sunt cachexiæ huic opificino valde expositi) ab ineunte pueritiâ ad 26. ætat. annum, quo obiit, quâvis menstruâ periodo cruorem ex vesicâ emittebat, quod mihi hominis quondam familiaris, postea senior illius tribus, referebat.

### OBSERVATIO XXXVI.

#### *Humor frigidus evomitur cardiognum diuturnum solvit.*

**H**umores actu frigidos aliquando excerni plures observarunt auctores. Ita

A.IV.

*A. VI. Dec. 1. Misc. Nat. Cur. Observat. 26.* agitur de □ actu frigidâ & de simili *Dec. 2. An. X. Obs. 196. Dec. 1. A. 3. Obs. 184.* nares leguntur stillare ∇ ad tactum frigidissimam, quæ hemi-  
craniæ fuerat autor. De mensibus frigidis consule *Dec. 1. An. IX. Obs. 76. & Obs. 188.* de  
fœmina scribitur, quoties ulcus cruris alteru-  
trius (quod ipsam â magnis doloribus alibi vindicabat) consolidaret, toties intensum  
adeo frigus in hypogastrio sensisse, ac si nive impletum esset, cum sensibili ad tactum fri-  
gore, imo humores illi sub specie fluoris albi utero exeuntes adeo frigidi fuisse scribuntur,  
ut nivem solutam æmularentur. *Dec. 2. A. 4. Obs. 138. 139. & 140.* sanguinis apoplecticorum  
frigidi, sanguinis ē naribus frigide stillantis, & □ frigide emissæ fit mentio. De urinâ in-  
tense frigidâ & ejus causâ conf. *Borrich. Vol. 5. Act. Hassniens. Obs. 70. Mortonus in prolegom. de morb. acut. p. m. 24.* testatur itidem in hor-  
rore febrili se sanguinem V. S. emissum instar ∇ fluentis frigidum observasse. Ego post-  
quam ancillæ, (quæ post varios fœtores sus-  
ceptos, rapasque & olus in copiâ frequenter assumptum in cardiogmum pertinacem per 12.  
Sept. durantem, & sapore oris tetro cepas æmulante cœliacâque comitatum inciderat,  
emeticum ex ♀ emet. gr. jss. & ♀ Ol. gr. &c. dedissem, quater copiose vomuit saburram,  
quam inter vomendum actu frigidam fuisse  
E sensit,

sensit, moxque circa præcordia bene habuit, ventriculo postea etiam suum opus feliciter absolvente.

## OBSERVATIO XXXVII.

### *Venæsectionis' in oppressione virium utilitas.*

**S**apienter scribit Holler. in schol. ad sect. 1. aph. 9. plenitudo quoque affert pulsum languidum & propenullum, ubi tamen perspecta est imbecillitatis causa apertâ venâ statim reviviscit pulsus. Quia nempe juxta Bonett. l. 1. Anat. pract. sect. 1. Obs. 1. in plethoricis corporibus dempto superfluo co mmeatusque libertate restitutâ arteriæ systoles & diastoles munia feliciter explent, unde facilius & liberior micant. Vidi hoc in nobilissimâ quâdam matronâ. Hæc 46. annor. habitus macilenti cum magnis vasis olim largissima menstrua experta, postquam eadem ex gravibus multisque tristitiæ & curarum occasionibus defuissent, quovis mense dolorifica molimina patiebatur. Cum igitur initio Martii A. 1703. eadem ingravescerent, stipitata vertigine, pallore faciei macilento, rigidâ cervice, siccitate faucium, δυσθυμία, angustia & pressione circa pectus, pulsu tardo & debili, stypticitate alvi, animique dejectione, ego frustra adhibitis medicamentis dum oppressam magis sarcinâ sanguinis, quàm ex-

hau-



haustam naturam perpendo, a græ venas educatione sanguinis expedire vix deplere aggressus, altero mox die turgidam faciem, auditum restitutum, serenitatem mentis redeuntem, fauces humentes, pulsumque magnum & plenum latus deprehendo, hinc cum infuso laxante alvum adhuc expedivissem, omnia reliqua symptomata simul feliciter evanescebant.

## OBSERVATIO XXXVIII.

### *Tubercula faciei diversi coloris menstrua.*

**Q**Uas tragœdias agitatus sub commotione menstruâ exitumque per uterum non inveniens sanguis excitet, hæmorrhagias per loca incongrua periculosas, doloresque & spasmos subinde diros excitando, norunt omnes practici. Sunt tamen & casus, ubi ex indole temperamenti, animique habitu torpido stases periodicæ indolentes menstrua vel parciora, vel solum adhuc molientia periodicè præcurrant. Hinc videas non rarò unam vel alteram maculam aut pustulam diversis in locis ceu notam erupturorum mensium efflorescere. Insignius tamen mihi observabantur in quadam senioris futorum filiâ 16. ann. hæc melancholico-phlegmatici temperamenti, alvi morantis & siccæ, cum fre-

quenti ciborum frigidorum, fructuum horariorum, & panis largiori usu, multâque inferiorum refrigeratione, (ancillæ enim vice matri in culina serviebat) viscidam sanguinis diâ-  
**SECTIV** contraheret, (quam imprimis scarificatio matris consilio instituta manifestabat, quippe qua loco rubicundi sanguinis merus mucus albicans & viscidus educbatur,) menstruatim in æstate rubicundis, in hieme lividis latis tumentibusque maculis totâ facie deformabatur; ubi notabilis erat circumstantia, quod circa tempus quavis quarta septimana molientis, sed exitum non invenientis fluxus menstrui uno eodemque tempore inferiora cum alvo styptica frigerent, è contrario verò unâ caput â dolore non immune æstualet. Postquam igitur diuturnæ commaculationis menstruæ tadio correpta me in vere conveniret, sumto vino medicato ex rad. ari, bryon. bardan. h. fumar. capill. ♀. hepat. nob. hyssop. fol. fenn. fib. helleb. nig. rhabarb. costo vero, & ♀ ♀ris. parato mensibus fluentibus sensim penitus ab hac deturpatione faciei menstruâ liberabatur. Conf. similem casum apud *Bartholin. Cent. 3.*

*Histor. 72.*



## OBSERVATIO XXXIX.

*Tertiana gravis.*

**L**icet Hippocraticum effatum, quo pronunciat gravidam morbo acuto corripitur funestam esse, non semper veritati consentiat, dum mihi ipsi gravidæ angina & pleuritide exquisitâ, imò petechiis laborantes, salva propria & fœtus vitâ curandæ obvenerunt, interim periculi metum non parum medicis incutiunt. Ut igitur junior saltem medicus specimen aliquod profligatæ febris præ oculis habeat, en casum sequentem delineo. Fœmina honesta 21. ann. habitus macilenti domi dum degeret in acidorum viscidorumque abusu non parum delinquens, hinc impeditum dolorificumque fluxum menstruum, variaque pathemata hypochondriaca, tandem ante 2½ ann. quartanam non parum refractariam incurrit. Inito postea matrimonio cum in septimum mensem gravis animo ex calumniis perpesis fortiter commoveretur, d. 16. Jun. circa vesperam horripilabat, æstu subsequo brevi sudore finito, ast d. 18. mane paroxysmus cum horripilatione leni accedens majori ac per totum diem durante æstu excipiebatur, aderant unâ anxietates præcordiales, palpitatio cordis, lumborum lancinatorii artuumque vagi dolores, pruritus etiam,



ac tempore æstus maculæ scorbuticæ efflorescebant. D. 19. circa vesperam paroxysmus pari modo rediens, insuper vomitum asciscibat, ☐ erat flammea cum sedimento lateritio. Hodie igitur pro consilio vocatus curam ordiebar nodulo ex rad. plantag. cichor. herb. scord. card. bened. sum. fumar. cent. min. fol. senn. rhabarb. agar. troch. cinn. costo vero & ♀ ♀ris. de quo die ἀπυρεξίας bis utebatur. D. 21. circa quintam vesperi accessio fiebat sine omni quasi horrore, stipata iterum palpitatione cordis, anxietate præcordiali, inclinatione in lipothymiam, vomitu, dolore lumborum & artuum, solummodo aberant tubercula prurientia, ☐ non amplius ita rubra ochreum copiosum sedimentum deponebat, paroxysmus acrior erat cæteris 12. hor. durans; ut verò & febris foetusque debilitati medicarer, quavis sexta hora ex ▼ fl. acac. meliss. card. ben. & cinn. pulverem qui arcan. dupl. ♂ d. cinn. elect. gran. kerm. & cinnab. nat. constabat sumendum, ventri vero balsam. embryon. c. pan. mellit. Thorun. imponendum curabam. D. 23. paroxysmus horâ 3 tiâ cum forti horrore ingruerat, vomitum efficiens, inde anxietas & lipothymia præcordialis alii duplici vomitui (quo viscida pituitosa excludebantur) præambulabat, succedebat etiam alvus, horâ 7 mâ æstus sudore finitus nocte quieta excipiebatur; porrigebatur

batur hodie in paroxysmo potio ex ▽ fl. acac. puleg. rub. id. meliss. cinn. borr. polyophel. mat. perlar. dent. hippop. lap. ☿ gran. kerm. cinnab. & sir. fl. tun. partes quoq; dolentes formicar. lumbric. serpill. & rosmar. demulcebantur, insuper pulvis prædictus repetebatur. D. 25. paroxysmus mane hor. 10. cum magno frigore, dolore lumborum & artuum, vomituque pituitæ & in fine æstus effuso sudore accedebat. D. 26. ☐ citrina clara & s. n. motus fœtus debilis, vertigo aderat & tintus aurium. Hinc ordinavi mixt. febrif. c. essent. lign. al. & ☉ caryoph. it. conf. alk. inc. c. corall. cinnab. gran. kerm. elæosacch. cinn. & sir. fl. tun. D. 27. horror. â 7. ad 8½ durans bilis vomitui præcedebat, dolor artuum redibat, â sudore languebat. D. 28. ☐ constanter s. n. ordinatum electuar. ex cort. peruv. ⊖ abs. cinn. caryoph. mac. c. sir. fl. tun. quod quâvis sexta horâ repetebatur. D. 29. paroxysmus sextâ accedens mitior ad 10. durabat, sub horrore tamen vomituritio ægram, ut hætenus semper factum, affligere non desinebat. Interim cum in usu electuat. persisteret, d. 1. Jul. solum palpitabat cor cum dolore lumborum, d. 3. appetitus redibat, dolorque aderat interscapularis, cum vero sumto electuar. vomituriret, pulvere die 21. & mixt. d. 26. ordinatâ in posterum adhibitis plenè convaluit, feliciter sanum filiolum

postea pariens. De salubri usu pulverum mix-  
turarum & infusorum feбри fugo-laxativo-  
rum cum vino factarum in tertianis gravidarum  
conf. Dec. 3. Misc. Nat. Cur. A. 3. Obs.  
44. p. 52.

### OBSERVATIO XL.

*Fluxus aurium serosus diarrhœâ  
solutus.*

**P**urgantia capitis auriumque affectibus  
apprimè prodesse, quotidie experimur, &  
quidni, cum natura ipsa illas partes sæpe per  
diarrhœas spontè suscitatas soletur. Infans  
2. annor. fluxum aurium serosum cum otal-  
giâ expertus, postquam per unum alterumq;  
diem, citra tormina vel æstum, per alvum,  
motu naturæ critico cruento-saniosa deji-  
cerentur, mox ab illo fluxu auriumque dolore,  
salutari hac diarrhœâ, vindicabatur.

### OBSERVATIO XLI.

*Dolor ischiadicus & ophthalmia  
succo lumbricorum & strium discussa.*

**F**rustra sumus nonnunquam â tortura ignis  
cum majore splendore & gratia prodeun-  
tia medicamenta nativis suâ indole simpli-  
cioribus & sæpe ingratoribus præferentes.  
Virtutis enim *ερέγεια*, quâ multa simplicia  
magno





magno sæpe labore & impensis arte parata antecellunt, facile nitoris & gratiæ defectum complere deprehenditur. Clarum facit hoc etiam succus lumbricorum; hic enim quamvis â candido, nec simplicium alioqui hoste, celeberrimo Ludovici semirusticum medicamentum cluat, tamen facile quivis deprehendet, etiam hunc ipsum aliis lumbricalibus chymicâ arte paratis medicamentis factum facere. Sanè ex quo tum alibi, tum in nosodochio Dnn. FF. Misericordiæ hunc succum *ευκαλεως* & præmissis aliis in frequentiorum usum traxi, expertus sum quantopere arthritide tortos egregiè demulserit:  $\Theta$ e enim suo volatili penetrantissimo adeo serum  $\Theta$ ibus peregrinis fœtum per poros sub effuso sudore expellit, ut sæpe purpurâ efflorescente articuli dolentes â tyrannide salium subito leventur & liberentur. Experiebatur hanc felicitatem quidam Generosus Eques antea non semel ab hæmoptysi mea operâ vindicatus; hic cum Mense Majo ischiadico dolore cum ophthalmiâ complicato vexaretur, in memoriam revocans, quod quidam suorum subditorum suasu meo arthritidem hujus succi vi â se depulisset, ejus quoque vires in se experiri statuit. Exitum requiris, is saluberrimus erat, fugabatur enim hujus succi laudatissima efficaciâ simul & dolor ischiadicus & ophthalmia. Pariter unius ex primariis



urbis nostræ verbi divini ministris uxor post varia frustra adhibita, tandem gravissimam suam odontalgiam rhevmaticam hujus succi haustu feliciter discutiebat. Certè liceat hanc observationem historiâ à Foresto l. 19. Obs. 37. in scholio recensitâ sigillare. Ægrotabat Magnus Imperator Carolus V. hydrope, cum itaq; omnibus frustra datis Archiater Cæsareæ Maj. Baslorpius se unum remedium habere diceret, sed eo potius malle in rustico, quàm in Imperatore uti. Ad hæc magnanimus Imperator respondit, cogita te rusticum præ manibus habere, modò Imperatorem ita curaveris.

## OBSERVATIO XLII.

*Tumor rubicundus nasi genarumque & oculorum rubor subito hæmorrhagiâ nasi solutus.*

**J**Uvenis Hungarus εὐχερος & εὐσαρκος mercaturæ addictus, cum Presburgo huc venisset, mense Majo tumorem nasi rubicundum, genarumque unâ, cum rubore oculorum doloreque tensivo colli dentiumque incurrebat. Quia igitur hæc molimina erant ad sanguinis exitum pertinentia, ut Stahlius loquitur, licet tùm nondum eò pertingentia, exundante per nares in viciniâ stagnante sanguine mox ab omnibus his symptomatibus liberabatur.

OBSER-

## OBSERVATIO XLIII.

*Apoplexia sanguinea hæmorrhagiâ narium discussa.*

**Q**ui V. S. in plethoricis urgent, huicque generoso ut vocatur auxilio præcipua deferunt, sanè naturam ducem meritò sequi dicendi sunt. In præcedente observatione ægrum vidimus à rheumatismo in exterioribus partibus capitis stagnante hæmorrhagiâ narium liberatum; in præsentē occurrit aliud à stagnatione in cerebro ab apoplexiâ spontaneo narium cruento fluxu vindicatus. Is scilicet erat Generosus quidam Eques senex, hic cum ob statum plethoricum solenniter phlebotomo venas turgentes vacuaret, hoc auxilio aliquando ad tempus diutius dilato id effecit, ut non solum brachii vena educationi sanguinis solenni destinata valde turgeret, sed etiam totum brachium sanguine suffusum cerneretur. Cumque postea mense Aprili in campo œconomicis curis intentus exspatiaretur, solus existens, ἀφωτος concidit. Hinc cum ad ululatum molossi oves Domini custodientis homines accurrerent, æger hæmorrhagiâ narium copiosa exortâ in tantum quidem ad aliquot menses restitutus fuit, ut tamen in fine mensis Augusti fortissimâ iterum apoplexiâ tactus moreretur.

OBSER-



## OBSERVATIO XLIV.

*Febris synocha hæmorrhagiis &  
maculis rubris soluta.*

**N**otum est apud auctores practicos procurâ febris synochæ, quippe ad sinceram exonerationem criticam bonæ partis sanguinis pertinaciter inclinantis, venæsectionem admodum commendari; observarunt enim secta venâ non rarò simul & semel æstum synocharum planè deferbuisse. Interim dum sæpe circumstantiis urgemur, (inter quas ætas impubis nostratibus ex more legem â phlebotomo temperandi imponere suevit) tam efficax synocharum auxilium resistentes volentes aliquando negligere cogimur. Ut igitur junioribus practicis patefcat, quibus methodis natura venæsectionis adminiculo destituta pro sui â nimia sarcinâ sanguinis liberatione impetrandâ in febre synocha utatur, en sequentem casum communico. Filia mercatoris nostratis, 11. annor. temperamenti sanguineo-melancholici, habitus carnosî, faciei prærubræ, dispositionis hæreditariæ hypochondriacæ, domi nudis brachiis in libero aëre versari sueta, A. 1707. vere existente frigido & ventoso d. 29. April. manè febricitare incipit, subinde delirans, perque intervalla vomens, cùm dolore hy-

po-

pochondrii sinistri. Vocatus ego eodem & seq. die pulver. ex. lap. ☉. ☿ d. arc. d. ☉ & cinnabar. item potionem ex decocto C.C. c. scor. citri, &c. ordino. d. 1. Maj nox inquietâ vigesies fermè, licet citra omnem successum, ad dejiciendum stimulabatur, intestinorum aderat murmur, flatuum aliquando excretio, in hypochondrio sinistro dolor fixus & constans, tussicula, æstus, & fitis major, lingua albo muco obducta, pustula circa os, ☐ f. n. cùm suspensione & rubro, tam in fundo, quam superficie, natante ☿ro; in usu itaque dictorum pergebatur, quibus gargarrisma insuper adjunctum; post tertiam â meridie major ægritudo cum virium aliquali debilitate, madebant volæ manuum: data tunc essent. alexipharm. Stahl. cujus tamen usum neglexerunt. D. 2. nox ferè insomnis, subinde ê lecto surgens, salvâ tamen ratione, in hypocausto obambulavit, ab alvo feculenta excreta, reliqua eadem: propinata potio ex ☿ scabios. cardu. ben. cerefol. papav. rhead. cinn. borr. sir. papav. rhead. datus etiam pulvis pleurit. Wedel. f. op. c. ☉ & ess. citri ficc. circa vesperam per narem sinistram multum cruoris coagulati excretum, sudavit cum levamine, per alvum tenuia prodibant, ☐ rubra turbata, crassum sedimentum deponens. Notabile erat, hodie mane ipsi pedes ita alguisse, ut vasculum, quo lecti calefiunt, iis apponi

poni postularet, licet reliquum corpus æstua-  
ret, dolor priori loco relicto in alium migra-  
bat, sacculi ex flor. chamom. & melilot. do-  
lenti parti adhibiti. D. 3. benè dormivit, ma-  
nè iterum narium hæmorrhagia & rejectio  
cum tuss. pituitæ flavæ cum sanguineis striis  
secuta, exulceratio oris, dorsum dolore affe-  
ctum. D. 4. benè dormivit, per nares iterum  
sanguis crassus sine fermè guttulâ feri efflu-  
xit, semper in usu lap. ☿ & d. c. ☽. continua-  
batur, præter reliqua. D. 5. iterum narium  
aliqua cruentatio, manè vomuit, dolebat  
ventriculus, à meridie in brachiis, dorso &  
cruribus maculæ rubræ efflorebant, data es-  
sent. alexipharm. & reliqua. D. 6. adhuc  
plures erupere. D. 7. post usum essent. ale-  
xiph. insignia tormina in ventriculo sentie-  
bat, per bonum temporis spatium, postea vo-  
mens, maculæ & tubercula rubra & confecta  
cum pruritu dictis locis durabant: datum  
decoctum rad. scorzon. filiquar. c. ras. C.C.  
vesperi iterum vomuit. D. 8. manè sudavit,  
maculæ ut heri, ob scybala sicca & tormina  
abdominis adhibitus clyster, quo multa vi-  
scida pituita prolecta: hinc datum ☿ & c.  
lap. ☿. cinnab. item essent. scord. lignor. D. 9.  
pulsus hodie non amplius febrilis, pustulæ &  
maculæ indies copiosius erumpebant, ma-  
gisque prurientes. D. 10. optimè dormivit,  
(quod aliquot noctibus non factum) tormi-  
na



na & pressio in abdomine cessabant, cum macularum & pustularum discussione in brachiis, quæ tamen d. 11. in dorso cruribus & pedibus multiplicabantur, in lecto decumbenti punctiones causantes, à meridie verò crura & pedes maculis latioribus rubro brunis instar panni scarlatini obducebantur, imo in dorso pedum aliquæ elatiores adeò fusco colore non sine pedum tumore viscebantur, ut mater gangrænæ metum conciperet, quod fortassis factum, quod ægra hodie extra lectum in domicilio eventilato substiterat; interim pergendo in usu dictorum, d. 12. maculæ flavescebant, redeunte appetitu & integrâ sanitate; finem curæ evacuante conclusi.

## OBSERVATIO XLV.

*In unâ graviditate varices bis  
spontè aperta, & simul bis venæsectio ce-  
lebrata.*

**Q**Uam insignissimum auxilium abortus præcavendi in plethoricis sit venæsectio, toto die loquitur experientia, & videtur sane natura, optima morborum medicatrix, digito intento variis hæmorrhagiis salubriter spontè excitatis viam phlebotomo præmonstrasse, tum aliis in subjectis, tum ipsis gravidis. Urgebatur Consultissimi apud nos  
Advo-

Advocati uxor gravida carnosæ & torosæ habitus, adeo plethorâ, ut quamvis d. 3. Junii A. 1709. tertio circiter mense venam meo suâ laxaret, non suffecit tamen arte paratum vulnusculum naturæ onus sanguinis amplius â se moliri intendenti, unde aliquot septimanis interjectis, initio quidem solum ex pustulâ crurum varicosorum aliquoties tantum sanguinis, quantum unum alterumque cochleare capere posset cum solutione lassitudinis crurum exstillavit, postea vero d. nempe 23. Aug. & iterum d. 4. Sept. eâ copiâ ex eadem venâ emanavit, ut justæ V.S. locum impleret: quin cum d. 5. iterum V.S. celebrarem, pauci præteribant dies, cum denuo non jam è varicosa pustulâ, sed per venæ prius apertæ jam clausæ orificium spontè apertum sub silentio noctis cruentus rivus per brachium dormientis decurreret, nec matre tamen nec fœtu ullatenus inde debilitato, quin læta d. 16. Decembr. puerpera reddebatur, cujus sinum sub & post partum itidem copiosa sanguinis unda proluebat. Hinc facile credi potest *Mauriceo* referenti *l. 1. c. 11.* se cuidam fœminæ in unâ graviditate 48. vicibus sanguinem misisse, pariterque *Stalpartio van der Wiel*, qui *l. 1. Obs. 65.* uni eidemque gravidæ in eadem graviditate 49. vicibus venæsectionem administravit.

OBSERVATIO XLVI.

*Diapedesis sub alis, inter pollices  
pedum & in dorso manus venæsectionem  
præcurrens.*

**U**T magis pateat superabundantem sanguinem claustra quâ via datur percurrere, rarum exemplum diapedesis sisto. Senator in nostrâ urbe benè meritus, jam 66. ann. temperamenti sanguineo - cholerici, habitus carnosus & εὐχρόος, qui ante 22. ann. nondum tum V.S. expertus, quovis anno circa æquinoctia congestiones ad caput cum cephalalgis æstuosis experiebatur, id tum quoque sensit, ut simul sanguis serosus sub alis & inter digitos pedum transfudaret; hæc igitur ex ipso tunc temporis cognoscens, venæsectionem commendavi, quâ annuatim circa ver postea celebratâ, & cephalalgia & diapedesis cessabat. Senatorio vero collegio postmodum ante aliquot annos adscriptus, cum ratione officii sessioni magis assvescere cogeretur, ultimisque annis & crebrius vino uteretur, & sanguis ex senii indole magis spissesceret, litandum quoque erat circa autumnum sanguine, cujus nimia copiâ depletus athleticè hætenus vivit, nisi quod non semel deprehenderit si tam salubre prophylacticum longius ob impedimenta differatur,


F.      san-



sanguis per dorsum manus transfudet & lin-  
tea tingat.

## OBSERVATIO XLVII.

### *Venæsectionis in parte affectâ in- stituta successus.*

**F**Rustra sumus nonnunquam vel solis dia-  
phoreticis & resolventibus, vel solâ re-  
vellente venæsectione *ὑπόσιν* sanguinis disji-  
cere conantes. Quin venæ ipsæ circa loca ob-  
fessa extuberantes nos ut ipsas pergurgamus  
evidenter indicant. De quo casu sicut utili-  
ter *Severinus part. 2. Chirurg. efficac. c. 34. & 36.*  
egit, ita sequentes duæ observationes id evi-  
denter demonstrant. Textoris ante portam  
oderanam uxor sanguineo-melancholica,  
cum d. 30. Sept. A. 1694. sub laborioso par-  
tu violentam imperitæ obstetricis manum  
experiretur, tumorem vulvæ cum lochiorum  
&  suppressione incurrebat; jungebatur  
eidem affectus febrilis, gravisque genu fini-  
stri dolor. Venæsectionem â me in pede sua-  
sam patiens negligens equidem sequentibus  
utebatur (1)  $\mathcal{R}$  bezoard. Wedel. ess. myrrh.  
elix. uter. (2) pulv. bezoard. Wedel. c. lap.  $\mathcal{O}$   
sem. lycopod. cinnab. (3) infusum ex radic.  
Zedoar. herb. meliss. cerefol. fl. anth. antho-  
phyll. rhabarb. myrrh. & croc. (4) cataplasma  
emolliens pro vulvâ. (5) liniment. nervin.  
pro



pro genu. (6) fotum ex allio cum cepis & cerefol. pro vesicâ, quibus etiam efficiebatur, ut tumor rumperetur, ☐ proflueret, & febris cessaret ; interim cum deinde crus etiam & pes sinister tumore, varicibusque & papulis pruriginosis obsiderentur, ac ἀννησία stupida succederet per 7. septimanas, his miseriis afflicta tandem animum monito meo applicavit, venæque apertionem in pede affecto non tam cito fieri curavit, quam ἀμ' ἐπὸς, ἀμ' ἐργον tanquam â fascino ab omnibus hisce symptomatibus plenè liberaretur. Sanguinem verò ajebat non rubicundum humorem, sed crudum quendam omnis ruboris expertem laticem exstitisse. Succedat hujus argumenti alterum exemplum. Aliûs textoris in nostrâ urbe uxor, 44. ann. habitus macilenti, status plethorici, lacticiniis acidisque libentissime & frequenter fruita, postquam menses ultra annum emanassent, licet menstruis moliminibus, v. g. dolore lienis, hæmorrhagiâ narium, & sputo cruento non careret, animo fortiter commota d. 14. Decembr. A. 1707. horruit, d. 15. mane excepit vomitus biliosus, dolorque axillæ dextræ cum sitibundo aliquo æstu : hinc sibi ipsi medicari intendens sumto purgante pejus habuit. Consultus d. 18. ego ad rheumatismum pedis dextri rubicundum variis diluentibus, absorbentibus, discutientibus, diaphoreticis internè

& externè datis decertabam, frustra tamen, licet V. S. in brachio dextro iisdem adjungerem, quâ sanguis proliciebatur, nec feri guttula instructus & tam crassa albâ cute per superficiem tectus, ut ægrè cultro scindi posset. Hinc cum parum per tot dies proficeretur, membraque imprimis circa noctem ob doloris gravitatem nonnunquam spasmodicè concuterentur, tandem mense Januario venæsectione in pede affecto celebratâ omnem tumorem & dolorem statim abscedere sensit.

### OBSEVATIO XLVIII.

#### *Erysipelas capitis ambulatorium.*

**G**enerosus Eques ex Ducatu Olsnensi 36. ann. temperamenti sanguineo-cholericæ, animi activi, post mel frequenter sumtum, iter longum peractum, gravesque curas æconomicas, d. 25. Maj. A. 1708. cum febrilibus symptomatibus initio nasum, mox totam faciem, auresque & nucham, & tandem scapulas erysipelate obsideri sentiebat. Ingraveſcebat etiam morbus, postquam partim ex terrore fulminis, partim ex tristi nuncio grandine percussarum frugum d. 27. Maj. animus graviter percellebatur, hinc enira magnæ laniationes capitis, pressoque pede deliria sequebantur, quibus per aliquot dies continuantur.



nuantibus balneator vicinus, (ignarus quod lac minime dandum sit capite dolentibus & febricitantibus) opem laturus, lac diligenter sumendum suadet. Hoc igitur dum ad palatum ægri esset, ille libenter obtemperando id consequebatur, ut & anxietates præcordiales orirentur, & reliqua etiam symptomata potius intenderentur quam decrescerent. Interim ut à molestâ periculumque illatura sarcina se natura liberaret, ecce vomitu spontaneo lac in verum caseum condensatum excludebatur d. 4. mitigatis inde statim, quæ præcordia & caput vexabant symptomatibus. Sane cum d. 5. Jun. evocatus ægrum accederem mirabundus contemplabar duo grandia frustra lactis in densum caseum ita egregie coagulati, ut villica melius nequivisset: reliqua carebat deliriis, nec symptomata aderant admodum mala, nisi quod exacerbatio horâ 12. diei & noctis semper observabatur, cui mitigandæ quidem pulverem dabam ex lap. ☉. bezoard. miner. cinnabar. & ☉. mane & vesperi sumendum, ast quia ob magnum labiorum tumorem vix capi posset, mixtura simplici c. ess. scord. item potione ex ▼ scabios. borrag. fl. til. scorzon. cinn. borr. c. pulv. bez. senn. sir. acet. citri diaphoresin promovere studebam, imposito etiam exterius pulvere erysipelatode ex farin. fabar. fl. sambuc. radic. irid. florent. myrrh. ceruss. & camphor. â

quibus adhibitis d. 6to placidè dormiebat, egregrè sudans, imprimis cum jam in mado-rem propenderet, ☐ enæoremate instructa erat, ob sitim serum caprinum cupienti id indulgi, ordinata quoque hodie potio ex decoct. citr. c. scorz. & C.C. præter iteratam positionem diei hesternæ, d. 8. ex litteris percepi erysipelatosum tumorem faciei subsidere, at labium inferius pectus & dorsum ad lumbos ferè eodem obsideri, ☐ erat rubicundior, quam nuper, clara, serum caprin. præ aliis potulentis arridebat: missi pulveres quatuor ex lap. ☿. ʒ d. & ☉. insuper potio, mixtura & pulvis erysipelat. d. 5to. ordinata, præter ☉ dulc. in potum; inde suaviter per diem dormivit, redeunte paulò appetitu. D. 11. significatum, d. 9. circa tertiam p.m. æstus aliquem iterum deprehensum fuisse ac erysipelas dorso relicto in pectore & brachiis efflorescere non sine dolore sub axillis, ☐ erat rubra. Interim dum in usu dictorum pergeretur, d. 15. erysipelas penitus disparebat, nisi quod subinde macula aliqua rubra effloresceret, unde viribus, appetitu & somno redeunte nullisque amplius sub ulteriori adhibitione laudatorum medicamentorum signis erysipelatis reliquis, d. 20. potione ex ∇. laxativ. Vienn. c. fir. d. cichor. c. rhabarb. curam obsignavi. Cæterum ut solet cuticula ubivis abscedebat. De caseo in ventriculo

ex lacte coagulato vide observationem Bartholinianam. Dec. 1. Misc. Nat. Cur. A. 2. Obs. 163.

## OBSERVATIO XLIX.

### *Hæmoptysis gravida immodica.*

**U**Xor scriniarii cujusdam ante portam S. Nicolai 33. ann. habitus macilenti per 20. Sept. gravida, post lapsum in bacchanalibus ob viam lubricam coccygem doluit, cumque quod illi non insolitum d. 22. Febr. A. 1712. admodum irâ excanduisset, d. 23. cum tussi parum sanguinis expuit, accessit dolor in abdomine & pressio circa thoracem. Cum vero d. 25. denuo cum tussi initio modicum sanguinis expueret, mox vero enormem cruoris ejusque floridi & spumosi copiam ceu rivum effunderet, maritum vehementia morbi ad auxilium quærendum adegit. Consultus, ut mos est vulgi, ante medicum balneator ex viciniâ sanguinem ê brachio eumque variegatum feroque carentem eduxit, interim dum nihilominus hæmoptysis iterum vesperi urgeret, maritus d. 26. trepidans porta vix reclusa me ut præsens uxorem inviserem instanter rogabat; accedens igitur ægotam de quantitate sanguinis profusi percontor, respondet maritus, adstantibus idem affirmantibus, se aliter credere non posse, quin



sanguinis ad 6. mensuras effusum sit, plura enim vascula cruore fuisse impleta, præter id quod copiose in terram dispersum sit; ægra ipsa se pedes heri frigidos habuisse ajebat, cum circa pectus & caput æstualet, adhuc se pectori quasi pondus incumbere sentiens, sie sagte/wo ihr der Husten zurücke bliebe/müsse sie ersticken. In abdomine percipiebat tormina ac in artubus vagas lancinationes, cum aliquâ horripilatione, de fœtido odore una conquerens; alvus his diebus sicca scybala dejecerat, obtutus erat vividus, licet pulsus parvus & tardus esset, motus fœtus inquietus. His auditis ante omnia clysmate emolliente strictionem alvi laxare conabar, quo præter scybala & pituitam nil amplius proliciebatur. Datus deinde pulvis ex lapid. ☿. corall. r. ☉ arc. dupl. cinnabar. & conch. præp. præter emulsionem c. ▽. cord. b. cerefol. millefol. plantag. ex amygdal. externe impositus panis mellitus Norimb. c. nucist. caryoph. & bals. embryon. A primâ dosi pulveris paucâ quantitate cruorem coagulatum vomebat, alterâ tamen dosi tribus horis interjectis propinata remanente. Hinc in abdomine & artubus dolores vagi sensibiliter imminuebantur, licet caput cum aliquo æstu adhuc doleat, & circa pectus idem status maneret. Imperata lenis postea extremorum frictio, à meridie verò duo pulveres ex lapid. ☿. cin-

cinnabar. ① & spec. de hyac. sumebantur. D. 27. percipio ab his pulveribus bonum levamen secutum, & in somno robur, dolores reliqui ferè cessabant, nisi quod caput parum adhuc doleret, pressionem circa pectus cum odore foetido discussam aiebat, pulsus erat fortior & motus foetus salvus: interim quod circa diaphragma & abdomen duritiem sentiret, & se intumescere crederet, dedi rhabarb ad ʒj. inde quater commodè dejecit; postea adhuc pulveres ultimo præscriptos denuo repeti jussi, sicque restituta ægra debito tempore sanissimam puellam peperit, quæ adhuc est in vivis: ἐνέργειαν ultimorum pulverum ita deprædicabat, ut diceret, se tota sua vita efficacix istorum pulverum non oblituram.

## OBSERVATIO L.

### *Fistula capitis curata.*

**G**enerosus & opulentus Eques ex Ducatu Olsnensi 54. ann. temperamenti sanguineo-cholerici, habitus carnosus, faciei que rubræ, in pueritia frequentem hæmorrhagiam narium & in juventute hæmoptysin passus, dum suo genio indulget seque lautis conviviis quotidie quasi oblectat, satis maturè podagram incurrit; cum igitur 50. annor. ætatis attingeret, nescio ex quibus rationibus celeberrimi duo medici ulteriorem venæse-

etionis (cui diu assueverat) usum eidem dissuadent, inde vero post duos circiter annos in pleuritidem spuriam delabebatur. Evocatus tunc ad ipsum & post varias quæstiones ægri statum edoctus statim ut V. S. reassumeret suadeo, nisi fecerit, varia dolorifica symptomata, vel hæmorrhagias circa sequens ver passurum prædicens. Ast quod ob ingravescentem ætatem priorum medicorum consilium sibi salubrius futurum reputaret, nonitum meum neglexit, neutiquam tamen impunè, siquidem mense Februario A. 1705. post horripilationem ac æstum lancinatorio axillæ dolori junctum partim cùm scretu, partim cùm tussiculâ, imo cum vomitu etiam ad mensuram ferè sanguinis successivè excernebat. Evocatus tunc iterum acriter V. S. mense Martio commendo, furdo tamen denudò narro fabulam. Hinc cum despumationem podagricam initio Martii nimis moleste ferret, imposito malè proprio consilio, (quod sæpe fecerat) emplastro stictico, influxum quidem ulteriorem in pedes impediebat; ast periculosâ *μετάσσει* fauces anginâ, & caput catarrhis exinde obsidebatur, quibus symptomatibus medicamentis meis discussis, sequente Junio ophthalmiâ utriusque oculi correptus, ferò tandem discebat, cui potius parendum fuisset. Proinde postea libenter venam secari sibi passus, & deinceps

fatis



fatis commodè per annum degens, cum tertio anno iterum V. S. commendarem, comminatus nisi obtemperaret priora pericula; ipse tamen, quod fortassis thesaurum vitæ hac ratione depeculari crederet, incerta potius vel ficta pericula denuò experiri penes se constituebat, quam iterum animum ad tam salutare, sibi que quam maximè congruum remedium adjicere. Interim dum sensim lancinationes circa pectus cum dyspnœâ, tussi humidâ, lassitudine artuum, & catarrhalibus defluxionibus circa partes capitis redeunt, novumque pathema, fluxus auris sinistrae serosus accedit, ineunte vere A. 1709. sub vento frigido profectus, initio rheumatismum circa pectus, cum sputo aliquo corrupti sanguinis, mox eundem in capitis latere sinistro, eumque inflammatorium summeque dolorificum incurrebat. Hunc medicus Olsnensis curans, dum suppuratum balneator nimis maturè (nondum sufficienter exterso pure) consolidat, fistula emergit propè aurem sinistram triplici foramine, quorum unum aurem perforabat, conspicua. Vanam igitur noster æger per aliquot Sept. balneatoris medicationem expertus, effluente semper ex fistulâ copioso pure sanguinolento, partim crasso, partim tenui, in urbe meum consilium exquirat. Inspecto ulcere, illud alio modo quam incisione chirurgicâ sanari non posse

posse pronuncio; paret ille libens. Proinde universalibus præmissis, feria tertiâ Pentecostes, dies erat 21. Maj. evocatus solus cum balneatore suo hætenus chirurgus operationem ita aggrediebar. Sectione cum forcipe (cujus unum crus in fine globulo præditum erat) citra magnam hæmorrhagiam peractâ, cuniculis detectis liquor ex  $\nabla$  Calc. viv. ceruss.  $\phi$  d. & camph. injiciebatur, cranii particulæ aliquantulum cariosæ pulvere ex rad. irid. flor. aristoloch. rot. myrrh. aloë & euphorbio adperso. Hinc cavitatibus cuniculosis linteo carpto prædicto liquore madido expletis emplastrum de betonic. & huic sacculi ex herb. congruis vino incoctis cum conveniente deligaturâ imponebantur, interne dabam unam atque alteram dosin pulveris ex arc. dupl.  $\textcircled{D}$  lap.  $\textcircled{S}$ . conch. corall. cinnab. & ess. cit. ficc. compositi. D. 22. sponsia compressâ  $\phi$   $\textcircled{S}$  tato parum conspersâ & cavitati immisâ benè ulcus mundabatur â meridie exemtâ. Huic igitur methodo chirurgus insists applicatis deinde sarcoticis fistulam ex voto clausit. Ipse vero generosus Dominus patiens moniti deinceps mei de V. S. celebrandâ quam maximè memor, commodè hucusque degit, â congestionibus circa petus & caput ferè penitus liber.

## OBSERVATIO LI.

*Hæmorrhoidum immodicus fluxus cum earundem dolore & tumore.*

Quam enormes hæmorrhagias aliqui citra vitæ dispendium tolerant, & quam circumspicte iis, imprimis hæmorrhoidum nimio fluxui sit medicandum, sequens docebit observatio. Eques generosus ex Saxoniâ inferiori 45. ann. temperamenti sanguineo-cholerici, habitus compacti & densi, gulæ iræque indulgentior, hæreditatis adeundæ causâ in Silesiâ per plussculum tempus commorari coactus, ibidem totâ hieme â genero ditatissimo quotidianis quam lautissimis epulis vino Hungarico madidissimis excipiebatur. Ego igitur ab ipso sanitatis suæ causâ consultus, cum audirem, quod hæmorrhoidum fluxu menstruo, eoque largo, (siquidem sanctè affirmabat rarò infra unius mensuræ modum menstruum suum virile absolvi) â decimo sexto ætatis anno ad præsentem quadragesimum quintum exerceatur, acriter quidem suadebam, ut sibi â nimietate crapulæ & οἶνοπρῶσις, fermentoque bilis quam sollicitissimè caveret, nisi circa ver (quo tempore Hippocratis super experientiam fundatissimo effato hæmorrhagiæ, earumque exacerbationes statâ naturæ lege obtingere solent) peri-



periculosum nimium hæmorrhoidum fluxum subire velit, imprimis dum jam mense Januario A. 1711. ex hæmorrhoidum diuturniori paulò restagnatione capi plenium, ut *Baglivius* loquitur, & hæmorrhagia narium ipsi contingeret, quorum utrumque tum sectâ venâ in pede hæmorrhoidibus promotis cessabat. Interim dum noster monita mea negligendo per hiemem strenuè pergracari non desinit, iterque d. 3. Mart. hæmorrhoidum fluxu jam præsentè ingreditur, in quo ob pessimam viam partim succussatione violentâ currus corpus quati necessum, partim ob periculum excussionis è curru vitandum, sæpe aquæ nivales pedibus pervadendæ erant, animo sic non minus ex tam incommodo itinere quam corpore agitato, ecce fluxus hæmorrhoidalis ita invalescit, ut narrante postea ægro, vena ani instar gutturnii sanguinem fundere non cessaret. Quia igitur non solum ex tam enormi fluxu, quam juncto simul tumentium hæmorrhoidum dolore vires deficerent, balneator vicinus venam brachii incidit, tumentesque hæmorrhoides aperuit, emplastro quod lithargyrio maximam partem constiterat, postea imposito. Ast quod hæc auxilia tam periculoso morbo penitus tollendo non sufficerent, d. 8. in urbem vectus me accersito ante omnia de stupendo suo fluxu hæmorrhoidali me certior

rem

rem reddebat, affirmando, se credere, (quod tamen Anatomici nunquam credent, qui norunt non facile ultra 30.  $\text{H}$  hominis iusta staturâ gaudentis corpore contineri) quod his diebus penè 16. mensuræ sanguinis ex arteriis effluerint, qui sanguis simul tantæ acrimoniæ fuerit, ut cutem, quâ contigit, imo papyrus eroderet, quam acrimoniam sumtis quotidie in Saxoniam falsis infumatisque cibis adscribebat. Cæterum quod hæmorrhoidum fluxus per intervalla cum pulsus viriumque debilitate rediret, ægerque facie valde collapsâ, & si ob tenesmum (quo tamen saltem flatus excluderentur) adsellare stimularetur, totus trepidans & in ἐκλυσιν pronus cerneretur, non poteram (gnarus licet, quod celeberr. Wedelius purgante hæmorrhoidalem fluxum feliciter aliquando stiterit) ad evacuans animum applicare, undè solum ordinabam mixturam ex essent. millefol. c. ess. cortic.  $\odot$ r. &  $\sim$   $\odot$ d. remixtam, pulverem item ex  $\text{g}$   $\text{g}$ ,  $\odot$ , corall. cinnab. & ess. cit. sicc. denique pro fotu (ne externorum confortantium mentionem faciam) verbasco. chamom.  $\text{R}$ . & violar. in lacte cocta, quibus adhibitis à meridie pulsus paulò fortius micabat, à somno tamen confusus, sui que ad temporis aliquot momenta ignarus erat, fluxus continuabat, in vitri  $\square$ nalis lateribus copiosius  $\ominus$ ini crystalluli comparebant. D. 9. post somnum

somnum eadem mentis confusio , ira conceptâ bis dejecerat, flatus jam quasi nulli, tenesmus cum tremore magno totius corporis, omniumque artuum, (quem semper his septem diebus senserat) adhuc durabat, hæmorrhoides cum dolore protuberabant; iisdem medicamentis hodiè continuatum, d. 10. ter multum dejecit, totâ nocte ἀγρυπνος, tenesmus adeò urgebat, ut tremens sellæ insidens in ἐκλυσιν tenderet, flatus iterum & sanguis prodibant. Præscriptus tum pulvis contra abortum Aug. & spec. de hyacinth. c. ① & eff. cit. ficc. pro 2. dosibus, item suffitus ex verbasco. c. colophon. & mastich. Effectus erat, ut à suffitu multum albæ pituitosæ materiæ per alvum excerneretur, & à pulvere sibi juvamen accessisse diceret. D. 11. benè quidem dormiverat, ast tenesmus cum tremore totius, doloreque & hæmorrhoidum fluxu continuabat crebrò, proin datus pulvis idem finè ①; licet igitur d. 12. somnus pariter succederet, tamen post suffitum & pulverem hodiè manè sumtum dolorem circa pectus & anxietatem præcordialem sentiebat, ut quo se verteret nesciret; dedi proin pilulas Stahlian. quibus effectum, ut dejectione præviâ d. 13. hæmorrhoides iterum, ut prius, fluerent, cum tenesmo & sensu ardoris in intestino; quod igitur jam & vires ægri permitterent, nec æger amplius refragaretur,

clysma





clyfma injeci ex decoct. furfur. tritic. c. ver-  
basc. & vitell. ovor. & poſtea pulverem pro  
2. dof. ex ꝯ ꝯ, dent. hippop. nitr. corall. cin-  
nab. & eſſent. cit. ficc. porrexi ; hinc d. 14.  
benè dormivit, pullusque iterum magnus &  
plenus reddebatur, licet hæmorrhoides ad-  
huc fluerent, quarum jam tumor diſcuſſus  
erat, utut dolore non penitus carerent, & te-  
neſmus cum dejectionibus adhuc aſſeſſet.  
Suafi igitur infuſo millefol. theiformi jam  
uteretur c. cinn. & mac. enemaque idem de-  
novo injici curaret. D. 15. audio ſtatum eun-  
dem eſſe, anxietatemque poſt paſtum adhuc  
ſentiri, pulverem benè conduxiſſe, dedi elix.  
ſtomach. cum baſſamico Hoffm. & ma-  
ſſich. it. pulverem ex ꝯ ꝯ, corall. nitr. dent.  
hippopot. cinnab. & eſſ. cit. ficc. D. 16. nulla  
mutatio. D. 17. pruriebat anus in ambitu,  
quædam adhuc indicia ſanguinis inter deje-  
ctionem alvi, anxietas poſt paſtum penitus  
ceſſabat, cui dolor pedis ſucceſſit, datus pul-  
vis ex ꝯ d. nitr. lap. ꝯ. dent. hippop. cinnab.  
& eſſ. cit. ficc. D. 18. totâ nocte ſudavit, do-  
lor pedis deſiit, cum dejectione alvi tenuis  
& aquoſus ſanguis prodibat, hæmorrhoides  
denuo cum pruritu protuberabant. D. 19. ite-  
rum copioſus ſudor ſecutus. D. 21. penitus  
& fluxus & tumor hæmorrhoidum ceſſabat,  
pruritu ſolum aliquo reſiduo, hac & priori-  
bus duabus diebus quaſi purulenta ſanies

G

deji-

dejiciebatur. Cum itaque benè degeret, meam præsentiam amplius non requirebat. Interim notari meretur pruritus ani non prius ex integro defuisse, quam cum sumto adversus nauseam ♀ emet. gr. iij. duodecim vomitus & sex dejectionibus biliosas frustis pituitosis intermixtas consecutus esset, hoc enim facto & pruritus ani desiit, ac æger sanus & vegetus evasit ac permanfit, hæmorrhoidibus deinceps mensruis rite fluentibus.

## OBSERVATIO LII.

*Variolæ nigræ maculis scarlatinis in fine exceptæ.*

**P**rimarii litterati in urbe nostrâ filiola 2. ann. sanguineo-phlegmatica. A. 1711. d. 1. Januar. febris corripitur cum vomitu & pavorè, jacebat torpida. Vocatus d. 3. potionem ex ∇ fl. til. scabios. acac. card. ben. c. conch. C.C. phil. ꝯ d. & sacch. perl. præscribo; circa vesperam epilepsiæ accessus. D. 4. variolarum indicia: continuatum in usu potionis. D. 5. & 6. sedes justo molliores, sternutatio frequens, initium ophthalmiæ in uno oculo, cui ∇ rosar. c. croco prospectum. D. 7. oculi clausi, variolæ sessiles, per vices phlogosis vaga & fitis, facies tumescere incipiebat, mucus narium copiosus, bis sicca dejiciebat: daba-




dabatur (1) potio ex decoct. scorz. c. C.C. citr. fir. rub. id. & acetos. citr. alternatim cum potione priori (2) eff. alexiph. Stahl. Mane d. 8. inclinabat in somnum, □ involuntariè bis excernens, interstitia variolarum in fronte non rubebant, ubivis fessiles cum foveis, in artubus aliquæ depressæ & nigricantes, aliæ puncto nigro in medio insignitæ, plurimæ adhuc perpusillæ variolæ prodibant; alium plantis pedum applicatum somnolentiam non minuebat, quin semper somnolenta jacens alloquio solum vel turundâ naso immisâ, aut ʒss amygd. dulc. c. facch. canar. illito paulo excitabatur, alias sibi constans, facileque respirans, gargarismate injecto multum mucieliciebatur: eff. alexiph. Stahl. R bez. Wedel. & pulveri ex conch. lap. ʒss. ʒss d. tantillum myrrh. & essent. cit. sicc. remiscebatur. D. 9. circa noctem oculos incipiebat aperire & lætior morbi facies affulgere, noctu & hodie mane liberè loquebatur, citra omnem raucedinem, vel tussim, ferè animi existens, variolæ exsurgabant cum intumescentiâ faciei & manuum, aliquæ quæque jam maturabant, sparsim cohærentes, copiosa phlegmatorrhagia narium, parum vero erat quod injectionibus eliciebatur: continuatum in usu dictorum. D. 10. nox iniquieta & insomnis, fitis magna, variolæ exturgebant, in facie plures maturæ prurientes,



tes, in manibus quoque turgebant, respiratio bona, pituitæ fluxus è naso, ☐que excretio copiosa, alvus ab aliquot diebus obstructa, à meridie somnus obrepebat, mox tamen inquietudine exceptus, interstitia variolarum ingenis quidem rubebant, neutiquam verò illarum, quæ in fronte, manibus, brachiis & alibi extabant, fiebat valde, continuo potum poscens, alvus semel sicca dejecit, noctu accessus epilepticus levis prævio fridore dentium secutus, contraitum pulvere ex ꝯ d. lap. ☉. conch. cinnab. & ess. cit. sicc. D. i i. nox adhuc inquieta, semper querela de siti, undè potum avide anhelabat, noctu stridebat dentibus, linguam continuo exferebat, tremebant brachia, summa epilepsia erumpebat, ☐ copiosa, variolæ jam turgebant, in ambitu rubentes, aliquæ valdè magnæ (illæque in artubus) nam quæ in facie erant, continuo affricu ad lectum jam pridie ruperant, nasus obstructus, quem nullo modo sibi referari pariebatur, uti & injectiones refugiebat: ordinata potio præter ultimo dictos pulveres ex ▼ fl. til. ceras. nigr. scorz. cinn. borrag. c. aliquot guttis Spirit. C. C. succ. & sir. pœon. compos. ad tertiam usque noctis æstuabat, continuo potum poscens, inde quieti reddita d. i 3. serenioris animi erat, alvum bis deponens, unà lumbricum digiti longitudine exclusit, cum prius nullos vermes





mes deprehenderint, ☐, ut semper, copiosa; variolæ in manibus & pedibus maturabant, aliquæ, & imprimis grandiores, vesicam splendentem æmulantes, alvus aperta: loco prioris mixturæ dedissent. scord. & radic. pimpinel. pulverem vero eundem. D. 14. fitis eadem, æstus tamen circa noctem levior fuit & brevior, ☐ copiosa, obtusim data potio ex decoct. C. C. c. scorz. pectoral. c. fir. violar. à meridie alvus aperta, fitis minuebatur, variolæ scetebant, in somnum inclinabat, pedum tumor oriebatur, illarumq; variolæ plures adeo magnæ erant & lividæ, ut globuli, quibus pueri ludunt. D. 15. æstus noctu major quam heri, pariter & fitis, bis dejecit, in soleâ pedis prope minimum digitum una variola magnitudine globi livida, pariter nonnullæ talis coloris viscebantur supra pedum digitos, reliquæ in pedibus (qui valde tuebant & per totum rubebant) pure flavo erant turgidæ, malè coloratas mater discindebat, tumori pedum erysipelaceo pulvis ex farin. fabar. fl. sambuc. rad. levistic. irid. flor. myrrh. ceruss. & camph. inspergebatur; inquietudo querula continuabat, fitis tamen modica, è naribus copiosa flava spissa materia effluebat; vesperi in pectore, abdomine & cruribus latæ rubræ æquales maculæ efflorescebant, & quidem non *δυσφορέως*, cum blando postea somno frueretur. D. 16. ejulabat præ

anxietate & dolore, circa os sacrum duo foramina, ubi nigræ variolæ fuerant, viscebantur, lividæ magnæ variolæ heri discissæ denuò turgabant, pes dexter adhuc tumebat, quamvis mitius æstualet, fitis tamen erat urgens, oculi materia viscidâ madentes,  copiosa, alvus aperta: propinata potio ex  $\nabla$  scorzon. scabios. scord. cinn. borrh. pulv. bezoard. Senn. fir. acet. cit. Oculis prospectum collyrio ex  $\nabla$  chelidon. maj. rosar. euphras. sacch.  $\hbar$  nih. alb. usus etiam prioris pulveris continuatus, ulceribus circa anum myrrh. & ceruss. inspersa, unde valde deliniebatur: à meridie  $\epsilon\upsilon\phi\epsilon\rho\omega\varsigma$  degebat, pes detumescebat, mitior erat fitis, maculæ adhuc durabant. D. 17. nox  $\alpha\gamma\rho\upsilon\pi\pi\upsilon\varsigma$ , querula erat, per vices tamen tranquilla, nasus crustâ nigrâ deformis, quem cerevisiâ secundariâ lixivio alteratâ ut madescerent jubebam, maculæ rubræ ut hætenus: à meridie in pronâ jacente puellâ duo ulcera in natibus profunda & ampla, in femoribus verò (ubi nempe variolæ nigræ hæserant) alia sex, quanquam angustiora cernebam; in fronte sub crustâ nigrâ pus acre stagnabat, plorabunda, inappetens, ast minus siticulosa, vix amplius medicamenta admittebat, dabatur tamen decoctum ex scorz. c. C.C. & rad. farsapar. ulcera decocto ex scord. myrr. aloë & melle rosar. abstergebantur, quibus postea pulvis prædictus inspersus, D. 18. somnus

suc-



succesfit, maculæ disparebant, appetitus redibat carnis, alvus aperta. Ubivis ubi nigræ variolæ fuerant, iis excedentibus, succedebant ulcera in natibus, femoribus & cruribus, quibus ungu. alb. coct. applicabatur, d. 29. ἀπύ-  
 εστ , benè dormibat, quietior, d. 20. eadem, nisi quod non appeteret, variolæ tres in facie surgebant statim maturescences, in extremitate unius digiti pedis excrescentia emergebat instar cornu sicca & dura, coloris cinereo-fusci, atra crusta nasi fotu prædicto emolliebatur, ast in facie aliæ crustæ alias excipiebant, somnus appetitusque redibat, cum alvi &  excretionem quotidianâ, febris jam constanter carensprehendebatur. D. 21. in facie iterum tres furunculi surgebant. D. 22. ulcera decoct. scord. fl. rosar. rub. & myrrh. abstergebantur, quibus postea pulvis laudatus inspersus. D. 23. lata erat, ridens, in brachio enata quatuor ulcera: semper usui in & externorum insistebatur. D. 27. lata vestibus induta comparebat, sudabat jam minus, (siquidem ultimis diebus sudores accesserant) ulcera plura ad consolidationem tendebant. D. 29. in facie manibus & pectore iterum furunculi aliquot enati. D. 31. in brachio sinistro prope axillam tres furunculi grandiores extuberabant, quibus empl. diachy. c. g. impositum, sicut ulceribus manantibus empl. de cerussa & lap. calamin. adhibebatur,

ulcera optimè sanabat. D. 4. Febr. furunculi adhuc durabant, in soleâ pedum prope pollicem cuticula cum cornea substantia abscesfit. D. 5. furunculus maximus rupit, ulcera ubi-vis complanata, solum in fronte & naso una adhuc & altera nigra crusta restabat, è naso muci copia fluxit: postquam igitur in usu pulveris ex lapid. ☿. & ♂ d. hæctenus quotidie continuatum esset, d. 12. therapiam periculosisimi hujus morbi ad finem deduxi, portione ex ∇ laxat. Vienn. ℥β. pulv. jalapp. gr. iv. ☿ d. gr. iij. & sir. de cich. c. rhab. ʒj. cujus beneficio 8. sedes effectæ. Et sic plenissimè divina gratia gratiosissima jam puella convaleuit. Sanè vim *αὐτοκρατεῖντος* naturæ præfertim in variolis & morbillis multoties expertus, id semper mihi agendum esse statui, ut blandissimè saltem diaprnoën in hisce morbis promoverem, nunc *ὀργασμὸν* nimium depressimendo, nunc torporem naturæ leniter excitando, quâ ratione id consecutus sum ut plurimum feliciter, rarissimè funestè decurrerent, ægrotique iis salutariter defungerentur, qui adstantibus mortem non nisi miraculo evasuri credebantur.



## OBSERVATIO LIII.

*Clavus super orbitam oculi periodicus unice ferè sanguinis educatione iterata superatus.*

**H**onesti cujusdam Senioris è tribu futurum uxor 46. ann. habitus longi, carnosus & compacti, animi virilis, postquam à 3. annis menstrua desissent, quanquam molimina quædam menstrua adhuc sentiret, post varias & graves animi curas & abusum falsorum, hieme A. 1709. immemorabili frigore horrente d. 1. Febr. angustiam constrictivam pectoris c. dyspnœâ, loquelâ impeditâ & summâ hemicraniâ lateris dextri non sine ☐ lixiviosâ incurrit: pediluvio igitur à domesticis proprio consilio instituto, mox quidem capitis dolor maximam partem desit, ita tamen, ut crus dextrum stupidum & ad motum impotens redderetur. Hinc V.S. in brachio celebrata & recurrente d. 3. hemicraniâ (ut non insolenter paroxysmare alternis diebus suevit) meum consilium poscebatur. Quia igitur jam V.S. facta fuerat, ex re ægræ futurum non credebam, si illam denuo celebrarem, unde potius medicamentis incubui, quibus effectum, ut capitis quidem dolor fileret, interim motitationes adhuc in dorso perciperentur, quas d. 4. præviâ dorso horri-



pilatione, manè constrictio thoracis & dolor  
 capitis oculique summus iterum excipiebat:  
 proin in tam *εὐσδέκῳ* & plethorico corpore  
 V. S. in pede dextro instituere certus, eâ cele-  
 bratâ in momento spasmodica thoracis con-  
 tractio ex toto, cephalalgia verò maximam  
 partem definebat, subsequo hinc somno  
 quieto. Interim quamvis paroxysmum, d. 5.  
 pediluvio præverterem, dolorque supra ocu-  
 lum statâ horâ mitius rediret, □que hæcenus  
 rubræ & crassæ emendarentur, tamen (non  
 neglectis licet ante paroxysmum pediluviiis,  
 alvi etiam ad stypticitatem inclinantis expe-  
 ditione, adhibitisque etiam variis diluenti-  
 bus, discutientibus, & demulcentibus, inter  
 quæ erant pulveres ex ꝑ, cinnab. nitr. & dent.  
 hippop. constantes) paroxysmus præviâ sem-  
 per cutis horripilatione & pedum frigore, ci-  
 tra tamen pulsus celerem calorem & sitim,  
 quotidie mane horâ septima redibat; ubi no-  
 tabile erat, quod unicè in oculo dextro & su-  
 pra supercilium ejusdem oculi latitudine du-  
 cati tactum refugiens dolor sine rubore & tu-  
 more confisteret, adeo tamen ferociens, ut  
 mulierem robusti alias animi ad diros ejula-  
 tus & cursitationes in hypocausto adigeret,  
 finiebatur quidem dolor hâc vice post meridi-  
 em, postquam ægra prius sonitum bombardæ  
 explosæ sibi audire sensisset, ita tamen ut pal-  
 pitatione cordis, pungitivo pectoris, lanci-  
 nan-

nanteque artuum vago dolore, ac contractione digitorum exciperetur. Continuabat igitur hâc ratione invasio, (cui d. 8. maculæ artuum scorbuticæ cum stranguriâ jungebantur) filumque curationis ad. d. 9. quo die dum paroxysmum scarificatione inferiorum & ventosarum applicatione prævertere animus esset, ecce iterum sibi videbatur als schiesse man ihr ein Pistol durch den Kopff / & quasi una examen apum capiti suo circumstrepere. Nihilominus secretionibus & excretionibus humorum sic liberis factis, (siquidem postea alvus morigera reddebatur, fluebantque toties quidem optati, nondum tamen adhuc visi sudores) appetituque & somno redeunte, post unum alterumque diem sanitas quoque ex voto redibat. Confer de tali periodico clavo super orbitam oculi vere frequenti *Welsch. in miclomen. Dec. 1. Misc. Nat. Cur. Ann. IV. p. 32. 33. item Sylvaticum Cent. 1. Consil. 30. & 31.* Quicumque ex hâc observatione non cernit, quam necessariæ & utiles sint sanguinis missiones in corporibus statu oneroso spissoque sanguinis obsessis (cui si acrimoniam salinam junxeris scorbuticus Proteus facile excluditur) ad procurandos liberos successus se - & excretionum humorum (in quarum justo progressu & effectu sanitas verè continetur & reducitur) reliquorumque medicamentorum δύναντιν juvandam, næ quod

quod is nimium suis præjudiciis excæcatus sit credere oportet. Confer de insigni usu hirudinum parti affectæ in hemicraniâ singulis diebus certâ horâ recurrente applicatorum *Dec. 2. Misc. Nat. Cur. A. 9. Obs. 141.*

## OBSERVATIO LIV.

### *Carus.*

**F**Amulus cujusdam officialis serenissimi Principis Comitis Palatini Caroli, 26. ann. temperamenti melancholico-phlegmatici, faciei pallidæ, Heidelbergâ patriâ relictâ Hamburgum & Dantiscum concedens, ibique tam piscibus infumatâque & muriatâ carne per bonum temporis spatium famem sæpe levare, quam corpus ex muneris ratione variis injuriis aëris exponere coactus, postquam abusus tabaco, tam pulveris formâ in nares tracto, quam fumi ore hausto, ejus quoque usum ex abrupto intermisisset, ac deinceps Vratislaviæ copiosius & frequentius lacte fruitus fuisset, præviâ taciturnitate insolentiori vertiginem caducam cum dolore capitis gravativo incurrit; cui tollendæ DN. suasu initio quidem, mox V. S. fuit instituta, ast successu parum salutare, successit enim mense Septembris A. 1713. sopor tantus, ut per tres dies, quicquid adstantes molirentur, semper tamen eodem creberrimè opprimeretur. Cum  
igi-



igitur deinceps nullâ arte ipsum excitare quirent, me d. 22. Sept. consulebant. Vocatus proinde contemplor hominem instar trunci oculis oreque clauso decumbentem, cujus sopori ineluctabili cum acclamationes & frictiones non sufficerent, jubeo cum excutiâ & statim  $\ominus$  aceto soluto plantas pedum fortiter fricari, quo facto artus quidem inferiores movebat, ast oculi osque adhuc clausum remanebat: ut igitur naturæ torpor, spiritusque glutinosi succis intricati excitarentur, jubeo mixturam ex  $\sim$   $\ominus$  \*c. fortiss. & lil. convall. à quovis semihorario spatio in  $\nabla$  lil. convall. & hyssop. infundi, exterius vero naso, vertici & temporibus  $\sim$  apoplecticum c.  $\sim$   $\ominus$  \*c. & o<sup>o</sup> spic. roboratum, denique o<sup>o</sup> cinn. & origani linguæ applicari. His effectum, ut concurrentibus fortibus & continuis frictionibus, post horam effluxam, pauca quædam loqueretur, mox tamen iterum sopori immersus. D. 23.  $\alpha\phi\omega\nu\sigma$ , licet, annuebat tamen, quæ sitis varia, oculi erant quasi ebriosorum, (wie gläsern/) facies ex pallido flavescens, pulsus celerior, interdum suspirabat profundè, ab alvo tenuia semel dejiciens: prioribus jungebantur hodie pulvis sternutatorius ex castor. hellebor. alb. o<sup>o</sup> spic. rutæ irroratus, tum pro interno usu pulvis ex cinnab.  $\ominus$  \*c.  $\S$  d. lap.  $\odot$ . eff. cit. ficc. denique nuchæ & artubus vesicatoria admovebantur, quæ tamen solum in nuchâ,

châ, neutiquam vero in brachiis & femoribus  
vesicas excitabant, â sternutatorio per nares  
& os copiosissima gluten æmulans pituita  
cruori mixta effluebat, frictiones calidæ in-  
cessanter continuabantur, lingua sale fricaba-  
tur, faucesque cochleari mundabantur. His-  
ce continuatis post gravia suspiria noctu  
edita d. 24. ratio & loquela mane redibat,  
exponebatque deinceps mihi invisenti riden-  
te vultu & serenis oculis rationem prioris  
sux vitæ. Hinc propinavi pilul. cephalic.  
purgantes, & ad iter cum Domino suo ingre-  
diendum spec. ex rad. helen. h. salv. majoran.  
trif. fibr. rosm. sassaf. cardam. pro inf. theiform.

## OBSERVATIO LV.

### *Croci nimia dosi sumti noxa.*

**S**utoris ancilla 18. ann. cum ad reseranda  
menstrua consilio cujusdam fœminæ,  
(quæ propriâ experienciâ plus vice simplici  
croco cum lacte calido diluto & debitâ dosi  
sumto menstrua efficaciter provocaverat)  
idem remedium adhiberet, sed eâ quantitate,  
quæ pondus ʒj. excederet, obtinuit quidem  
ut vix post horæ effluxum menstrua per tri-  
dium croceo colore tincta procederent, ast ob  
nimis turgescit sanguinem una ardorem  
in interioribus, anxietatibus tantis per inter-  
valla creberrima recurrentibus stipatum sen-  
sit,

fit, ut in lecto nullo modo decumbere, sed noctu ac interdium confidere cogeretur; aderant quoque propensio in somnum, dyspnœa, inflatio colli, ventriculi & abdominis, æstus externus, tremores artuum, ut stare non posset, ruborque corporis totius scarlatinus. In his angustiis igitur per duos dies constituta, d. 28. Julii, A. 1714. vesperi consilium meum requirebat; proinde pro ὀψυασμῶ sanguinis sedando misi duos pulveres ex arcan. dupl. ☉, pulver. conchar. ostrear. & cinnab. modico constantes, quibus per noctem adhibitis d. 29. anxietas penitus statim cessabat, ut jam decumbere posset, inflatio etiam colli, ventriculi & abdominis detumescebat, æstusque multum temperabatur: interim quod adhuc tremor continuaret, nec æstus penitus esset extinctus, datis denuo his pulveribus & insuper arcano ☿ in liquido d. 30. omnia erant pacata.

## OBSERVATIO LVI.

### *Tumores flatulenti.*

**N**Otum est *Helmontium* flatus soli ventriculo & intestinis & præcipuè ileo (quippe cujus inquilini præcipuè ex ejus hypothefi sunt flatus) inclusisse, flatusque non rerum sed nostrum vitium esse statuisse. Ast sicuti vanum est soli viscerum debilitati generationem



nem flatuum assignare, siquidem tum alii, tum celeberrimus *Camerarius in dissertat. de subsidiis pro arte medicâ ex antliâ pneumaticâ petendis* §. 4. p. 29. evidentibus experimentis evicerunt, quod omnino flatus rebus & cibis insint, sub fermentatione non â fermentatione emergentes, ita quod deinceps in alias quoque cavitates ipsumque habitum corporis penetrare possint, res est tot expertorum medicorum testimoniis confirmata. Ita enim celeberrimus *Wedel. sect. 2. Pathol. medic. dogmatic. c. 3. p. 207.* flatus ex utero prodiisse observavit, quales quoque ego ex eadem cavitate cujusdam Illustrissimæ Baronessæ albo fluore laborantis prodiisse notavi, pariter & *Binning. eosque sonoros Cent. 4. Obs. 68. p. 442. deprehendit.* E pudendo & pene erupisse notavit. celeb. *Paulini Obs. 91. ad Dec. 2. Misc. Nat. Cur. A. V.* ex eodem leguntur emisfi *Dec. 1. Misc. Nat. Cur. A. 2. Obs. 46. Vol. 2. Act. Hafn. Obs. 44. Vol. 3. Act. Hafn. Obs. 40.* Quem chigram flatulentam *B. Volcamerus Dec. 2. Misc. Nat. Cur. & Celeb. Wedel.* arthritidem vagam flatulentam ex abdomine flatibus distento oriundam, & postea iterum per guttur superius & inferius flatibus emissis solutam observavit *in dissert. de arthrit. vaga scorbut. c. 2.* Certe religiosi reformati S. Francisci mihi pro certo affirmarunt, se ex ratione sui instituti dum frigus multum suscipere, & vitam victu multo duro,



duro, viscido & flatulento tolerare coguntur, flatibus valde molestari, adeò ut non rarò in habitu externo & articulis tumores flatulentos patiantur, facile disparentes, & maximè cum ructus erumpunt, cujusmodi tumor magnus olim cuidam Fratri prope axillam exurgens ructibus ortis mox detumuerit. Conf. de similibus tumoribus flatulentis in partibus masculosis *Hildan. Gent. V. Obs. 70.*

## OBSERVATIO LVII.

### *Afari vis insignis antifebrilis.*

**N**ON semel quin multis vicibus insignissimam vim radiceis afari expertus sum in febribus tertianis & quartanis difficillimis, quibus rarò nosodochium A.A. R.R. Dn. Dn. F.F. Misericordiæ destituitur. Adversus has cum selectissimis aperitivis,  $\Theta$ bus duplicatis, & lixiviosis, antiscorbuticis, purgantibus in variâ, tum infusorum formâ propinatis, imò tandem chinatis ipsis &  $\mathcal{Q}$ libus parum vel saltem vix aliquid constantis nonnunquam efficeretur, afari tamen radix ob aromaticam suam incisoriâ specificam vim ad 3ß. vel  $\mathfrak{Hij}$ . vino infusa & in eodem leni calore digesta talem præstitit *ἐνέργειαν*, ut diaphoresi & diuresi largissimâ (ut plurimum sine vomitu) factâ, febris (imprimis si usus ejusdem bis, ter repeteretur) constanter cessaret. Ex

H

plu-

pluribus allegare possum Fratrem quendam ex conventu Dn. FF. Misericordiæ, coqui munere in cœnobio fungentem. Hic temperamenti cholero-melancholici, hæmorrhoidarius insuper, homo alias ἀπρωσία quadam διαβολας laborans, & ut coqui solent, ingluviosus, cum vini potum ordinarium cerevisiæ potu hic Vratislaviæ mutare cogeretur, id quod valdè ægrè ferebat, mense Septembri tertianâ spasmodicâ multo cum rigore, pulsu debili, anxietate pressivâ præcordiorum, vertigine delirâ, lancinationibusque & puncturis artuum inferiorum stipatâ tentatus, (sub cuius paroxysmis aliquando ceu furiosus horrendum vociferans insuper ceu canis latrabat; illâ vix debitis remediis sopitâ, ex erroribus diætæ quartanam multis prioris febris tertianæ symptomatibus comitatam incurrebat, quæ ob pertinaciam infusâ prædicta aperientia, Θlia varia, regul. ♂. medicin. c. essent. fulig. antiscorbutica diu eludens, (quanquam mitior hinc paulum reddita) tandem quidem post celeberr. Hoffmanni pulverem, quem in *dissertat. de quartana* laudavit, & qui ex limat. ♂. chin. chin. Θ absinth. arcan. dupl. ℞ d. & laudan. opiat. concinnatur, in sex doses partitum salivatione copiosâ ortâ acquiescebat, cum tamen iterum in fine Decembris repullularet, post quater ante paroxysmum sumtos ℞ij. radicis asari in fine leniter ebullitæ, orto primâ



primâ vice vomitu, postea vero copioso sudore & diuresi, penitus citra ullum restans symptoma d. 7. Januar. evanuit. Sanè *Simon Pauli in Quadripartito Botan. p. 23.* asarum quartana laborantium veluti panaceam vocat, & *Cl. Paulini Cent. 2. Obs. medico-physic. rar. Obs. 71.* herbam, quæ cuidam in quartum annum quartanâ afflicto in somno ostensa cum alloquio in hoc salus tua, bibe & viceris, non aliam quam asarum, quod verum quartanæ *πίζοτομον* nominat, fuisse credit.

## OBSERVATIO LVIII.

### *Cura & Anatome asthmate defuncti.*

**I**lluſtriffimus quidam Comes, 36. annor. temperamenti phlegmatico-melancholici, olim in aulâ Divi Leopoldi honorariis pueris adſcriptus, (quo tempore crebram hæmorrhagiam narium pati conſueverat,) poſtquam delicato vivendi generi ſedentarium junxiſſet, luſui ſi quis alius in ſeram noctem indulgens, ante quatuor annos circa papillam dextram tumorem ſine inflammatione cum dolore pulſatorio ſenſit, quo ſublato, catarrhus in pectore, & poſt hunc reſpiratio difficilis ſucceſſit: cum igitur dyſpnœa cum tuſſi (quâ viſcida ſpumofa expectoraverat) invaleſceret, & febricula quædam habitum corporis paula-

tim depascens accederet, ante  $\frac{1}{2}$  ann. tres medici nostrates curæ illustrissimi præfecti in diversas partes de causâ morbi abierunt, duobus tubercula cruda pulmonum incusantibus, tertio laryngis statum p.n. sibi concipiente. Quod vero parum medicando proficeretur, pertæsus DN. æger medicamento- rum, medicis dimissis solo infuso quodam, quod hepatica, splenetica, pectoralia & laxantia ingrediebantur, vacillanti suæ valetudini prospexit. Tandem verò d. 24. Jul. 1713. meum consilium requirens, dum in illo capi- plenium cum profundo somno, dyspnœam continuam cum sibilo, tussim (ferè tamen solùm peractâ digestionem) fortem ad vomituri- tionem usque, appetitum robustum, flatuum maximam abundantiam, cum dolore aliquo stupido hypochondrii sinistri & alvo stypti- câ, artuum lassitudinem, & virium debilita- tem cum macescentiâ habitus externi, item- que furunculos in facie & brachio dextro, de- prehenderem, abundè mihi glutinositas lym- phæ tam in abdomine symptomata hypo- chondriaca, quam in pulmonibus asthma tu- berculis crudis comitatum producendo, in culpâ esse videbatur. Facto proin progno- stico, quod DN. Patiens contentus esse de- beat, modò symptomata mitigari possent, & vita tantisper trahi, injunxi usum infusi thei- form. ex rad. helen. glycirrh. herb. veron. beton.

beton. salv. hyss. pulmonar. lingu. cerv. anis.  
 fœnic. ficub. c. mannâ, fol. senn. insuper post  
 pastur elix. bals. Hoffm. c. essent. cort. Or.  
 ~ O d. commendans. Hinc d. 25. materia  
 sequacior reddebatur & parcior, ut citra vo-  
 mituritionem cum tussi expectorari posset; ast  
 quod â pastu abdomen inflaretur, cum anxie-  
 tate & dyspnœâ majori, ac DN. Patiens obser-  
 varet circa papillam dextram dolorem ali-  
 quem statum excretis flatibus levâri, ordinavi  
 partim clysmâ, ex chamom. R. anis. fœnic.  
 carv. c. vitell. ovi & Θ, â quo insignis vis glu-  
 tinosissimæ pituitæ flatibus sociatæ cum leva-  
 mine educebatur, partim emplastr. ex empl.  
 carminat. Myns. c. tacamah. & ∞ carminat.  
 pro pectore & abdomine; â quibus DN. æger  
 se levatum, faciliusque respirare dicebat; &  
 quia circa pedes & crura frigusculum quasi  
 perpetuo sentiret, pediluvia suâsi, quæ quo-  
 tidie hinc utiliter adhibebantur: posteris  
 diebus ad caput levandum præscripsi pulve-  
 rem errhinum ex sacch. canar. c. refin. l. sanct.  
 qui multum glutinosæ pituitæ cum aliquo ju-  
 vamine eliciebat: clysmatibus quoque ite-  
 ratis semper magna vis pituitæ glutinosæ de-  
 trahebatur. D. 1. August. asthmatis paro-  
 xyismo nocturno graviori quam hætenus in-  
 gruente, sumtâ potione ex ▽ hyss. veron.  
 cinn. borr. c. sacch. canto & vitell. ovi con-  
 quassatâ, & calefactâ levius degebat. Inte-



rim dum sequentibus noctibus paroxysmus invalesceret, & anxietas constrictiva juncta, convulsivis artuum motibus exciperetur, (perpenso quod toto morbi tempore quasi diabetica urinæ passione afflicto reliqua lymphæ necessario glutinosior, & spissior, adeoq; ad polypum generandum habilis facta fuerit) ministro medicamenta die quarto petenti prædicebam, me certò credere Dominum post aliquot dies effluxos, & quidem noctu subito moriturum, quod suspicio de polypo cordis penes me subsit. Utut igitur per hos dies quæ derivando, resolvendo, discutiendo, generi nervoso demulcendo, & viribus roborandis prodesse, non omitterentur, tamen cum die sexto anxietas, dyspnœa, & pressio pectoris sub somno, cum motibus convulsivis artuum & debilitate pulsus augetur, ipsi Domino ægro prædixi vitam in ancipiti esse, seque cum suffocatione colluctari. Nec cavuit prognosis eventu; siquidem die octavo noctis horâ secundâ suffocatus periit. Vocatus ego dum in agone esset æger, curruque licet celerrimo vectus, tamen mortuum jam offendebam, duabusque Comitibus quæ pariter celeri curru ad viduam advolaverant, edicebam, mihi verisimile videri, quod magna aliqua circa cor remora subsit. Sectus igitur in præsentia Illustrum plurium personarum, triumque priorum medicorum defun-



functus, laryngem planè s. n. constitutum offerebat, ast quamvis in pulmonibus parvi aliqui noduli se exhiberent, tamen ex eo capite minimè morti subjici debebat; ast occurrens circa vasa majora cordis carnosus polypus, cum scirrho lienis causa erat insuperabilis asthmatis illius perpetui & reliquorum symptomatum. In reliquis visceribus nil reperiatur à statu naturali deflectens. De respiratione difficili à polypo cordis *vid. Dec. 2. Misc. Nat. Cur. A. X. Obs. 174.*

## OBSERVATIO LIX.

### *Catarrhus pectoris chronicus sanguinis eductionibus sublatus.*

**Q**uantopere tam in diagnosi, quam prognosi, & therapiâ multorum morborum fallantur, qui congestionum sanguinis ad certa loca ignari, nescientesque, quam benè, imo unicè, ab illis dependentia varia molimina spastica & dolorifica, seu spontaneis cruentis excretionibus, sive per artem institutis eductionibus frequentissimè finiantur, ii optimè norunt, qui sæpe deprehendunt, etiam in ipsis catarrhalibus, sero quasi unicè adscriptis, affectibus non nisi sanguinis congestionem pro fundamento subesse, quâ ejusdem missione discussâ, ii tandem affectus expugnantur, qui medicamentorum variæ & co-

pioſæ farragini inexpugnabiles prius videbantur, & exiſtebant. En hujus rei exemplum. Deportabatur Olaviâ in noſodochium A.A.R.R.F.F. Miſericordiæ medio Majo A. 1712. Polonus 41. annorum, habitus carnoſi, rubræque faciei. Hic per octo annos duram militiam ſecutus, & jam inter excubias Sereniſſimi Poloniæ Principis Jacobi Officialis munere fungens, cum olim ter venâ ſectâ ſe â quodam morbo vendicaſſet, & poſtea quotannis menſe Martio hoc ſalutari auxilio ſe tutum â morbis reddidiſſet, hujus hoc ipſo anno neglectu id effecit, ut ultra 6. ſeptimanas validiſſimam tuſſim humidam incurreret, cum conſtrictionibus circa abdomen, quaſi â cingulo, doloribusque tam circa pectus ſcindentibus, (es dñacſte ihn / als würde die Bruſt mit Meſſern zerſchnitten /) quam circa frontem & radicem naſi punctoriis. Medicus itaque loci ad dolores pectoris, & *αὐτὸς* *αὐτὸς* materiæ viſcidæ virideſcentis reſpiciens, phthiſin incurabilem prædicendo, ipſi ut ſibi de alio medico proſpiceret anſam dedit. Ego verò moliminum hæmorrhagicorum, præſertim verno tempore, memor, mox venæſectionem proponebam, quâ in pede d. 20. Maji celebratâ, mox circa pectus levabatur, niſi quod adhuc tuſſi viſcida multa ejiceret, nec capitis punctiones ceſſarent; evacuatione itaque per ∇ laxativ. Vienn. opus eſſe





esse credens, post illam essent. pimpinell.  
scord. succ. castor. & croc. c. pulverib. ex ab-  
sorbent. ꝯ d. lap. ꝯ pulv. item peēt. resolv.  
Wed. c. nitr. præter infusum theiforme, pro-  
pinabam: quia verò d. 24. punctiones & pul-  
sationes circa frontem & radicem nasi cum  
muci viridis purulenti excretionem redirent,  
atque id quidem cum his notabilibus circum-  
stantiis, ut unicè circa meridiem, nunquam  
autem noctu caput doleret, capitique tum  
benè esset, cum pectus gravaretur, pediluviiis  
periodicæ cephalalgiae obviare, & saccharo  
canariensi per nares liberiores exitum mu-  
co purulento procurare constitui; ast quia  
nondum penitus hæc symptomata cessarent,  
tandem d. 30. Maji scarificationes inferiori-  
bus, & cucurbitulam siccam dorso admovi,  
quas saluberrimus effectus excepit, sic ut  
cum prius pilulis ex extr. helleb. resin. scam.  
ꝯ d. &c. corpus expiassem, appetitus & reli-  
qua exoptata sanitas tam egregiè rediret, ut  
d. 6. Junii cum prolixâ gratiarum actione  
Olaviam iterum abiret, non tamen sine gravi  
monitu, ne tam salutare auxilium inpos-  
terum circa æquinoctia verna negli-  
geret.

## OBSERVATIO LX

*Paralytici cura & Anatome.*

**D**Eferebatur ad A.A. R.R. F.F. Misericordiæ d. 1. Jun. A. 1712. socius textoris 34. annor. qui post abusum lactucæ, acetariorum, & crebras ebrietates ante  $\frac{3}{4}$  ann. in paralyfin oculi, brachii, & femoris dextri sensim inciderat; jungebatur huic partium affectarum frigus, vertigo, spasmus oris cynicus, loquelæ difficultas, & per vices *αἰσθῆσις*, muci viscidissimi defluxus è naso, rhonchi graves constantesque pectoris, liquidorum deglutitio impedita, (unde sæpe per nares resiliabant) alvus morans, urinaque per vices lateritio sedimento turgida. Solamens & memoria parum adhuc constabat. Quanquam igitur nulla spes reconvalescendi arrideret, tamen A.A. R.R. F.F. Misericordiæ (ceu desperatorum, omnique sæpe humanâ ope destitutorum susceptores) misericordiâ ducti eundem totis viribus sublevare non desistebant. Proinde initium curæ fiebat laxatione ex infus. fol. fenn. c. anis. &  $\square$   $\square$ ris. quâ obtinebatur, ut ad tempus melius loqueretur, cumque postea ad ductum Magni Wedelii usui mixturæ ex  $\mathcal{R}$  castor. volat. c. liq. C. C.  $\omega$  magnanim. Lauremberg. & aliis interpolatæ, pulveris item cachect. Wed. c.  $\circ\circ$  caryoph.

caryoph. deniq; infus. pugillar. ex rad. pæon.  
 helen. sarsæp. herb. salv. beton. serpill. majoran.  
 trifol. fibr. fl. anth. stœchad. arab. ras. l. sassaf.  
 cubeb. cost. v. item unguent. nerv. c. o. de-  
 still. junctis quoque urticationibus, insiste-  
 rem, d. 13. brachium fornicationis sensu per-  
 fundebatur, palpebræque oculi & femoris  
 motus aliquis redibat, remittente simul spas-  
 mo oris cynico. Interim quia nihilominus  
 rhonchi continuabant, & enormi quantitate  
 muci glutinosissimi nares semper scatebant,  
 frustra erat quicquam constantis sperare, in-  
 primis cum d. 17. ☐ & scybala injussa prodi-  
 rent, d. 27. convulsivi maxillæ motus, imò  
 epilepsia perfecta, tandem d. 29. cruris & fe-  
 moris convulsio tonica accederet; undè in  
 hoc misero statu (nisi quod alvus ad consue-  
 tam stypticitatem rediret) decumbens, cum  
 prius aliquot ante obitum diebus halitus oris  
 valde fœtuisset, rationis usu carens, suffocatus  
 d. 1. August. periit. Demortui digiti in pu-  
 gnum erant contracti, liventes, nates quoque  
 livebant, abdomen turgidum, copiosis licet  
 dum viveret flatibus excretis. Sectus osten-  
 debat cerebri vasa atro sanguine turgentissi-  
 ma ventriculi cerebri copioso sero perlucente  
 referti, pulmones, in primis in dextro lobo,  
 atrii & lividi, quæ dorsum spectabant exterius  
 duplici vomica obsessi, è quibus discissis pus  
 aquosum saltu exiliebat, copiosa aqua peri-



cardiſ, cor multâ pinguedine tectum, hepar ſubpallidum, unâ parte lividum, lien quoque valde, maximam partem, livebat, inteſtina flatibus turgida. Renes non contemplatus ſum. Cernere ex his datur, ex ἀνωία fibrarum per errores diætæ productâ ubivis ſtagnationes & ſtaſes ſanguinis & lymphæ obortas eſſe. De paralytico ſolida, non verò liquida, deglutire valente confer. Hildan. centur. 5. Obſ. 34. qui rariffimum vocat effectum.

## OBSERVATIO LXI.

*Hydrops pectoris cum polypo  
cordis.*

**A.** 1712. d. 6. Octobr. curru in noſodochium Dnn. F. F. Miſericordiæ deferébatur Locumtenens quidam 55. ann. qui â teneris duram militiam ſecutus, ultra  $\frac{1}{2}$  ann. ſæpe duritiem & dolorem circa hypochondria, aliquando diſcuſſum, ſenſerat, cum anxietate & anguſtiâ præcordiali, palpitationeque magnâ cordis, quæ tanta erat, ut in lecto ob metum ſuffocationis non poſſet decumbere, unde perpetuò deſidere cogebatur; crura & pedes erant œdematoſa, appetitus nullus, ventriculus eructabat, ſitiebat, pulſus deprehendebatur magnus & celerior, non tamen intermittens, aut intercurrents, ☐ rubra,  
mori

mori ob tantas angustias quam vivere optabat. Balneator aliquis ter enormi quantitate sanguinem detraxerat, daß ganze Becken voll worden/ cui errato deteriorationem morbi familiares adscribebant. His omnibus auditis, insuper exploratis hypochondriis, & in hypochondrio dextro scirrhosâ duritie deprehensâ, dixi ego me quidem medicamenta ipsi ordinaturum, interim ex circumstantiis patescere hydropem adesse pectoris incurabilem, nisi Deus miraculo adfuerit, cum polypo cordis, & scirrho hepatis stipatam. Quod igitur tali patientis statui generosa auxilia magis nocitura quam profutura crederem, cum nec his nec mitioribus aliquid profici amplius posse manifestum essent, solum ordinavi sequentia. (1) arcan. ♀. c. R rub. Bon-tek. (2) arcan. d. c. ebor. f. Δ. † mart. cinnab. D lap. perc. (3) rob. ebul. samb. junip. (4) decoct. ex rad. bardan. cichor. pimpinell. sem. dauci, fœnic. cui spirit. nitr. d. instillari jubebam. D. 8. ☐ copiosior erat & minus tinctâ, interim anxietati nil detrahebatur, cui ferendâ diutius impar æger optabat, ut modò inveniretur, qui vitam miseram tantis angustias comitatam sibi eriperet. Ast non opus erat hoc voto, siquidem postquam paulo ante die decimo manè sermonem cum aliquo miscuerat, mortuus concidebat. Ut igitur defuncti voto, quo exa sua post mortem inspicere desiderava-

deraverat, satisfaceret, sectionem institui. Aperto igitur thorace serum cruentum ad duas circiter mensuras occurrebat, pulmones visebantur lividi, nodis tamen & vomica carentes, circa cor verò, valde magnum & robustum, polypus solidus inveniebatur, cum magna in vasis copiâ atrii coagulati cruoris, hepar per totum scirrhusâ duritie obsessum, versus diaphragma magnâ quâdam peculiari eminentia dotatum, quæ diaphragma sursum protrudendo ibi cavitatem thoracis angustiores reddiderat. Ulterius sectionem prosequi tempus non vacabat.

## OBSERVATIO LXII.

*Clavicula sinistra cariosa feliciter exenta.*

**A.** 1712. d. 15. Octobris filius Sculteti in pago Schechnis 9. annorum nosocomio Dnn. F.F. Misericordiæ inferebatur. Is (quod sub curâ tandem ægrè confessus est) ab equo delapsus, & cætera, ut solent rusticorum pueri, ingluvie tum aliorum ciborum, tum fructuum horæorum, sæpe immaturo- rum, peccans, ante aliquot dies horripilavit, successit circa claviculam sinistram sub inguine sinistro genuq; sinistro dolorificus quidam durus, licet levis, tumor. Dato leni laxante postea exhibebatur (1) essent. alexiph. Stahl. & li-





& lignor. (2) pulvis ex ꝑ d. lap. perc. cinnab.  
 ①. (3) liniment. nervin. D. 17. dolor circa  
 inguen major cum duritie; cataplasma hinc  
 emolliens cum croco impositum, □ naturalis  
 ast crassior. D. 19. supra claviculam tumor  
 rupit, materiâ crassâ & spissâ exeunte. D. 21.  
 □ crassima cum grosso albo sedimento, redi-  
 bat appetitus, tumor circa inguen mollescens  
 detumescebat, bibebat infusum veronic. &  
 fœnic. adjuncto usu elix. propriet. & pulv. ex  
 lap. ⑤ conch. ꝑ d. ① arc. d. D. 24. □ semper  
 crassa Dn. Fr. Cosmas Armbruste / è cœtu  
 Dnn. F. F. chirurgus nosocomii peritâ dexte-  
 ritate insignis sinuositatem abscessus circa  
 claviculam incisione dilatans illam albam in  
 parte supernâ reperiēbat; cum vero inferius  
 instrumento exploratorio ipsam contingeret,  
 asperamque deprehenderet, hinc cariem ibi-  
 dem latitare mecum decernebat; inguinis  
 tumor dolore carebat: ordinabantur (1) in-  
 fusum veron. tussilag. anis. (2) pulv. ex lap.  
 ⑤ ꝑ d. c. bals. ④ anis. exterius vero, si possi-  
 bile, euphorbium cariei imponendum. D. 26.  
 genu etiam â dolore immune erat, pulsus ta-  
 men citior, habitus aridus & □ albo sedi-  
 mento turgens; cibos nimis appetenti ali-  
 quantulum detrahebatur, jubebaturque la-  
 xans fumere, posteaque dabantur lap. ⑤. c.  
 ①, ꝑ d. essent. lignor. ꝑ decoct. lignor. c.  
 veron. heder. terr. fœnic. D. 28. □ clara  
 ala

alacrior erat, habitus non ita ut prius aridus. D. 31. eadem, post impositum emplastr. contr. rupt. circa inguen, ejusdem tumor & durities penè disparuit, sic ut ad breve tempus, quod hætenus nequivit, pedi insistere posset. D. 2. Novemb. ☐ tincta, ☉ â pulveribus remotum. D. 3. in claviculæ internâ parte adhuc scabrities aderat & os fractum observabatur; in inguine omnia bona, genu vero unguento nervino fovebatur. D. 9. digito meo claviculam premens os fractum percipiebam. D. 11. incisio super claviculam amplius producta citra magnam hæmorrhagiam, pro dilatatione vulneris turunda ex radice gentianæ intrudebatur. D. 12. ulcere amplius dilatato, clavicula aspera deprehensa, adeoque cariosa; inferior pars scalpro abradebatur, cavitate undique plumaceolis expletâ, desuper imposito emplastro. D. 16. cum abrasio ossis quidem tentaretur, interim nec oculus eò penetraret, nec scalprum istuc ritè applicari posset, de exemptione totali consilium cum Dn. Fratre Cosma inibam: licet enim quædam rationes occurrerent, quæ me ab illo abstertere possent, inter quas erat, quod os claviculæ esset simplex, adeoque motus brachii deinceps lædi posset, (quam rationem in primis quidam ex primariis medicis, cui mentem meam circa hanc operationem instituendam aperueram, urgebat; nam quod tibiam corruptam Scul-

tetus

nius



nus removerentur, corpus d. 19. pulvere ex jalappâ cum ꝯ d. & ♀ ⊕ denuò expiabatur; cumque d. 20. tumor dolorosus inguinis & genu penitus sublatus esset, ut jam stare & rite ambulare posset, ( quod hætenus facere nequiverat ) d. 24. forcipe ad modulum, quem Solingen Tab. 8. fig. 2. delineavit, paratâ clavicula maximam partem exemta fuit, non sine insigni gaudio pueri, quod jam abominando foetore careret. Os exemptum hinc & inde cariosum conspiciebatur: Chirurgus vulnus bals. peruv. al. myrrh. medicabatur, pro interno vero usu elix. bals. Hoffmann. c. essent. scord. & pulv. ex lap. ☿. ꝯ d. conch. c. balsamo - sacch. peruv. dabatur. D. 27. diarrhœa cum aliquo æstu p. n. sequebatur, (quam expertus nostræ urbis quidam Chirurgus post ossa exemta solenniter quasi succedere affirmabat.) D. 30. quod axilla doleret, & æstus aliquis p. n. emergeret, utrique obviam ibatur, essent. alexipharm. Stahl. c. R bezoard. Wed. & pulv. ex lap. canc. ꝯ d. ⊕ & cinnab. externè axillâ linimento nervino fotâ. Notandum quod his diebus adhuc una vel altera particula ossis cariota eximenda fuerit. D. 31. fortiter calebat noctu. D. 5. Decemb. calor & diarrhœa per vices emicans, item urina alba glutinosa sedimento fœta cessabat, axilla prius tangi renuens jam fere citra dolorem tangi poterat, maritabatur hodie essent. alexiph.

alexiph. Stahl. c. elix. bals. Hoffm. D. 6. of-  
ficula duo iterum exemta, dolor axillæ minor.  
D. 12. quia fœtor & dolor constanter cessabat,  
ulceri consolidando animum adjecimus: ast  
cum nimîâ repletionem tertianam reportasset,  
dato ☿emet. & antifebrifugis d. 26. Decemb.  
febri defunctus est, sanusque nosodochium  
reliquit, brachium ferè ut prius movere va-  
lens. Hic puer post aliquot menses valetu-  
dinarium invisens Dn. Fr. Cosmæ locum un-  
de os ablatum sciscitanti ibidem duritiem ob-  
tulit, claro indicio, id contigisse, quod præsa-  
gieram, succum nempe utrinque exsudantem  
in calli duritiem concreturum. Notabile  
alias est claviculæ ossa sex primis â concep-  
tione hebdomatibus tota esse ossea, eademque  
eâdem statim formâ & figurâ reperiri, quam  
in ætate provectis, ut meritò iudicio Kerck-  
ringii c. 16. Os teogon. fœtus, possint vocari  
*πρωτογενέα*, quod credit â sapientissimo Crea-  
tore ideò iussu, ne scapulæ & sternum initio  
prorsus cartilaginea si citra tale forte fulci-  
mentum essent, collapsa corculum oppri-  
merent.

## OBSERVATIO LXIII.

### *Phthisici Anatome.*

**P**ictor non ignobilis, Vienna Austrius, 33.  
ann. post hæmoptysin immodicam, in  
I 2 quam

quam praviis prius diuturnis periodicis circa pectus doloribus punctoriis inciderat, & sub quâ per sex septimanas quotidie ferè mensuram sanguinis spumosi cum tussi ejecerat, postquam eandem consilio cujusdam chymico-medicastrî apud nostrates non paucos (quantum saltem ego memini) ægrotos persundantis, pulvere quodam rubro, nigricanteque tincturâ ad 12. guttas datâ (quæ fuerint medicamenta vix Oedipo conjectore opus erit) inhibuisset, phthisin incurrit. Illatus igitur d. 17. Octobr. 1712. nosocomio Dnn. FF. Misericordiæ, cum consumptionem corporis, calorem hæcticum, pulsum frequentem, oppressionem pectoris, cum dyspnœâ & tussi siccâ, vomitumque ciborum offerret, statim prognosin de phthisi lethali concipiens, eandem post ortam d. 25. diarrhœam morte placidâ d. 27. secutâ implevit. Cadavere aperto lobus sinister pulmonum dorso in parte superiori videbatur accretus, exterius hydatides, & scirrhusa tubercula hinc inde comparebant, dissectus vero per totam substantiam undique cuniculosus vomicis scatebat, imprimis vero circa locum, ubi dorso accreverat pulmo, abscessus magnus membranam externam mox perforaturus, & multâ sanie putridâ scatens detegebatur. Dexter lobus non ita putridus, hepar sanum, nisi quod extrema ejus quasi simbriâ lividâ (qualis



lis livor itidem in parte simâ hinc & inde occurrebat) cincta comparerent. Cartilago duarum costarum ossescens, pinguedo pectoris fere consumpta. Reliqua ob foetorem è putridis pulmonibus exhalantem transmissa.

## OBSERVATIO LXIV.

### *Alius phthisici anatome.*

**C**ubicularius Illustrissimi DN. Comitis ab Hatzfeld 36. ann. faciei flavæ, olim sputo cruento affectus, & ante  $\frac{1}{2}$  ann. hæmorrhoidum fluxum copiosum passus, postquam febri continuâ cum intercurrente horripilatione, non sine dyspnœâ, tussi, & dolore pectoris gravativo definito laborans, medicorum sui DN. diligentiam frustraneam expertus esset, d. 12. Decemb. A. 1712. in nosocomium Dnn. FF. Misericordiæ delatus, efflorescentibus d. 19. cum sudore foetido per aliquot dies vesiculis prurientibus, (quibus alvus ficca, hæmorrhoides cæcæ, & tenesmus complicabantur) remissionem quidem caloris p. n. & symptomatum circa pectus experiebatur; ast cum excretio hæc peripherica d. 31. Decembr. desiisset, luctu ex uxoris morte profundo interveniente febri hæcticæ putrida quarto quovis die cum horrore invadens jungebatur. Sub quibus paroxysmis semper de pectoris dextri prope diaphragma

I 3 dolo-

dolore querebatur; aderant per hos dies non solum rubræ, crassæ, sed & atrescentes urinæ instar cerevisiæ nostræ saturationis. Excipiebatur hæc urinæ (quæ durante quartanâ hæc putridâ atrescebant,) hæmorrhoidalis iterum tenesmus cum tumore aliquo pedum, & sudoribus colliquativis: durante igitur illo dolore thoracis dextri, augescenteque indies debilitate & tabescentiâ, post dejectiones instar albuminis ovorum, & tandem diarrhœam exortam, d. 8. Martii præviis dejectionibus fœtidis, cum frigore manuum & anxietate suffocativâ junctâ, integrâ ratione obiit. Sectus, quod ipse expetierat, cutem ossibus hærentem ostendebat, paucula pinguedo biliosa. Aperto thorace copiosum serum biliosum cavitatem ejus inundabat, super mediastino vesiculæ plures bullosæ, cor undiq; pinguedine brunnâ hydatides æmulante tectum, lobus pulmonis sinister parum accreverat, sparsim vomicis cuniculosis pus feculentum griseum fundentibus perforatus; ast dexter ferè penitus validè accretus erat, ubi dolorem semper hære ostenderat, copiosius tale pus stillans; aderant etiam sparsim nodi scirrhusi, ventriculus contractus, pancreas paulo induratum: hepar sanum & magnum, nisi quod in extremitate parum livesceret, vesicula bilis magna, lien magnus, unâ parte livescens, alterâ purpureâ, quæ etiam discissa in-

interius hos colores exhibebat. Intestina diversis spatiis glandulis induratis obseſſa, hytatides inſuper bilioſo ſero repletas ſiſtebant. Vena aliqua meſenterii calamum ſcriptorium ambitu ſuo ferè adæquans, diſciſſa ſive lympham, ſive pus ſpiſſum plorabat, & hinc fortasſis dejectiones albumen ovi æmulantes oriundæ fuerant.

## OBSERVATIO LXV.

### *Hydropici cura & anatome.*


**M**ercenarius 36. ann. homo pinguis & ſtupidioris ingenii, dyſpnoos exiſtens, cum anguſtiâ pectoris, poſtquam coactus eſſet ex cellâ calce viva repletâ aquam ex illuvie Oderæ ſtagnantem nuper exportare, hydropicus inde evadens, diuque in ſtabulo decumbere durâ paupertatis lege coactus, in tali miſero ſtatu benevolos implorabat Dnn. FF. Miſericordiæ. Ab iis igitur d. 7. Dec. 1712. ſuſceptus, offerebat abdomen aſcite, cruraque & femora œdemate obſeſſa; cum dyſpnoæâ, tuſſi, ſiti, calore p.n. labiis ſiccis & urina brunnâ; proinde ex tam pravis junctim viſendis ſymptomatibus mortem niſi ope divina non evaſurum prædicens, ordinavi (1) clyſma ex herb. gratiol. fol. ſenn. ſem. chamom. carvi & ☉ ꝯ. (2) pulv. ex lap. percar. ꝯ ꝯ c. rob. junip. & ebuli (3) arcan. ♀. Quan-

I 4

quam



quam igitur â clysmate copiosa foetida materia educeretur, (so daß es wie ein Zapffen von ihm geschossen/) tamen die 8. & 9. adeo febricitabat, ut cum subsultu concuteretur, urina erat crassa & turbata. Interim sudore copiosissimo orto d. 10. alacris se erigebat, latusq; statum morbi sui hodie describebat, (cujus cum nosodochio inferretur ne verbo quidem mentionem, vi morbi pressus, facere poterat) abdomen minus turgebat, œdemaque ex femoribus discussum videbatur, tussi insuper mitiori existente, cum respiratione faciliori, pulsuque tardiori & robustiori, ☐ rubra clara: sumere jubebatur ad serum ex abdomine per alvum magis expurgandum, pilularum cephalicatum numero 4. copiosis decem dejectionibus hinc ortis abdomen magis detumescebat, febrili tamén paroxysmo d. 11. redeunte; fluebat iterum sudor, ☐ semper rubra: ordinati (1) pulv. ex ☿ ☉ arcan. dupl. ♂ ♀, ☉, c. rob. junip. & ebuli. (2) mixtura ex essent. trifol. fib. absinth. anticachet. d. 14. hodiernæ febrili exacerbationi deliria jungebantur, abdomenque, femora, & pedes iterum intumescebant, sitis erat urgens, ☐ rubra; mixturâ sepositâ pulverem solum imperavi & clysmalaudatum. D. 15. facies intumescere cœpit, artuum quoque & abdominis tumor auctus est, ☐ & deliria continuabant: adversus sitim clamorâ ordinata potio ex deco-

decocto radic. bardan. helen. cichor. sem.  
anif. fœnic. dauci c.  & alia quædam.  
Interim omnibus frustra existentibus post  
aliquot dejectiones debilitatus, genubusque  
innixus d. 18. exspirabat. Abdomine in præ-  
sentiâ duorum aliorum medicorum nostratium  
inciso, mox serum biliosum effluebat  
viscera inundans, (sub morbo enim irâ fre-  
quenter effervesceere sueverat.) Hepar, lien,  
& renes satis sana, vesicula bilis turgida, lien  
in medio crassus, incisuris in extremitate tri-  
bus insignis, pancreas paulo durius, omen-  
tum ferè consumtum & sphacelosum, hytati-  
des multæ, sero bilioso transparente, glan-  
dulæ ileo adhærebant magnæ, partim mucila-  
gine repletæ, partim gelatinâ biliosâ turgen-  
tes, intestina livida & inflata; in thorace se-  
rum biliosum extravasatum, quale quoque  
in pericardio translucebat, pulmones exterius  
sparsim nodis parvis distincti, dexter lobus  
anterius crassâ membrana pleuræ, sicuti he-  
par peritoneo anterius pari ratione adhære-  
bat, unde nonnisi cultello eâ parte utraque  
liberari poterant, in ventriculo sinistro cordis  
substantia gelatinosa flava, subrotunda, ma-  
gnitudine ferè ovi gallinacei, in dextro etiam  
hujus aliquid hærebat, ex aortâ â corde ad  
axillam usque ejusdem substantiæ pseudopo-  
lypus extrahebatur. De Hydrope illâso he-  
pate, liene, & renibus, partim â glandulis

mesenterii, pancreateque indurato, partim â polypis cordis vid. *Bonettus in sepulchreto*, ubi meminit materiæ gelatinosæ in glandulis & corde repertæ, item alius materiæ in corde medullam calidam substantia & consistentia referentis.

## OBSERVATIO LXVI.

### *Anatome phrenitide occultâ demortui.*

**D**ie 12. Decembr. 1712. in nosodochium Dnn. F. F. Misericordiæ deportabatur vir 80. annorum officinæ monetariæ interveniens, qui, relatu illorum, qui hominem deportaverant, toto vitæ suæ tempore in nullo lecto decumbere, ast fumi nicotianæ & abusui enormiter indulgere suetus, delirio silente correptus fuerat, sub quo tamen ita inquietum se gerebat, ut lecto alligari cogeretur; carebat alias siti, caloreque & pulsu p. n. cum igitur per triduum taciturnus sic & secum quædam, quæ intelligi non poterant, murmurans, lectumque permerdans decubisset, viribus sensim defectis post validas convulsiones d. 15. expirabat. Demortui cadaver externè undique livebat; cumque secto cranio DN. Fr. Cosmas ollam detrahare conaretur, ecce totum cerebrum, ob firmam duræ matris accretionem, extrahebatur; in cere-



cerebro nil præternaturalis occurrebat, nisi quod sub piâ matre aliquot parvæ vomicæ occurrerent, sinister pulmonis lobus pleuræ accreverat, reliqua viscera benè erant constituta.

## OBSERVATIO LXVII.

### *Empyema diarrhœa solutum.*

**P**olonus 20. ann. satelles Colonelli cujusdam Poloni, homo carnosus, hæmorrhagiæque narium sæpe obnoxius, post copiosas & frequentes ingurgitationes & more Polonorum prægressas, (sie sauffen Feuer und fressen Feuer/ quia scilicet & pipere delectantur) cum is feбри irregulari tempore æstivo correptus æstus minus patienter ferret, adeoque strenue frigidam hauriret, corticeque peruviano citius quam convenerat febrim profligaret, aliquot septimanis post profligatam febrim in hæmoptysin, tandem empyema incidit. Quia igitur d. 26. Decemb. 1712. in nosodochium DN. FF. Misericordiæ susceptus cum pulsu celeri & sat̃s debili, tussi pituitam cruento purulentam expectorans, dolorem etiam & gravitatem pectoris sentiret, empyematis suspicio mihi nascebatur. Hinc ordinavi (1) pulv. ex pulv. pect. balf. Wed. c. lap. ☉ & sperm. cet. (2) potionem ex ∇ cerefol. scabios. c. sir. papav. rh. (3) emul-

sio-

sionem ex amygdal. d. sem. card. ben. mar. &  
 ▽ prædictis. D. 28. pravis signis apparenti-  
 bus dum hæmorrhagiæ narium diarrhœa de-  
 bilitans jungeretur, ægerque in genâ dextrâ  
 rubens c. pulsû debili ac siti nullum levamen  
 doloris & gravitatis in pectore persentisce-  
 ret, ac quod purulentum expectorabat, id  
 ex atro brunnum esset, nihilominus in usu  
 diligenti medicamentorum pergere jussi; or-  
 dinabam proinde præter potionem & emul-  
 sionem dictam, quæ semper porrigebantur,  
 pulv. ex lap. ☿. mat. perl. pulv. pect. bals. &  
 sperm. cet. item mixturam ex essent. scord. &  
 helen. Hinc licet d. 3. diarrhœa adhuc per-  
 sisteret, à quâ paulo languidior evadebat, nec  
 post viscidæ materiæ ἀνωμαλία pectoris  
 angustia & dolor admodum levaretur, tamen  
 quod vultus alacritatem aliquam præferret,  
 pulsusque fortiolem ac □ minus tinctam  
 exhiberet, (quamvis vesperi ut hætenus sub  
 exacerbatione febrili langueret) spem vitæ  
 abjectam resumebam. Hinc potioni & emul-  
 sioni, quæ per totum morbi stadium propi-  
 nabantur, adjungebatur usus (1) pulv. anti-  
 pleurit. Wed. c. lap. ☿. (2) essent. scord. &  
 elix. pect. Wed. (3) spec. pro infuso theifor-  
 mi, cui unguentum rubrum potabile marita-  
 batur, ex rad. rub. tinct. glycirrh. herb. veron.  
 scabios. heder. terrest. fl. bellid. hyper. papav.  
 rh. à quibus diligenter usurpatis d. 2. Januar.

infi-

insigne levamen deprehendebatur, quam enim nares sæpe cruentarent, respiratio etiam adhuc paulo difficilis cum tussi restaret, tamen pulsus tardius & robustius vibrabat, æstus ferè erat discussus, facies s.n. ☐ citrina visebatur, dejectiones erant rariores, nec amplius purulenta expectorabat, & appetitus parum redibat. Usui igitur dictorum, inprimis specierum (quæ valdè insignis efficaciam deprehendebantur) sedulò sic insistens æger d. 5. facilius respirabat, minusque tus siebat; hinc d. 9. ordinata mixtura ex essent. scord. elix. pect. Wed. essent. travmat. ejusd. c. bals. ☿ anis. quæ cum prioribus speciebus continuata ægrum ab omnibus pro conclamato habitum perfectæ sanitati divina gratiâ restituerunt, sic ut purgatione prius instituta d. 20. sanus summo sui ac Domini sui Illustrissimi gaudio nosodochio valedicere potuerit.

## OBSERVATIO LXVIII.

### *Quartana pertinax salivatione curata.*

**Q**ui mercurium ριζόρονον pertinacium morborum vocant, â vero non abludunt, penetrat certè illic, unde alia remedia excluduntur, & resolvit coagula humorum, quæ omnibus aliis prius frustra tentabantur. Sentie-



tiebat hoc in nosocomio Dnn. FF. Misericor-  
 dia Fabricatoris pileorum socius, 28. ann.  
 Hic cum in nosodochio nostræ civitatis ad-  
 versus quartanam per quatuor menses varia  
 medicamenta sumsisset, quibus quidem effe-  
 ctum fuerat, ut febris per brevissima intervalla  
 conticesceret; interim quod nihilominus  
 gravativa pressio ventriculi & dolor hypo-  
 chondrii sinistri duraret, febrisque repullu-  
 raret, d. 20. Febr. 1713. penes Dnn. FF. Mi-  
 sericordiae remedium poscebat. Quanquam  
 igitur infuso febris. laxant. Hoffm. tum di-  
 versis mixturis ex  $\mathcal{R}$   $\sigma$  helleb. c. arc.  $\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{R}$ .  $\mathcal{F}$ .  
 c.  $\omega$   $\ominus$   $\ast$ . &  $\circ$  caryoph. pulveribus item  
 variis ex arcan. dupl. salibus alcalicis, reg.  $\delta$ .  
 medic. fl.  $\ominus$   $\ast$ . conch. ppt. obviam iretur,  
 tamen omnia frustra erant; sub frigore enim  
 forti capitis dolor & tensio artuum persiste-  
 bat, gravatioque & inflatio ventriculi à pastu  
 cum appetitu nimio & dolore hypochondrii  
 per vices continuabant, ita ut dum oleum &  
 operam me perdere cernerem, tandem (quia  
 in cura cujusdam A. R. F. quartanæ contu-  
 macia pulvere  $\mathcal{Q}$  quem celeberr. Hoffmannus  
 in dissertat. de Curatione quartanæ descripsit, do-  
 mata fuerat) decrevi eundem pulverem de-  
 nuo in hoc ipso ægro experiri: constat vero  
 hic pulvis ex limat.  $\sigma$ . 3j. chin. chin. 3ss.  $\mathcal{Q}$ . d.  
 $\ominus$  absinth. arcan. dupl.  $\tilde{a}$ . 3ß. laud. op. gr. is.  
 in sex doses dividendus. Postquam igitur  
 s. dō-

5. doses â d. 11. Martii consumptæ essent, circa d. 17. salivatio incipiens tandem d. 27. circiter desinebat; eventus is erat, ut die 22. circa pectus & abdomen melius degeret, respiratioque facilius fieret; ast quia nihilominus paroxysmus non penitus cessaret, datâ d. 28. rad. asari in vino maceratâ, quamvis inde initio vomeret, secutâ tamen postea d. 31. Martii & d. 3. April. copiosissimâ diuresi urinâque existente plane naturali ultimò in usu mixturæ antifebrilis Hoffmanni continuans, penitus ab eo tempore quartanâ caruit, d. 15. April. sanus nosodochio valedicens. Dum hic æger in actu salivatorio esset, magna frustra pituitæ salivæ fluidæ admixta excernebat, dolebatq; caput & dentes insignissimè, quæ omnia tamen salivatione finitâ & decocti lignorum aliorumque simultaneo usu tollebantur.

## OBSERVATIO LXIX.

*Ulcerastomatosa partim incisione, partim salivatione & usu sedi vermicularis curata.*

**S**uscipiebatur â Dnn. FF. Misericordiæ d. 31. Martii A. 1713. servus rustici 22. ann. homo tardi & stupidi ingenii, ulceribus chronicis in facie & brachiis cuniculosis subter cutem serpentibus extortus. Hunc cum medicamenta, quæ constabant (1) pulvere digestivo

stivo ℥ li. (2) purgante ex refin. galapp. scam-  
 mon. ℥ d. 8 d. & ☉ 8 to composito, (3) de-  
 cocto lignorum primario & secundario cum  
 rad. scrophular. & bard. parato (4) 8 ♂ c.  
 absorbentibus maritato, parum juvent, in-  
 cisio fiebat, & injectiones parabantur ex de-  
 cocto croci metall. sabin. & ∇ Calc. viv. cui  
 unguentum ægyptiac. admiscebatur. Ast  
 cum tenacitas ulcerosa terebinthinæ æmula  
 talia adhuc aspernaretur, DN. Fr. Cosmas  
 meo suasu crocum metallorum præsentiori  
 cum effectu, item unguent. ægyptiac. cui  
 ℥ status miscebatur, adhibebat. Interim  
 dum glutinosus status ipsius massæ sangui-  
 neæ per interna mitiora nondum corrigere-  
 tur, accedebam tandem d. 24. April. ad sali-  
 vationem ℥ lem. Absumtis igitur ℥ d. Div.  
 extracto fumarie incorporalis, ægrè d. 13.  
 Maji salivare incipiebat, qua salivatione per  
 aliquot dies producta nihilominus ulcera  
 steatomatosa alia post alia repullulabant. Me-  
 morigitur, quod *Dec. 1. A. VI. Obs. 22.* se-  
 dum vermiculare minus tum aliis in casu-  
 bus, tum in ulceribus admodum commen-  
 detur, statui in hoc gregario ejus rei experi-  
 mentum facere, & sanè non carebat promissum effectu, siquidem postquam hunc suc-  
 cum cum cerevisiâ ebullitum aliquandiu  
 quotidie manè bibisset, (unde ut plurimum  
 vomebat, quod bonum esse signum loco  
 alle-



allegato affirmatur) concurrente in super manu Chirurgi externa abstersione cum prædictis topicis & in fine exsculpto fonticulo d. 19. Junii ulceribus carens latus abibat.

## OBSERVATIO LXX.

*Puella quartanaria ulcere digitorum pedis carioso chronico laborans feliciter sanata.*

**O**fferebatur DN. Fr. Cosmæ puella pauper 12. annor. curanda, hæc ulcere chronico digitorum pedis sinistri per quinque annos afflicta, præterea quartanâ à multis septimanis laborabat. Judicans ergo ego, quod sub ulcere cariosa ossicula delitescerent, incisionem præmissio purgante suasi. Fecit id more suo non minus alacriter quam dextrè DN. Fr. Cosmas, & quidem manè illius diei, in quem febrilis paroxysmus incidebat; firmiter igitur calcitrantis horribiliterque clamantis & sub anxietate propriam matrem mordentis puellæ manibus pedibusque ligatis operatio instituebatur, eo quidem faustissimo cum eventu, ut eò ipso die & in posterum quoque febris quartana constanter fugaretur, & ossiculis cariosis exemptis, quæ figura num. 1. punctis suis ostendet, ulcus perfectè clauderetur. Puella alioqui

K post

post ossicula extracta nullâ in ambulando molestia laborat.



*Ad figuram I.*

- A. Incisio prope pollicem pedis.  
B. Incisio prope digitum minimum.



Cavitas est qua 27. ossicula majora & minora exempta, ubique nihil remansit, præter ossicula ad pollicem pedis spectantia.

OBSERVATIO LXXI.

*Sudor immodicus curatus.*

Officialis quidam 36. ann. homo longus nec valde carnosus, cum, post iter Stutgardiam ad nostram urbem peractum, promissum militare officium non adipisceretur, inde animum dejiciens, post profundam tristitiam & magnam sollicitudinem quotidianam febri



febri circa noctem cum magno languore & immodicis sudoribus corripiebatur. Igitur cum febri quidem jam carentem, ast sudore perpetuo noctu diuque cum maximâ virium debilitate & tabescentiâ corporis diffluentem, animoque insuper intime consternatum Dnn. Fr. Misericordiæ susciperent, d. 30. Martii A. 1713. sequentibus curam aggressus sum. Dedi nimirum (1) — ① dulc. c. essent. cort. ① & lign. aloes (2) electuar. ex conserv. rosar. spec. de hyac. corall. pulv. cort. cit. fir. rub. id. ast cum parum sic proficerem, ac die 2. April. oculis concavis sudore ut prius diffluentem cernerem, animo per consolationes erecto, propinabam R. antiphthisicam Garmann. in ∇ plantag. hinc sudori frænum injiciebatur, redibatque d. 3. April. appetitus; ob susurrum tamen aurium secutum, dabam (1) R. ♂ helleb. arcan. ♀ (2) pulv. ex corall. r. conch. lap. ① ① ♂ & pulv. cort. cit. & cum d. 5. de anxietate quadam circa cor & caput quereretur, dedi pulverem alium ex conch. corall. c. cinnab. & ①, tum etiam elix. balsam. Hoffm. his efficiebatur, ut & hæc symptomata recederent, ægerque animolato, vultu pleno, & viribus receptis d. 7. cum prolixis gratiis abiret.



## OBSERVATIO LXXII.

*Hydrops anasarco-ascites cum  
funestis signis ad tempus sublatus, sed  
brevis recurrens.*

**N**E credas facile, si tumorem hydropicum  
sive diureticis, sive purgantibus discus-  
seris, nam quando unum saltem vel alterum  
ex funestis illis symptomatibus, qualia sunt,  
tusis, sitis, febris, & urina rubra crassa, tibi  
*κακῶν* viscerum demonstraverint, frustra  
eris magna sperans de fugato ad tempus, bre-  
vitamen redituro tumore hydropico. Cla-  
rius ejus rei exemplum nunquam vidi, quam  
in cribrario quodam Bohemo. Homo hic  
pauper 36. ann. post potum frigidum æstu-  
anti corpori ingestum, fructus insuper hora-  
rios, caseum, aliaque dyspepta varia ingesta  
febri irregulari correptus, omnique humanâ  
ope destitutus, hydropicus evadebat. Tu-  
mentem igitur crura, femora, scrotum, &  
abdomen, non sine tusi siccâ, dyspnœâ, siti,  
doloreque abdominis, cum apud Dnn. FF.  
Misericordiæ curandum d. 19. Decembr. A.  
1712. susceperem, statim memineram versus  
Ovidiani:

*Helleborum frustra cum jam cutis agra tumebit*

*Poscentes videas, venienti occurrere morbo.*

Interim quod urina adhuc citrina, parcè li-  
cet, prodiret, & pulsus quamvis parvus tardè  
tamen

tamen micaret, videbatur mihi tenuis adhuc aliqua spes hominis restituendi superesse; & sane clysmate ex chamom. sem. carv. herb. gratiol. fenn. c.  $\textcircled{\text{D}}$   $\text{g}$ . &  $\textcircled{\text{Q}}$  pueri aliquoties iterato, purgantibus itidem variis in formâ pulveris, pilularum & electuarii datis, quin semel, cum nausearet & vomituriret, g. guttæ c.  $\text{♀}$  emetico propinato (unde octies *ναύτα* copiosissime dejiciebat) tum diureticis etiam diversis ex rob. ebuli, samb. junip. ciner. bufon. arc.  $\text{♀}$ . arcan. dupl. milleped. aliisque, denique tonicis & anticachecticis id impetrabam, ut effectû copiosâ diuresi, largis dejectionibus, quin sudore etiam ipso, detumescantibus ex toto omnibus partibus d. 8. Februar. A. 1713. omnis hydrops non tantum abigeretur, sed & terribilia illa symptomata, tussis, sitis, dolor abdominis, & respiratio difficilis desineret, alvusque quotidie suum officium faceret. Quanquam igitur omnes effectum medicamentorum stupe- rent, tamen mihi debilitas virium permanens, & quod nullum robur corpori â cibus (quibus jam cum appetitu fruebatur) obtin- geret, aliquid sinistri metumque recidivæ portendere videbatur. Nec fefelli, nam post 14. dies status neutri tussis redibat, cui mox calor p. n. & pulsus p. n. cum uri- nis rubris, & parciorebus, tumorque ab- dominis & reliquarum partium in dies

K 3

auge-

augescens jungebatur : & jam percepi regulam illam practicam , omnis recidiva deterior suâ radice, si ullibi, certè in hydrope valere, nam quicquid molirer , omnia tamen erant frustra, siquidem omnibus funestis dictis symptomatibus invalescentibus d. 26. April. exspirabat. Cæterum dolui, quod impeditus negotiis sectionem cadaveris instituere nequivi.

### OBSERVATIO LXXIII.

#### *Anatome marasmo extincti.*

**V**ir 48. annorum macilenti habitus cum capillis rubris quondam castra secutus, cum â frigore, penuriâ, & quod maximum, â mala suâ Xantippe dira passus esset, post febrem quotidianam in marasum incidebat, cum intertriginositate faucium & obstructione alvi. Destitutus ergo omni humano auxilio â Dnn. FF. Misericordiæ d. 19. April. 1713. suscipiebatur. Quanquam igitur maxima debilitas cum ardore in gutture & strepitu in pectore facile funestam prognosim suppeditarent, præsertim dum profundâ animi ægritudine hominem affligi manifestum esset , tamen fugiens anima medicamentis analeptics & absorbentibus aliquandiu adhuc, & diutius quam Dnn. FF. crediderant, retinebatur. Cum tamen tandem sive præ  
debi-



debilitate, five studio moriendi ore aperto cum siccitate faucium decumbens nil vel ciborum, vel medicamentorum per quinque dies deglutire valeret, vel nollet, & per hos dies crebrò ad □ reddendam, quæ pallida erat & spumosa, stimularetur, d. 6. epilepsia præviâ exspiravit. Sectus maciem ubique ostendebat, adeo nil pinguis visebatur: cartilagines costarum inferiorum quasi ossæ, in œsophago nil præternaturalis deprehendebatur, omentum ferè consumptum, vesicula fellis magna, lien itidem valde magnus, mirandum verò, quod erat in renibus, occurrebat. Hi enim intus & extus varis albis (wie weisse Finnen) magnitudine fermè pisorum confertissimè erant distincti. Reliqua viscera ob festinationem rimari nequibam.

## OBSERVATIO LXXIV.

### *Anatome Phthisici.*

**S**erarii focius, habitus macilenti, capillis rubris, cum diu pressione circa pectus cum dyspnœâ, tussi, raucedine chronicâ & diarrhœâ afflictus esset, in nosodochium Dnn. FF. Misericordiæ d. 1. Junii A. 1713. receptus, post sumta medicamenta quidem raucedinem emendabat, ast reliquis mederi frustra erat; copiosissimâ enim ἀνωμαλία & sudoribus colliquativis summè marcidus



factus ( licet pulsus, quod valde mirum, tardus esset & ad finem vitæ appetitus firmus & ferè nimius perduraret ) succedentibus ultimis morbi diebus artuum lancinationibus & dolore ischiadico ( qui phthificis semper malum præsagium præbent ) post frigus extremorum siti intensissimæ , anxietati summæ, debilitatque extremæ ac tenesmo urinario junctum , d. 11. Julii exspirabat. Sectus emaciatissimus erat, è thorace incisomephitis fœtidissima exhalabat , prodeunte mox in conspectum sero copioso bilioso extravasato cavitatem thoracis inundante , pulmo uterque adnatus, sinister ultra modum: apostemata & cuniculî saniem purulentam plorantes , ubivis magni, inprimis in sinistro lobo, passim etiam scirrhusi nodi, in aortâ & vena cavâ pseudopolypi flavi, hepar maximum satis benè constitutum, lien variis incisuris insignitus & cæruleus, glandulæ mesenterii aliquæ induratæ , intestina passim sphacelata, alibi s. n. omentum & mesenterium pariter sphacelata, uti & muscoli abdominis superni cum peritonæo ob sphacelum nigrescebant. Ob sphacelum sine dubio factum, quod heri externa frigidus intensissimâ siti affligebatur.



## OBSERVATIO LXXV.

*Dolor ischiadicus gravis sanatus.*

**S**ignifer Suecicus Argentorato oriundus 22. ann. temperamenti sanguineo-cholericum, cum in Pomerania A. 1712. victu scorbutico, gravissimoque & diuturno frigore (siquidem in sylvis per multas septimanas hyeme degere coactus fuerat) sanguinem multum corrupisset, artusque valdè afflixisset, initio Augusti A. 1713. in lipothymiam & dolorem ischiadicum fortissimum incidit; dolebat unà dirum in modum caput, auresque strepebant, quod lipothymiâ deprensus in caput ab alto deciderat, (profluente post casum statim sanguine.) Delatus igitur ad Dnn. FF. Misericordiæ ante omnia sacculis ex speciebus cephalico-nervinis & discuti-entibus vino incoctis capitis dolori medebatur, & quidem feliciter, siquidem post sotum hunc statim conticescebat. Urgente verò gravissimo dolore ischiadico, qui ab ischio & lumbis ad genua utraque diffundebatur, & qui ægrum semper decumbere cogebat, & ob diritatem omnem somnum ipsi adimebat, d. 9. Augusti laxante præmisso sanguis ex vena ischiadicâ detrahebatur, quâ celebratâ sumebat (1) mixturam ex essent. fuligin. lignor. castor. (2) pulv. ex cinnab.  $\odot$ ,  $\otimes$ ,  $\sigma$ ,  
K 5 lap.



lap. ☉. (3) pro topico ✓ camphor. c. sapon. venet. & croc. d. 21. â litu paulo dolor mitigabatur, in usu pulverum continuanti hodie loco prioris mixturæ essent. alexipharm. Stahl. lignor. castor. succ. & anod. porrigebatur. D. 14. lumbis impositum emplastr. ex pice & ♁ mixtum. D. 16. dolor â lumbis & ischio abactus, dum verò adhuc circa genua & pedes sæviret, & noctes insomnes essent, ordinavi (1) mixturam antiscorbut. Wedel. cum essent. lignor. remixtam (2) emulsionem hypnoticam. (3) spec. pro infuso theiformi ex herb. veronic. betonicâ, trifolio fibrino, fl. papav. rh. sem. fœnic. inde somnum inibat, dolorque â genibus in pedes decumbebat, crura quæ hisce diebus constanter frigeabant, jam calere sentiebantur; igitur in usu dictorum persistens d. 21. optimè jam ambulare poterat, in sinu gaudens se tam cito â morbo cruciatuum plenissimo liberatum. Quantopere emplastrum de pice & ♁ ischiadicos soletur, & quem factum quibuscvis aliis topicis faciat, plus vice simplici tum in me ipso ante quatuor annos ex ischiade misere decumbente ad divini nominis gloriam, tum in aliis expertus sum. Sanè *Forestus* non in vanum scripsit *lib. 29. Obs. 20. se præsentius remedium post universalia prius adhibita non invenisse, quam ceratum ex pice ☉ & ♁*. Quin *Magnus* etiam

*Wedelius id alicubi in amœnitatibus suis mater.  
med. usum ejus expertus deprædicavit.*

OBSERVATIO LXXVI.

*Ulceræ & maculæ scorbuticæ à  
decubitu in fimo productæ.*

**I**Nstítuebat socius textoris natione Sue-  
vus à febris tertianâ diuturnâ vix libera-  
tus, iter urbem nostram verius; quod igi-  
tur nocte prægressâ, antequam tribus mil-  
liaribus confectis urbem nostram attinge-  
ret, à socio suo vestibus, tibialibus, cal-  
ceis & pileo (solis braccis exceptis) spoliatus  
esset, in suburbium vix admittebatur, quod  
ob metum Viennalis pestilentix hominem  
litteris commendatis quamvis instructum,  
nemo suscipere auderet. Hinc durâ neces-  
sitate compulsus, corpus ferè nudum sub libe-  
rà & intempestâ Octobris finientis aurâ per  
duos dies & noctes fimo immergens, miseriis  
suis Dnn. FF. Misericordiæ permovit, ut mi-  
serum suspitione pestiferi contagii carentem  
d. 4. Novemb. A. 1713. susciperent. Rece-  
ptum ergo his symptomatibus laborantem  
deprehendi; aderant anxietates & dolor circa  
pectus, artus doloribus vagis vexaban-  
tur, in dorso, natibus, cruribus, brachiis,  
& manibus ubivis ulcera comparebant, livi-  
dis & brunnis fervidis maculis cincta, □  
erant variæ, modò lixiviosæ & rubicundæ,  
modò

modo parum tinctæ & tenues: ordinatum ante omnia d. 6. Novemb. infusum ex laxantibus cum hepatico - splenetico - antiscorbuticis mixtum; cumque corpus sic lustratum esset, dabatur quotidie manè & post meridiem mixtura antiscorbut. Wedel. c. essent. trifol. fibr. adhibito insuper infuso theiform. ex rad. helen. herb. fumar. trifol. fibr. beton. veron. anis. fœnic. cost. ver. noctu verò pulvis ex bezoard. ♂. succ. ☉. cinnabar. pulv. lumbricor. Dn. Frat. Cosmas ulcera ▽ & li procurabat. D. 8. sudores copiosi fœtentissimi sinum & pejus quid olentes manabant. D. 11. maculæ minus æstuabant, anxietatesque & dolor pectoris levabantur, dolor tamen artuum vagus & spasmodicus continuabat; cum verò hæmorrhoidum copiosus fluxus accederet, d. 13. ulcera sanabantur, maculæ dissipabantur, nec amplius æstuabant, lancinationes crurum cessabant, & sudorum fœtor desinebat. Hinc d. 15. ab omnibus symptomatibus liberatus, alacris abiit in posterum militem acturus.

## OBSERVATIO LXXVII.

### *Cura & anatome hydropici.*

**J**Uvenis 21. ann. cholericus - sanguineus, initio studiis vacans, & postea scribam agens, post præcipitem potum frigidum per annum spatium malè habuit, lassus inde & ca-



cacheeticus factus; cum autem 4. septimanis pedes & abdomen intumescerent, ad Dnn. FF. Misericordiæ d. 25. Novemb. A. 1713. deportabatur. Deprehendens igitur in hoc agro statim sub ingressu in valetudinarium signa funestissima, quæ erant calor p. n. pulsus frequens, sitis, respiratio difficilis, dolor epigastrii, urinaque pauca, opaca & rubra, quibus facies pallida & inflata, retractioque testiculi sinistri in abdomen jungebantur: præmisso prognostico infusum laxans cum speciebus hepatico-tonicis, deinde arcan. ♀, item potu ex ♂ ♂, ebor. f. Δ. lap. percar. crystall. ♀ ac arcan. dupl. ordinabam. Hinc d. 27. breve gaudium sequebatur, tussi, doloreque abdominis cum ejusdem & crurum sensibili admodum detumescentiâ sequente, insuper facilius respirabat, urinaque minus erat tincta; d. tamen 28. sponte secutis dejectionibus cum *δυσφορία* tumor abdominis non decrescebat, & præterea femorum tumor indurescebat, hinc cum sensim priora symptomata redirent, utut nonnunquam post diuretica propinata abdominis & pedum tumor ferè penitus abigeretur, emaciatissimus post debilitantem diarrhœam summis torminibus stipatam manu penem prehensens d. 17. Decembr. obiit. In demortuo ubivis tumor discussus, & venæ in cruribus transparentes visebantur, penem manu tenebat. *Se-*  
*ctus*

Etus vix incisâ cute abdominis serum puru-  
 lentum ex viridi flavum crassæ consistentiæ  
 emanabat, plurimis magnis frustis puris ei-  
 dem innatantibus, peritonæum erat semipu-  
 tridum, hepar pallidum, quâ parte ad fini-  
 strum latus vergebat adnatum, scirrhis  
 tumoribus ubique eminentibus, passim ex-  
 ternè etiam vomicis obsessum, internè in  
 parte internâ livebat, vesiculâ fellis discissâ  
 atrabilis instar rob. sambuci spissâ, & adeo te-  
 nax, ut instar glutinis distraheretur, oc-  
 currebat, lien magnus per medium di-  
 visus, densior, glandulæ in mesenterio passim  
 purulentæ, intestina hinc & inde semicorru-  
 pta, renes bini ad miraculum magni (einer  
 Spanne lang und fast einer Faust dicke /) ex-  
 terius & interius per totum ferè albicantes, in  
 internâ abdominis parte pus copiosum in  
 frustis fœdissimum & fœtentissimum merge-  
 batur, cor parvum cum sanguine in dextro  
 cordis ventriculo grumoso, vasa coronaria  
 turgidissima, sanguine atro plena, longus &  
 densus polypus in venâ arteriosâ, lobus dex-  
 ter pulmonis penitus adnatus vomicis & pure  
 scatebat, valde cuniculosus, sinistri vero lobi  
 quod omnes stupebant, ne quidem ullum ve-  
 stigium deprehendebatur. Cætera non pos-  
 sum quin hîc historiam cujusdam hydropici  
 Felsburgii apud Dnn. FF. Misericordiæ mor-  
 tui, ex ore Dn. Fr. Cosmæ recenseam. Iste  
 nimi-

nimirum ex ingurgitatione vini recentis crassifi, & esu copioso carnis suillæ in hydropem incidens, â tumore ad tempus liberatus fuerat, postquam ê vesicula in crure ortâ serum exstillans abdomen & artus depleisset, interim quod acrimonie feri corrosivitate suâ omnes carnes, vasa, & nervos in crure erose rat, & consumferat, sic ut vix pauculum carnis in surâ remaneret, æger ob dolores & iterum repullulantem tumorem tamen occubuit.

## OBSERVATIO LXXVIII.

*Tumor scirrhusus ex palpebra  
enatus & oculum operiens feliciter excisus.*

**A.** 1713. d. 17. Julii clinicis apud Dnn. FF. Misericordiæ decumbentibus adscribebatur juvenis rusticus 25. ann. Hic falsis acidisque lubentissimè & frequentissimè fruitus, cum diu de capitis dolore questus esset, tandem μετάστασις criticâ is solvebatur, postquam ante 13. septimanas ê palpebræ superioribus sinistræ parte interiori tumor excrecere inciperet, qui sensim auctus & jam justi digiti crassitie, & sèmi digiti longitudine ab uno oculi cantho ad alterum exporrectus totum oculum obtegebat, digito pressus scirrhusus deprehendebatur, coloris erat



erat rubicundi & figuræ subglobosæ in conum infra oculum excurrentis, circa nasum quoque & superius labium tumor aliquis duriusculus occurrebat, palpebræ tumori coævus. Ut igitur corpus sectioni peragendæ præpararem, infusum concinnavi ex rad. polypod. herb. fumar. fol. fenn. rhabarb. fibr. helleb. n. anis. fœnic. ☉ ♀. V. S. celebravi, & scarificationes institui, insuper pilulis cephalicis corpus denuò purgavi, postea ordinatis etiam tum pulveribus ex absorbentibus c. ☿ ☽. ☿. ☿. puro, cum ☉ l. sassaf. tum mixturâ, ex ☿ cochlear. essent. trifol. fibr. succ. lignor. item infus. theiform. ex rad. bardan. sassap. valerian. chin. herb. beton. trifol. fibr. veron. sem. fœnic. & rasur. l. sassaf. His quamvis per aliquot dies æger uteretur, tamen tumor notabatur augescere, aliique novi noduli carnosii in palpebrâ oriebantur; proinde cum non nisi excisione tumor auferri posset, illa d. 26. Julii decernebatur, quæ itaque sic instituebatur: Alligabatur ægri caput, manus, & pedes perticæ, ut immobilis sic jacere cogeretur; postea unguento de lithargyrio loco defensivi caput linebatur: hinc tumor filo trajiciebatur, ut manu apprehendi & detineri posset, postea dexterrima Dn. Fr. Cosmæ manu excisio fiebat, residuæque partes cauterio adurebantur, oculus albumine ovi cum ▽ rosar. conquassato defendebatur.

Quia

Quia tamen cauterii vis ignea nihilominus ophthalmiam oculo induxerat, ipsi collyrio ex Calc. viv. ▽ rofar. chelidon. major. sacch. ꝥ & tut. medicabar, â quo etiam intra paucos dies perfecte discutiebatur. Operatione sic chirurgicâ operculo oculi feliciter ablato, æger postmodum acutè & optimè cernebat. Quia vero sanato oculo febris tertiana superveniebat, commorandum adhuc erat ægro ad d. 18. Aug. quo nosodochio valedicebat. At tumorem labii per vices dolorem punctorium sentientis tollendum, lamina plumbea ad modulum, quem figura G H H ostendit, efformata parabatur; hujus finibus perforatis filum trajiciebatur, quod retro aures colligatum laminam continebat, ne â labio quod ipsi immittebatur decideret. Itaque per multas septimanas constanter diu & interdium hâc laminâ labium comprimens, tandem feliciter tumorem discuti deprehendit. Ast quia in oculi dextri palpebræ inferioris internâ parte similis tumor latus pediculo innixus excresceret d.

14. April. A. 1714. eadem chirurgiâ  
pariter felicissimè sublatus est.



*Ad figuram II.*

- A. Excreſcentia carnoſa ex palpebræ ſiniſtræ ſuperioris internâ parte enata.
- B. Excreſcentia carnoſa palpebræ dextræ inferioris.
- C. Pertica cum tribus foraminibus.

D.E.F.





D.E.F. Tria foramina cum duplici vinculo ad  
vincienda firmiter caput, manus & pedes.  
G. Lamina plumbea pro labio cum vinculis  
H. H. retro aures alliganda.

## OBSERVATIO LXXIX.

*Ulcus callosum repullulans saliv-  
atione curatum.*

**N**ON satis admirari potest aquæ metallicæ  
manus non madefacientis penetrans ef-  
ficacia. Fundit enim humorum coagula, &  
lentitiam feri attenuat, præ omnibus aliis,  
mæandrisque glandularum & vasorum se in-  
sinuat, qui reliquis inaccessi deprehendeban-  
tur. Hinc optandum esset, ne tantopere me-  
dici salivationem formidarent, frustra enim  
metuunt, quod ☿ & ☉bus scorbuticis arreptis  
in Anti corrosivitatem exacuatur. Siquidem  
teste *Stablio in dissertat. de Salivatione* ☿ li aliis  
præter luem veneream morbis rebellibus exstirpandis  
pari §. 29. nec ☿ ☉. nisi concentratissimus ☿ dis-  
solvit, nec ipsum ☉ ☉ nisi gradu caloris eximio ☿  
propemodum fervido adjuvetur, ☿ aggreditur; jam  
vero qui humores etiam maximè vitiati ad tantam  
acrimoniam evehi possent, ut causticam ☉ ☉ in do-  
lem æquarent. Proinde has chimæras non re-  
formidans, in quodam à Cancellis Cæsareis  
in ulcera calloso & ostracoso, quod alia phar-  
maca ipsasque exsectiones respuebat, ipsam  
L 2 cum

cum summo effectu institui. Casus est sequens. Æger iste 34. ann. temperamenti sanguineo-cholericus, cum quondam castra per aliquot annos secutus, sedentaria vitæ (qualem degunt, qui à cancellis sunt) deinceps se emancipasset, circa collum tumorem glandulosum duriusculum, postea exulceratum incurrit, quo sanato, super claviculam aliud ulcus magnum, nummi imperialis magnitudine, emerfit; quod igitur à multo tempore plurimum chirurgorum consilia inefficacia expertus esset, tandem mense Septembri A. 1713. Dn. Fr. Cosmæ therapix, me conscio, se submittebat. Hic ulcus partim insperione croci metallor. partim cultello (quo egregiè callositates & steatomatosas excrescentias excindebat) aggressus, in vanum tamen per aliquot dies laborabat, dum ceu hydra Lernæa resectum quod erat, brevi iterum repullularet. Hinc duro nodo durum cuneum applicaturus salivationem proponebam homini, si ulcus excipias, reliqua sanissimo: annuebat is pronè. Proinde cum corpus purgante & decocto lignorum præparassem, salivationem cum ʒ d. ita instituebam, ut per gradus scandens, interdum etiam vacans, ʒ d. extract. fumar. excepti fere ʒß insumerem, non omisso decocto lignorum secundario, ut moris est, pro potu ordinario. His efficiebatur, ut salivatione vix per triduum cœptâ ulceris emen-

emendatio statim sentiretur, quâ indies promotâ, in vicinîâ tamen ulceris tubercula glandulosa se extollebant, exoriebanturque item alia circa collum & faciem, procedente salivatione nihilominus disjecta. Quia igitur ulcus sub finem salivationis per quatuor fere septimanas durantis, optimè consolidatum cernebatur, & omnia tubercula auxilio simul emplastri & lis disjecta essent, (nisi quod unum pertinaciâ suâ sub maxillâ confisteret) sanum ægrum, institutâ prius purgatione, d. 4. Novembris poteram dimittere. Cæterum miratus sum salivationem alioqui dentibus, gingivis & faucibus molestias non leves affricantem, iisdem ne minimam quidem noxam aut molestiam attulisse, sudabat insuper egregiè & diuresis larga procedebat.

## OBSERVATIO LXXX.

### *Ophthalmia pertinax cecitatem minitans evicta.*

**J**Uvenis 19. annor. cocturæ cerevisiæ vacans, plethoricus & carnosus, faciei rubræ, â pueris defluxionibus oculorum frequentibus laborans, & semel brevem ophthalmiam passus, cum antè septem septimanas eodem morbo corripereetur, V. S. tunc purgans, & verificatorium adhibuit, ast inconstanti cum effectu, siquidem paulò post iterum uterque ocu-

L. 3                      lus



lus ophthalmiam patiebatur, cum cephalalgia, effluxu lacrymarum, & fugâ lucis. Quia igitur valde carnosus esset, cum pulsu magno & pleno d. 9. Decemb. A. 1713. (quo anno & sequente etiam ob pluvias creberrimas & ventos multos ophthalmiæ epidemicæ grassabantur) iterum V. S. in pede apud Dnn. FF. Misericordiæ præcipiebam, readhibito quoq; vesicatorio, præter interne datam (1) mixturam ex ess. lignor. succ. l. al. ʒʒo fassaf. (2) pulv. cachect. cinnab. Wedel. c. ʒʒo fassaf. His adhibitis d. 13. oculum unum jam aperire poterat, & cephalalgia carebat; pilulis cephalicis hodie corpus lustrabam, instillatum deinceps collyrium ex ∇ rosar. chelid. maj. sacch. h. & tut. D. 16. vesicatorium multum ichoris proliciebat; quia vero jam sub introitu valetudinarij unus oculus macula (ein Blümchen) laboraret, instillabatur (1) ∇ rosar. c. ⊕ cypr. quod collyrium ē vestigio aliud ex ∇ rosar. cum sacch. h. excipiebat; his efficiebatur, ut illacrymantes oculi ficcarentur; interim dum sequentibus diebus prius collyrium c. ⊕ cypr. paratum nimis urere sentiret d. 20. aliud ex ∇ rosar. chelid. maj. c. croc. metall. edulc. & sacch. h. substituebam, non neglecto etiam usu mixturæ ex essent. lignor. succ. castor. & pulv. ex bezoard. ♂, cinnab. lap. ♀ & succ. Quamvis igitur collyrii nuperrimi applicatione (quo melius se juvatum, quam

â prio-

â prioribus sentiebat) & reliquorum dictorum usu d. 23. dolor, rubor, & lacryma cessarent, (licet lucem nondum oculi ferrent) imò d. 27. utroque oculo optimè cerneret, tamen ingruentibus d. 29. multis pluviis, aëreque ventis turbato *ρευματισμός* iterum in oculum sinistrum irruebat, cum hemicraniâ simul ejusdem lateris. Proinde denuò vesicatorium prope aurem sinistram applicabatur, quo, (præter adhibitam (1) mixturam ex essent. succ. lignor. l. al. (2) specific. cephal. (3) collyrium ex  $\nabla$  chelid. maj. rosar. c. croc. metall. edulc. sacch.  $\hbar$  & gr. j. camphor.) obtinebatur, ut d. 1. Jan. ophthalmia iterum fermè penitus fugaretur, quamvis oculo sinistro valde parum cerneret: cui proinde pingued. viperin. medicari conabar, â quâ tamen oculo instillatâ is magis dolere incipiebat, interim simul mox cum levamine capitis multum muci ê faucibus delabebatur, quem pituitæ defluxum ut juvarem, ægrum mastich. cubeb. & foenic. masticare jubebam; inde (adhibitis præsertim etiam internè aliis prædictis) sinister oculus ita emendabatur, ut eodem benè cerneret. D. 8. dextrum hætenus sanum oculum ophthalmia iterum cum hemicraniâ dextri lateris affligebat. Pertinaci proinde affectui debellando, pilulis cephalicis denuò præmissis, fonticulus in brachio dextro exculpebatur; lymphæ quoque alterandæ de-

coctum lignor. c. fœnic. ordinabatur, cui ultimis diebus fol. fenn. simul adjiciebam : ast quod parum sic proficerem, d. 17. Jan. ad festaceum, manu Dn. Fr. Cosmæ auxiliante, deveniebam, quo glutinosa materia instar terebinthinæ proliciebatur, qualem etiam fonticulus præbebat ; effectus hinc erat quidem exoptatus, interim quod oculi nihilominus adhuc subinde laborarent, & dulcem prioribus pulveribus adjeci, infusumque theiformo ex rad. valerian. helen. pimpin. herb. nepeth. hyssop. beton. trifol. fibr. sem. fœnic. præter pulverem cachect. Wedel. sassafrat. ad tempus propinavi, & d. 14. tertiâ vice pilulis cephalicis corpus purgavi ; his & setacei, fonticuliq; continuato usu id obtinebatur, ut d. 14. Febr. materia â setaceo & fonticulo manans è glutinosâ tenuior redderetur, adeoque æger post iterata collyria, venæsectionemque, & purgans porro repetitum, (ne roborantium aliorum denuò mentionem faciam) d. 8. Martii oculis sanis redditis valetudinario quidem valedicere posset, non tamen, quod metuebat, opificio suo valedicere cogeretur. Sub abitum sedulò suasi usum solennem scarificationum & V.S. ante æquinoctia, purgantia itidem circa eadem & frequentia pediluvia.



OBSERVATIO LXXXI.

*Fistula thoracis & ulcus in cavitatem illius penetrans sanatum.*

**S**istebatur curandus Dnn. FF. Misericordiæ d. 14. Jun. A. 1713. capillamentorum fabri socius, 26. annor. temperamenti cholericco-sanguinei. Hic postquam ante 14. septimanas ebrius inter pocula post rixam ortam in adversarium involasset, ab illo prostratus, ita pugnis & calce innitentis unâ pectori suo genibus adversarii exceptus fuerat, ut gravis contusio & fractura costæ in dextrâ pectoris parte emergeret, quâ neglectâ, vel parum peritè tractatâ, ( siquidem demum post aliquot dies effluxos V. S. celebraverat) fistula successit, quæ deinceps studio chirurgi cujusdam nostræ urbis commissâ in vanum per aliquot septimanas medicata fuerat. Cum igitur status ægri insanabilis videretur, d. 14. Jun. mecum Dn. Fr. Cosmas consulebatur. Et sanè utrique obstupuimus cernentes ægri non solum pectoris musculos fistulis exesos, sed & pectus pollicis fermè crassitie in cavitatem usque thoracis perforatum, ad quod foramen pulmo lychnum admotum efflans sub inspiratione appropinquabat, & per quod sanies cruento-purulenta è cavitate thoracis emanabat. Quamvis itaque nulla curationis spes

arrideret , præsertim dum æger pulsum frequentem , & calorem hecticum dyspnœamq; cum tussi , ( qua modo cruento - purulenta , modo viscida emoliebantur ) sisteret , interim quia adhuc juvenis erat sub divinæ gratiæ adjumento credentes satius esse aliquot auxilium experiri , quàm nullum , curationem tentavimus. Proinde ordinabatur (1) elix. pect. propriet. f. + essent. ttavmat. Wedel. c. bals.  $\Delta$  anis. & bals. peruv. (2) pulvis ex lap.  $\Theta$ .  $\delta$  d. cinnab. c. balsamo - sacch peruvian. (3) infusum theif. ex rad. plantag. helen. glycirrh. herb. tusfilag. scabios. heder. terr. veron. fl. hyper. fœnic. anis. (4) injectio pro cavitate thoracis ex decocto veron. scord. mel. rosar. & bals. peruv. in vitello ovi solut. (5) injectio in fistulas ex decoct. sabin. veron. scord. aloë , myrrh. &  $\nabla$  Calc. viv. His adhibitis d. 17. cum ex foramine pectoris copiosa fanies efflueret , & una fistula alteri communicaret , d. 18. sectio cum syringotomo instituta fuit , aliaque d. 20. iterata est. D. 25. denudò alia fistula discindebatur. D. 26. tusfiebat minus , & liberior respirabat. D. 28. pro potu ordinario potio parabatur ex passul. minor.  $\mathfrak{H}\beta$ . rasur. C. C.  $\mathfrak{z}$ ij. santal. rub.  $\mathfrak{z}$ j. herb. veron. tusfilag. heder. terr.  $\tilde{a}$  mj. coquæ in  $\mathfrak{H}\mathfrak{x}$ ij. ad vj. in fine addatur Calc. viv.  $\mathfrak{H}\beta$ . inde filtretur , d. 1. Julii intus & extus bals. Locatell. adhibebatur , tussis decrefcebat , cum faciliori respi-



respiratione, additâ decocto radice symphyti, porrigebantur pulveres, ex pulv. pect. bals. c. sperm. cet. lap.  $\mathfrak{G}$ . cumque d. 10. sanguinem spueret, dabatur (1) pulv. ex lap.  $\mathfrak{G}$ . corall. conch.  $\textcircled{\text{O}}$ . cinnab. (2) decoct. ex rad. plantag. glycirrh. millefol. tusfilag. & passul. (3) essent. travmat. & scord. D. 12. sputum sanguinis cessabat, ast quia sudor nocturnus sequeretur, omisâ cinnabari, pulv. priori spec. de hyac. addidi: fistulis turundæ ex lino carpto,  $\curvearrowright$  matricali tinctæ immittebantur. Hâc ratione itaque in usu dictorum internorum, & externorum pergendo, (quamvis subinde mixturæ internæ modò  $\curvearrowright$   $\ominus$  \* anis. cum bals.  $\triangle$  anis. adderetur, modò demeretur) satis commodè degebat, ita ut d. 26. ex pectore nullus amplius nec flatus, nec pus exiret, ægerq; citra tussim facile respiraret, & quamvis per vias tussis respiratioq; difficilis, item sudores nimii redirent, & pus postliminio aliquando, nempe d. 29. è thorace prodiret, tamen in usu dictorum continuando id divinâ gratiâ efficiebatur, ut d. 16. August. foramen thoracis tuto pulvere ex sarcocoll. olibani, & hæmatite claudi posset. Quia verò fistulis quibusdam balsamo vulnerario solidatis, aliæ duæ per curvaturam sibi invicem communicabant, ob metum ægri, qui jam toties sectionem sustinuerat, conabamur unguento ægyptiaco ad soliditatem cocto & croco metallo-

rum



rum adperso, ac utrique harum fistularum orificio alte immisso callum absumere; & sane procedebat opus, quo usque unguentum liquefactum pertingere poterat; ast quia infundum septica vis non penetrabat, adeoque adhuc callositas remanebat, ultima fistula d. 19. Aug. syringotomo discissa est, callusq; ita ablatus, ut deinceps postquam turundis matricali & tandem balsamo vulnerario imbutis fistulæ impletæ essent, consolidatio sensim promoveretur (non omisis linteis compressis sinui applicatis) quæ plenè d. 16. Oct. contigit. Et sic æger fistulis, & foramine thoracis ritè clausis, tusq; & dyspnœa carens vegetus & hilaris d. 18. Oct. nosocomium reliquit.



*Ad figuram III.*

- a. Foramen in pectoris cavitatem penetrans.
- B. Fistula ab a ad claviculam usque pertinens.
- C. Costa fracta.
- D. Fistula ad axillam dextram tendens.
- E. Sinus sanie purulenta repletus.
- F. Fistula quæ syringotomo incisa usq; ad a.
- G. Duplex fistula syringotomo incisa usq; ad a.
- G. Alia fistula syringotomo incisa usque ad F.
- H. Fistula syringotomo incisa usque ad F.

OBSERVATIO LXXXII.

*Palpitatio cordis magna.*

**I**mplorabat auxilium Dnn. FF. Misericordix d. 1. Januar. A. 1714. Juvenis 18. ann. faciei rubræ & quondam creberrima hæmorrhagia narium affectus. Hic ê Silesiâ oriundus, postquam patrem suum ê rustico militem factum in Italiam secutus, victuque militari, imprimis verò frequenter olere acido sustentatus fuisset, ne plura duram militiam stipantia incommoda allegemus, ante  $\frac{1}{2}$  annum in tam fortem perpetuamque palpitationem cordis incidit, ut cor per intervalla (quod quotidie sæpius contingebat) fortius quas-

quassatum manum aliorum firmè appositam  
 repercuteret. Jungebatur huic affectui, quan-  
 do exacerbabatur, anxietas magna, phlogosis  
 vaga, lancinationesque brachii, & quiddam  
 spasmodici circa caput, aderant quoque mur-  
 mura abdominis. Si validius paulo cor vi-  
 braretur, necessum ipsi erat, sive stanti, sive  
 decumbenti, baculo pectori appposito illud  
 ipsum fulcire, quo subsidio quoque egebat,  
 dum cibum caperet, alias enim os saliva re-  
 plebatur, lancinatioque brachiorum & palpi-  
 tatio cordis magis invalescebat, quæ omnia  
 hac ratione mitigabantur, repulso quamvis  
 sæpe à quassato corde appposito baculo. Ut  
 igitur cruditates emolirentur, ante omnia da-  
 batur potio laxativa, ex ▽ laxativ. Vienn. c.  
 spec. dia ♀. Myns. &c. postea venæsectio in-  
 stituebatur in brachio. D. 3. status idem, or-  
 dinabam hinc (1) R. ♂. temperat. Wedel. (2)  
 pulv. absorbent. ejusdem. (3) potionem ex  
 ▽ meliss. rub. id. fl. naph. cinn. c.v. sir. rub. id.  
 (4) sacculum ex meliss. serpill. fl. ros. ras. sand.  
 fl. irroratum ▽ meliss. —sa & apoplect. d. 5.  
 nulla adhuc mutatio: R. ♂. temperatæ ⊖ vo-  
 lat. o. f. c. R. ♀ mixtum surrogabatur, cum  
 reliquis continuari jussum. D. 8. jam solum  
 noctu cor palpitabat, non amplius interdiu.  
 Flatibus & murmuribus essentia carminat.  
 Wed. ⊖ volat. o. f. o. maritata opponebatur,  
 pulveres amplius commendati. D. 10. jam  
 pax,



pax, noctu quoque mitior palpitatio notabatur: ob nauseam nondum desinentem, datus hodie & in sequentes dies, pulvis cachect. cinnabar. & stomachal. Wed. ā. c. ʒo mac. manè, â meridiè R  $\text{Ⓢ}$   $\text{Ⓢ}$ , noctu mixtura præcedens. D. 13. (ut soleo nosodochium hebdomatim bis alternis diebus, semel post duos dies invisere) ægrum accedens, audio heri copiosè nares cruentasse, remittente hinc statim rubore faciei nimio, jamque vix amplius cor noctu palpitabat; insuper etiam nausea & dolores cessabant. Cum igitur per duos dies immunis ab affectu molestissimo degeret, dimittebatur d. 16. acceptis pro viatico pulveribus aliquot ex specif. cephal. Michaël. c. stomachico - carminat. & mixturâ ex essent. carminat. c.  $\text{Ⓢ}$  volat. ʒo f. remixtâ, jussus quotannis ante æquinoctia V. S. & laxationem instituere.

### OBSERVATIO LXXXIII.

#### *Hemicrania pertinax setaceo evicta.*

**E**Quiso Serenissimi cujusdam Principis, acidorum, salforum,  $\text{V}$ , fumitabaci, immoderato & diuturno abusui, inter aëris quotidianas injurias deditissimus, sanguineum laticem ita corruerat, ut tandem hemicraniam gravissimam lateris dextri, unâ cum  
oph.

ophthalmiâ ad suppurationem tendente cum oculi destructione reportaret : ab hac cum per tres septimanas nocte dieque incessanter excruciatuſ eſſet, penes Dnn. FF. Miſericordiæ auxilium d. 24. Martii A. 1714. quærebat. Animadvertens ergo alvum ſub hoc gravi dolore ſemper eſſe ſtypticam, ut nunquam ferè ſponte ſe ſolveret, clyſmatibus, infuſis laxativis, tandem etiam pilulis cephalicis, plus vice ſimplici illam ſtimulavi, & è maſſa ſanguineâ eque capite viſcido - acrem lympham eduxi, quodque â pilulis imprimis ſubinde aliquod levamen ſentiretur, eas ultra quatuor vices in uſum adſcivi; utque revulſioni ſanguinis amplius proſpicerem, ſtatim initio V. S. in pede, item crebra pediluvia (præſertim dum sæpe pedes & crura algebant) inſtitui, non omiſſis etiam abſorbentibus, diaphoreticis, reſolventibus, diluentibus, emulſivis, paregoricis, & quæ non aliis, tam internè, quam externè applicatis. Cumque his parum imo nihil proficeretur, (è quibus tamen pediluvia, & pro capitis fotu decoctum nigrum Chir. ſenſibile aliquod juvamen afferebant) maturè ad veſicatorium deſcendi, quo impoſito, & pilulis cephalicis cum clyſmate ſedulo adhibitis, id efficiebatur, ut jam per intervalla ſolùm, & levius dolor accederet, inprimis poſtquam d. 2. April. multum ſeri è naribus efflueret; utilem quo-

quoque effectum circa illud tempus fortiebatur, â fotu c. VINO, ex rad. pœon. irid. flor. rôsmar. serpill. fl. sambuc. papav. rhead. chamom. & lavend. c. ras. l. fassaf. inde enim d. 14. dolor fermè ex toto cessabat, fluente tum per nares copiosâ falsâ ferosâ materiâ. Ast cum deinceps tortura dolorum solùm inducias ægro concederet, (quas continuans per aliquot dies fluxus falsæ ferosæ materiæ, quæ d. 11. April. pruritu capitis excipiebatur, effecerat) post denuò hisce diebus in usum tractos clysteres, pilulas, fotum, & pediluvia, tandem d. 16. (quo die iterum valde quiritabatur,) ad setaceum deveni, & quidem eo cum successu, ut dolor inde penitus cessaret: ulcere igitur per plusculos dies tractu aperto servato, æger d. 21. perfectè & constanter restitutus lætus abibat.

#### OBSERVATIO LXXXIV.

*Febris maligna comatosa feliciter curata.*

**A**Drepebat verius, quam ingrediebatur, præ languore vix stare valens, interim benevolâ commiseratione Dnn. FF. Misericordiæ susceptus socius pileorum fabri 18. ann. d. 5. Januar. A. 1714. Hic quamvis in sextum diem continuè p.n. calebat, Suidnicio tamen, sub nebuloso, ventoso & humido aëris statu, huc concesserat: sitiebat valde, tremebant manus, pavebatque, & quod pessimum,





mum, quicquid moliretur, somnolentiam  
 non poterat à se depellere: hoc igitur ægri  
 statu, protinus excitationi naturæ oppressæ &  
 torpidæ vesicatoriis ad nucham, carpos, & fe-  
 mora appositis invigilabam, internè ordina-  
 tis, & commodo tempore administrandis (1)  
 mixtur. ex ess. alexiph. Stahl. & mixt. simpl.  
 (2) pulv. ex ꝑ d. lap. ☿. C.C. ☉. c. cinnabar.  
 & camph. (3) denique decocto scorzon. c.  
 C.C. cit. c. fir. rub. id. D. 8. ægrum invisens,  
 deprehendi adhuc soporosum cum linguâ  
 fuscâ, siccitate cutis, ☐ que involuntariâ ex-  
 cretione; pergebatur in dictorum medica-  
 mentorum usu, nisi quod gargarisma c. ☉  
 adderetur, & pulv. bez. major. Wed. c. ☉ &  
 camph. priori pulveri substitueretur. D. 10.  
 non amplius ita soporosus visebatur, vesica-  
 toriis benè effluxum feri maligni promoven-  
 tibus, unde ad plures adhuc dies imponeban-  
 tur; lingua emendata, mador aderat cutis,  
 tus siebat & facilius respirabat, ☐ heri missa  
 crassam per totum liquorem suspensionem  
 exhibebat, in priorum usu sic continuabatur,  
 nisi quod etiam scord. card. b. veron. & sca-  
 bios. pro infuso theiform. adjungerem. D. 13.  
 sopore nondum penitus cessante, guttulis ex  
 mixt. simpl. c. liqu. C.C. maritatâ, & pulvere  
 ex lap. ☿. ꝑ d. c. cinnab. ☉. morbo obvius  
 ibam, reliquis, & inter hæc vesicatoriis, non  
 neglectis: in ☐ iterum signa coctionis vise-  
 bantur. D. 15. ἐνφωγία maxima, alacris erat,  
 sopor

sopor abactus, pulsus tardus, madebat, ☐ turbabatur. Horum ergo remediorum usui insistens, interjectis aliquot diebus elix. balsamic. Hoffm. stomachali Wedel. mixto viribus ventriculi & spirituum prospiciebam. D. 24. cum in brachiis prope vesicatoria tubercula ulcerosa orirentur, ea mixt. simpl. c. essent. lignor. maritatâ, & pulvere ex ꝑ ꝑ c. cinnabar. lap. ☉. & spin. viper. constante ac per triduum repetito discussi; cumque vires jam usum laxantis permitterent, Sydenhamii potione leniter corpus expiavi, & ita, cruribus prius dolentibus & quasi contractis linimento nervino Wedel. roboratis, ægrum sanum & vegetum dimisi.

## OBSERVATIO LXXXV.

### *Insignis vesicatoriorum in febre malignâ virtus.*

**Q**Uantum momentum vesicatoria ad therapiam febrium malignarum conferant, ex hac observatione iterum clarum reddetur. Famulus A. R. Dn. P. Vicarii chirurgus simul, & Pharmacopœo nosodochii ministrare solitus, 16. ann. temperamenti sanguineo-chole-  
lerici, faciei prærubræ, hypochondriacus, præmaturè fatis ante duos annos hæmorrhoidalem tenesmum & fluxum, insuper non raro hæmorrhagiam narium, stuporem auricularum, torpores artuum cum sensu frigoris, febrimque tertianam plus vice simplici ex-

pertus, cum rerum suarum satagens, socio aurifabri (qui febris malignâ in itinere sub ventoso frigidoque aëris statu inito ante plures dies correptus, inque nosodochium Dnn.FF. Misericordiæ susceptus fuerat, & cui magna virium prostratio, animus dejectus, & alia prava signa statim mortem portendebant) lethalter decumbenti sedulo vesicatoria applicando (sub quibus exulcerata caro nigrescebat) lectumque sternendo ministraret, eo heri demortuo d. 19. Jan. A. 1714. post punctiones vagas artuum, inappetens, sitiens, & languens, cum vertigine subinde horripilabat; cum ergo susceptum contagium formidarem, statim alexipharmaca ordinavi, nihilominus d. 20. cephalalgia vesperti incrementa, Dnn. FF. (quia antea post V. S. levatum senserant) me absente V. S. instituerunt, cruore ex venâ floridissimo, non tamen sine ἐκλυσσι, extracto, quod factum d. 21. nosodochium ingressus ægrè ferens ægrum offendebam hodie minus caput dolentem, qui tamen circa pectus, maxime verò in artubus punctiones vagas sentiebat; pulsus cæteroqui erat fortis & æqualis, sitis modica, alvus aperta. Hinc præscripsi (1) essent. alexiph. Stahl.c. essent. scord. (2) pulv. ex lap. ☿. mandib. luc. & d. ♄. sigill. nitr. cinnab. (3) decoctum scorz. C.C. citr. sir. rub. id. acet. cit. (4) emulsion. extern. c. nitr. & pro capite. D. 22. lancinationes vagæ artuum continuabant, mixt. simpl. ess. alexiph. miscebatur & ve-





& vesicatoria ad femora applicabantur. D. 23. dolor capitis cessabat, melius paulo maderat, nisi quod circa pectus pressio. D. 25. & 26. valdè languebat ut se erigere nequiret, continuabant artuum lancinationes vagæ, perre-  
ctum in usu dictorum. D. 27. dormivit quidem paulò, ast animus dejectus, pauca loquebatur, facies inflata, oculi quasi ebriosorum, (glâsèr nostrates dicunt) stupor in brachiis, summè debilis, ut immobilis jacere cogere-  
tur, urina turbida, spes in angusto. Hoc itaq; rerum statu vesicatorium in nuchâ applicare jubeo, non neglectis (1) potione confortante, c.  $\Theta$ . volat.  $\text{ss}$  f. (2) pulv. ex serpentar. Virgin.  $\text{ss}$  d. lap.  $\text{ss}$ .  $\text{①}$  & camph. (3)  $\mathcal{R}$ . bezoard. Wed. essent. alexipharm. Stahl. & liqu. C.C. succ. D. 28. copiosa narium hæmorrhagia secuta, quam Dnn. FF.  $\mathcal{R}$ . violar. moderari conati fue-  
rant, à quâ tamen valde levatum se sensit. D. 29. medicamentis dictis continuatum, nisi quod liqu. C.C. succ. demeretur. D. 30. tolerabilis status, pulsus & respiratio melior,  $\square$  tur-  
bida. D. 3. Febr. accedente obauditione pul-  
veri cinnab. adjiciebatur; inde sequentibus diebus magis magisque convalescens, d. 10. extra lectum jam degere poterat, sic ut non solum d. 14.  $\nabla$ . laxativ. Vienn. c. sir. rosar. sol. ferret, sed etiam d. 24. ob faciem subtumidam pulvere laxativo vegetab. *καθαρσις* tentari posset: dato dein elix. balsam. Hoffm. essent. centaur. min. absinth. & ad sopiendam d. 3.

Mart. diarrhœam vires appetitumq; deſicientem. elix. ſtomach. c. eſſent. theriac. inde plenè convaluit, vires tamen priores non ante ſeptem ſeptimanas colligens. Maniſteſtum eſt ex dictis (quod etiam Dnn. FF. in obſervandis aliàs morborum phænomenis & eventis cati expertique obſervatores unanimiter confirmabant) ægrum mortem probabiliffimè non evaſurum fuiſſe, niſi d. 27. Jan. veſicatorio in nuchâ poſito torpor naturæ ampliùs excitatus fuiſſet. Notabile erat inſuper, nunquam ſudorem, ſed lenem ſolùm & quidem rarum madorem eſſe deprehenſum: forte quod ſanguis extractus & per nares quoq; effluens ex mente Celeb. Stahlî parum diaphoreſi & ſudationi comodus eſt; interim quia poſtea pariter eodem morbo ægrum graviter decumbentem poſt V. S. & hæmorrhagiam nihilominus copioſis ſudoribus madentem cernerem, dubius hæreo, an ſanguinis eductiones excretionibus periphericis adeo maniſteſte officere cœant. Cæterum tam huic, quam aliis ægris ſimul petechiis laborantibus, quia circumſtantiæ ſuadebant, feliciter quoque veſicatoria applicavi.

## OBSERVATIO LXXXVI.

*Anatome carie offis femoris de-*  
*mortui.*

**S**ervus ruſtici 32. ann. temperamenti melancholico-cholerici, cum ante annum femori

mori erysipelate obfesso pingua illineret, ulcus produxit rebelle & contumax, quamvis chirurgorum diligentiam deludens. Nosodochio igitur Dnn. FF. Misericordiæ d. 16. April. A. 1714. illatus, cum DN. Fr. Cosmas ex ulcere dilatato ossicula tredecim veluti è bursâ quâdam extraheret, cum levamine aliquo doloris exquisitissimi, mihi suspicio nascebatur, protrussisse fortassis naturam ossicula femoris cariota separata in quandam aliquam efformatam cavitatem. Utut igitur nullis nec pharmaceuticis, nec chirurgicis auxiliis parceretur, tamen post gravissimas torturas dolorum, (quibus semel vel bis epilepsia jungebatur) æstum p. n. tormina insignia ventris, vomitum, & inprimis pertinacem diarrhœam, facie flavescentes, pedesque tumens, exhaustis tot tormentis d. 3. Junii moriebatur. Cadaver, cujus crura, femora, & hypochondrium dextrum undique latis lividis maculis post mortem distinguebatur, sectum, viscera sistebat à p. n. constitutione penitus fermè libera, nisi quod vesicula fellea ovi anserini fermè magnitudinem adæquaret, & bile ad crepaturam quasi turgentissima conspiceretur, quæ diapedesi pancreas tinxerat. Scrutatum vero ulcus femoris fistulosum, os femoris offerebat, duplici loco ad tres digitos transversos erosum, cujus medium intervallum ab erosione liberum cernebatur. Ast exemptum mirandum spectaculum præbebat, siquidem sollicita natura ita



undique cavitatem erosi ossis solidâ carne repleverat, quasi arte quadam latera ossis carne obducta fuissent, es waren die ausgefresne Theile des Hüftten-Beines von unten biß oben mit Fleisch recht ausgefüttert.

## OBSERVATIO LXXXVII.

*Anatome febris inflammatoriâ extincti.*

**I**Nferebatur nosodochio Dnn. FF. Misericordiæ d. 4. Apr. A. 1714. juvenis Illustrissimæ cuidam Comitissæ â servitiis nobilioribus, 17. ann. faciei rubræ & temperamenti sanguineomelancholici. Hic ante octo annos â jactu in hypochondrium sinistrum mense Aprili facto, dolorem ibi magnum senserat, qui per vi-ces mustitans, tamen quolibet anno recurrente annuo periodo exacerbabatur, donec ante 14. dies iterum fortiter recrudescens, insuper â septem diebus febrim cum horrificatione & æstu alternante adscisceret. Quod igitur p. u. sum debilem offenderem & □ crassa albicans cum dysuriâ proflueret, statim conjeci abscessum subesse in abdomine, febrimque lethalem futuram; idque inprimis eò facilius conjectabar, quod dolorum faces tantæ essent, ut continuo cum magnâ virium debilitate ejulari cogeretur. Conjecturâ meâ proinde non fallente, ægroque post copiosum materiæ nigræ vomitum d. 7. April. moriente, ex voluntate Illustrissimæ

fimæ Comitissæ in præsentia D. D. Eggerdes  
 fautoris mei honorandi & D. D. Rölchen/ cada-  
 ver aperiebatur: hoc ipsum abdominis externas  
 venas viventes exhibens dum secaretur pulmo-  
 nes sanguine atro referti, cum hytaticibus ali-  
 quot occurrebant, intestina omnia nigra vise-  
 bantur, lien magnus cum incisuris itidem livi-  
 dus, omentum brunnum fermè consumtum,  
 hepar brunnum, cum tuberculis nodosis, reni-  
 bus verò indagatis, ii horrendam mephitim spi-  
 rantes per totum ulceribus fistulosis griseum  
 pus fundentibus scatebant.

### OBSERVATIO LXXXVIII.

#### *Anatome hydropici post quarta- nam facti.*

**S**Abaudus 22. ann. muscipularum institor,  
 post vitam miserè toleratam, in quartanam  
 cum dolore abdominis, & tumore pedum inci-  
 dit, facie & toto corpore æthiopem referens. A  
 Dnn. FF. Misericordiæ susceptus quanquam  
 exitum funestum statim præfagirem, therapiam  
 tamen miseri aggressus sum, libentius & felicius  
 id facturus, si ob dialectum ejus corruptam  
 (quam Itali elegantiores ipsi non satis capie-  
 bant) eundem plenius intelligere potuissem.  
 Interim tantum ex ore ægri, ejusque gestibus  
 capiebam, se febris jam irregulari laborare, cui  
 dolor in abdomine, in primis circa regionem he-  
 patis, amarities oris, lancinationesq; genu jun-  
 gantur. Ordinatis igitur variis vomitoriis, asari-

nis, laxantibus, aperientibus, pituitamq; & acidum corrigentibus, id effeci â d. 13. Jan. 1714. ut post fœtidissimam saburram expurgatam aliqua melioratio se ostentaret, fugato cum febris colore illo totius atrescente. Interim dum voracitas inexplibilis (cui frustra ☉ ☿ p.d. obviam ibam) cum debilitate virium tantâ, ut lectum deferere non posset, non desineret, iterum febrim irregularem, dolorem hypochondrii dextri, genuum, pedumque dolorem incurrit, quibus postea & femorum, pectorisque cum tussi, & oculorum dolor accessit. Cum verò sensim vires & habitus corporis per copiosos sudores, vomitus diarrhœam fœtentissimam, hæmorrhagiamq; narium exhauriretur, (quibus omnibus præsentibus appetitus tamen esurius nihilominus persistebat) facies & pedes denuò tumesceri cœperunt, quo tumore unâ cum magnis abdominis doloribus, imprimis circa hypochondrium dextrum, crescente, vomitibusq; fœtidissimis denuò ortis, ægroque iterum æthiopem referre incipiente, post appetitum prostratum præviis horrendis contorsionibus & tandem epilepsia d. 30. April. expiravit. Sectus dum thorax aperiretur, en mirandum, non solum ichor aquosus, sed & intestina instar cretæ fermè albida & flatibus turgentia erumpebant, quod diaphragma alte sursum ad nudum thoracem angustum fecerat, pulmones etiam penitus ex omni parte adnati cernebantur, cum hydatidibus & tuberculis scirrhis, aderant quoq; in interiori substan-





stantiâ aliquæ parvæ vomicæ, cor benè constitutum, (unde pulsus semper fortis erat) abdomen maximam copiam feri fœtidi continebat, hepar magnum lienem contingens, undiq; lividisimum, lien valdè magnus penitus ex atro lividus, vesicula felle bile vitellinâ plena, quæ transudans pylorum intimè tinxerat, unde perpetua querela de hypochondrii dextri dolore, ventriculus magnus & benè constitutus, renes valde parvi, contracti, scirrhusi, in sinistro pelvis substantia grumosa & solida visebatur obstructa, vesica admodum parva.

### OBSERVATIO LXXXIX.

*Ulceræ pedum cariosa feliciter curata.*

**A**fferebat pauper fœmina puerum suum d. 9. Maj. A. 1714. Dn. Fr. Cosmæ curandum. Is ann. 9. habitusq; macilenti, diu pædarthrocace laboraverat, ut ob dolorum sævitiam parentes non semel ipsi mortem apprecarentur. Interim quod fama attulerat, aliquot ejusmodi ulceribus chronicis desperatis laborantes industriâ DN. Fr. Cosmæ convaluisse, & hæc pauper fœmina fortunam in suo filio experiri statuebat. Quamvis igitur ulcus cariosum pollicem pedis dextri occuparet, & alia plura (prout figura ostendit) pedem sinistrum exederent, tamen DN. Fr. Cosmas non penitus desperandum ratus, curam aggrediebatur. Proinde cum meo consilio corpus operationi præparatum, & puer sequen-

quentibus, nempe (1) pulvere purgante ex pulv. lax. veget. c. ☿ d. (2) mixt. ex ess. lign. ⚭. (3) pulveribus aliquot ex bez. ♂. conch. lap. ☿. (4) decocto ex rad. scrophul. farsæp. ras. CC. in ▽ Calc. viv. facto, tum etiam ⚭ ⚭. puro aliquoties usus esset, Deo juvante curationem ita aggressus est, ut ulcera angusta partim turundis ex rad. gentianæ vel spongiâ compressâ dilataret, partim incideret, ossiculaq; cariota deinceps abrasione, ☉ caryoph. applicatione, ustione, vel denique exemptione corrigeret aut tolleret, cavumq; ulcerum tam injectionibus, quam plumaceolis ~ matricali madidis impleteret. Quod verò suavis meo succus cochleariæ internè datus præ aliis medicamentis scorbuticam hujus ægri massæ sanguineæ labem optimè correxisset, efflorescentibus ab ejus usu undique maculis flavis, & insuper *Solingen* cariota ejusmodi ulcera non alio quam succi cochleariæ auxilio feliciter consolidasset, DN. Fr. etiam externè hunc succum ulceribus instillare satagebat; nec carebat nocentamen successu, nam, quod mirandum, efflorescentibus similibus maculis, quales in cute se exhibuerant, in ulceribus, horum consolidatio ita hujus succi adminiculo accelerabatur, ut finiente Augusto plurima ulcera clauderentur, & unum adhuc restans, vel alterum, post turundas unguento quodam ex melle ros. tereb. mast. myrrh. ~ matric. & ☉ hyp. concinnato illitas ulceribusque immixtas Sept. sanesceret. Ubi notandum, puerum post ulcera solidata initio

ope

ope baculi ingredientem, Sept. medio jam citra illum ambulare paulo cœpisse, carnesque, quæ locum ossium exemtorum adimplebant, duriusculas & densiores evasisse.





*Ad figuram IV.*

- A. Incisio facta in pollice pedis dextri, cum  
exemtione ossis cariosi â B. usque ad C.  
D. Incisio facta in pedis sinistri parte externa.  
E. Fistula ab E ad D.  
F. Fistula ab F ad D.  
F. iterum alia fistula ab F. ad G. per ambi-  
tum pedis  
G. Fistula usque ad E.  
H. Fistula per profundum pedis penetrans â  
parte interna H. ad partem externam D.  
I. Fistula minus profunda.  
K. Ulcus digiti pedis penultimi ê quo ossa  
exemta ab L. usque ad M.



Cavitas ê qua osficula exemta, quo loco  
nil remansit præter particulam ossis  
calcanei.

OBSERVATIO XC.

*Ulcus fistulosum thoracis sanatum.*

**A** Uriga Illustrissimi cujusdam Comititis 28.  
ann. olim quartanâ per  $1\frac{3}{4}$  ann. laborans,  
jam ab aliquot septimanis tumorem durum sub  
axillâ dextrâ ad pectus exporrectum alebat,  
quo oriente V. S. instituerat. In nosodochium  
igitur Dnn. FF. Misericordiæ d. 23. Maji A. 1714.  
susceptus, initio tentabam tumoris discus-  
sionem imposito emplastro diaphoret. Myns.  $\text{ᝑ}$  &  
 $\text{ᝑᝑ}$   $\text{ᝑ}$  fœtid. roborato, interius vero datâ (1)  $\text{R}$   $\text{ᝑ}$   
acri



acri (2)  $\Delta$   $\S$  puri gr. jx. c. lap. perc. pro 3. dosibus  
 (3) infus. theiform. ex rad. aristoloch.  $\odot$ . pimp.  
 bardan. herb. trifol. fibr. cerefol. sem. anis. fœnic.  
 Quanquam igitur  $\hat{a}$   $\Delta$   $\S$ . non vomeret, sed effu-  
 sisime sudaret, adeo ut lodices permadesce-  
 rent, tamen discussio vana erat, unde matura-  
 tio promovebatur imposito emplast. diachyl. c.  
 g. cum desuper imposito cataplasmate ex cep.  
 sapon. Venet. & croc. Maturatione sic sufficien-  
 te d. 30. ulcus aperiebatur,  $\hat{e}$  quo cum remis-  
 sione dolorum copiosum pus effluebat; ne proin-  
 de sinus orirentur, post injectum liquorem ex  
 $\nabla$  Calc. viv. c. absinth. centaur. min. scord. aloë  
 myrrh. mell. rosar. cui  $\sim$  matricalis mixtus, lin-  
 tea compressa circa fundum ulceris appone-  
 bantur: pro usu interno dedi ob tussim præsen-  
 tem (1)  $\mathcal{R}$ . bezoard. Wed. c. essent. travmat. ejusd.  
 scord. c. bals.  $\Delta$  anis. (2) chaquerill. c. pulv. pect.  
 bals. & lap.  $\odot$ . (3) infus. theiform. ex rad. glycirh.  
 aristol.  $\odot$ . herb. scabios. veron. tusilag. fl. papav.  
 rh. anis. fœnic. c. butyr. rub. potab. D. 2. Junii Fi-  
 stula ab axilla ad claviculam ferè pertingebat,  
 unius fere & dimidii digiti longitudine; ob fe-  
 bris vulnerariæ accessum ordinabatur (1) essent.  
 alexiph. Stahl. c. essent. travmat. bals.  $\Delta$  anis. (2)  
 pulv. ex  $\S$  d. lap.  $\odot$ . conch. chaquerill. D. 4. ha-  
 ctenus insomnis benè dormivit, nec horror nec  
 æstus rediit; fistulæ balsamum Locatelli inje-  
 ctum. D. 6. bona spes, pruriebat circa fundum fi-  
 stulæ exterius cutis,  $\Delta$   $\S$  pur. c. lap. percar. alter-  
 nis diebus dandum ordinabatur. D. 7. incisio-  
 ne

ne fistula paulo dilatata. D.9. incipiebat consolidari, redibat appetitus, maculis lividis in brachio lateris affecti heri exortis purpura pruriens succedebat, sine dubio â pure in massam sanguineam resorpto, & per poros dein expulso; unâ DN. Fr. Cosmas observaverat, quam primùm maculæ & purpura cœperat efflorescere, pus antea copiosum statim ê fistula sensibilibiter valde paucum prodiisse, hinc cum eadem turtundis unguento ex terebinth. mel. ros. mast. ~ matrical. & ʒ hyperic. composito imbutis porro expleretur, d. 11. fistula ferè sanata comperiebatur, purpura per pectus & abdomen etiam erumpebat; datâ deinceps ess. fulig. lignor. succ. scord. item pulv. ex ʒ ʒ. lap. ʒ. succ. fl. ʒ. chaquerill. d. 13. optimè, quamvis purpura adhuc duraret, exiitque post tres dies perfectè sanus.

## OBSERVATIO XCI.

*Otalgia cum auditus difficultate,  
potissimum scarificatione in vertice sublata.*

**P**OSTILIO 23. ann. ab injuriis aëris non parum læsus, & ante annum ab equo dejectus, cum d. 26. Febr. A. 1714. in nosocomium Dnn. FF. Misericordiæ admissus, quarto quovis die se horrere & calere diceret, cum punctionibus dextræ pleuræ, tusi & difficultate auditus auris sinistræ; ordinabatur (1) ess. fulig. (2) pulv. ex ʒ d. lap. ʒ. chaquerill. cinnab. mandib. luc. c. ʒ (3) infus. theiform. ex rad. helen. glycirrh. herb. heder. terr. veron. tusfilag. scabios. fl. papav. rh. & litus



litus ✓ camph.roc. D. 28. febris carebat, leviusq; circa pectus degebat; data hodie essent. alexiph. Stahl. succ. l. aloës, interim magnæ punctiones circa thoracis & abdominis latus dextrum quandoq; redibant: unde V.S. in brachio celebrabatur, è quâ sanguis mucum potius quam cruorem referens effluebat. D. 3. Martii dabatur (1) ess. alexiph. Stahl. (2) pulv. ex Ⓞ arc. dupl. cinnab. lap. ☉. 8 d. præter infusum theif. ex herb. bet. veron. trif. fibr. c. anif. & fœnic. quibus usurpatis, imprimis post V.S. dolorifica thoracis symptomata penitus cessabant, neutiquam vero auditus emendabatur: pro hoc ergo dabam (1) R. ♂. helleb. volat. & pulv. cach. Wed. cinnab. sassaf. quibus medicamentis d. 7. specif. cephal. c. ☉. sassaf. & mixt. ex elix. cephal. ess. succ. l. al. surrogabatur; ast nullo cum effectu, status enim auris potius deterior fiebat. Hinc quia strepitu auris accedente, sanies quoq; ex aure frustra que pituitæ è naso excernerentur, purgans (quod citius libenter dedissem,) è mp. de succ. Crat. & cephal. ac post illud pulveres & mixtura diei 7. porrigebantur, præter sacch. canar. c. cubeb. pro errhin. Quamvis igitur decies deijceret, & cætera benè haberet, tamen status auris idem perdurabat, imo d. 10. horripilabat, dolore auris aucto. Otalgia proin cum strepitu & difficultate auditus nil quicquam cedente, placuit ægro, (qui patrem suum eadem olim passum sola scarificatione in vertice, & capitiluvio cum melissâ

N

facto

facto convaluisset affirmabat) consentire, ita tamen, ut prius adhuc sanguis e pede extraheretur; quâ celebrata & usurpata adhuc essentia fulig. (cujus efficaciam in se deprehenderat) d. 17. factâ in vertice scarificatione, ab eo tempore statim strepitu & punctionibus auris caruit, audiebatque d. 19. melius, cumque d. 24. strepitus & tinnitus solum adhuc restaret, dato liquor. C. C. succ. c. R. bez. Wed. integrè restitutus d. 26. sanus nosodochium reliquit.

## OBSERVATIO XCII.

### *Phthisici pueri anatome.*

**P**uer pauper 9. ann. in orphanotrophio Dnn. PP. Societatis Jesu sustentatus, ulceribus quondam & nupero autumnio febris laborans, eâ fortasse usu, vel potius abusu, corticis peruviani maturius sublatâ, vel suppressâ, tumore pedum œdematoso correptus est, cum atrophîâ, dyspnœâ, & tandem diarrhœâ. Cum igitur hæc symptomata cum debilitate magnâ virium continuarent, statim subsumi poterat, non diu apud Dnn. FF. Misericordiæ ipsum clinicum futurum, ad hos enim d. 11. Maj. A. 1714. delatus, die 15. moriebatur. Sectus thorax lympham extravasatam copiosam offerebat, cor flaccidum, pulmones alicubi tuberculis crudis distincti erant, tum etiam hydatidibus, quales hydatides copiosissimæ in intestinis & mesenterio occurrebant: comperiebatur quoq; conjectura mea in eo non sefellisse, quod

quod glandulas in mesenterio induratas me inventurum credideram: conspiciebantur enim tam in illo, quam intestinis ubivis, quàm copiosissimæ glandulæ magnæ & induratæ, quarum quædam ex unâ parte lividæ alterâ candidæ erant, è dissecctis succus induratus partim ater, partim semigypsius exprimebatur hepar & lien s.n. constituta erant, nisi quod bilis transfudando intestinum tinxerat, vesicula bilis magna erat, bile vitellinâ turgens, lien & renes naturaliter constituti, vesica crassa valdè contracta.

### OBSERVATIO XCIII.

*Ulceræ crurum antiqua dyssepulotica chirurgia feliciter curata.*

**A**Ntiquissimam & efficacissimam illam medicinæ therapeuticæ partem, chirurgiam tum ab aliis, tum magno Severino tam fortiter, quam feliciter exercitam (ita ut iudicio Marii Schipani hujus subsidio unus Severinus ex incurabilibus curabiles morbos effecerit) dum sæpe penes me mirabar, dolebam tamen simul, quod Germanis nostris â Severino objecta mollities (quâ omnes ferme ægri, & maxima etiam pars medicorum laborat) magnum illud obstaculum sit, quo minus vel ex imperitiâ artis, vel meticulositate puerili tot monstra medica (quæ aliàs â generosis auxiliis chirurgicis debellata fuissent) â pharmacis efficaciam ferri & ignis non assequeantibus do-



mari non possint. Sane fœdum est cernere, quam sæpè medicus & chirurgus trepidet, ulcera non discindere, sed solum dilatare coactus; Ast quis facile videt scalpello sinus & fistulas discindi, aut altis plagis ulcera dysepulota tractari. Quid igitur deinceps miremur, si post tot emplastrationes & delibutiones ac injectiones scalpello parcentes & igne, tot ulcera corrumpimus & insanabilia reddimus. Quo loco mihi non possum temperare, quin cujusdam meorum ægrorum (Generosus is erat quidam Eques) meminiscam: Vexabat illum diu fistula ani, ex quâ in febres pronus erat, & in cachexiam inclinabat; consultus ego meticulousum ægrum mentione factâ incisionis ita deterrebam, ut deinceps cuidam chirurgo suaviori injectionum methodo (qua fistulam expugnare somniabat,) se ipsum sanaturum promittenti vacivas aures præberet. Accidit interim bonâ fortunâ, ut curâ non procedente iter Viennam ingrediendum esset. Ibi nactus expertissimum quendam Medicum vanitate pharmacorum compertâ facile ejus hortatui se subjecit, incisioneque tunc peractâ, non solum â fistulâ, sed & statu cachectico ita vindicatus est, ut jam sanissimus mihi hæc cum gaudio retulerit. Certè optandum esset, ut tandem Severino effic. medic. fol. 77. crederemus, quando scribit: ego mala ulcera curans scalpello non peperci, perpetuumque inde & magnum fructum percepi; ego profectò secutus



tus partim Vidium Florentinum, â Severino fol. 76. a. allegatum, qui ulceribus livore vallis cutem crebris incisuris circum exasperat, ut cruor niger & crassus educatur, & bonus succedat, partim ipsum Severinum, qui ibidem præcipit, ut ne differas providus ulceribus aut cacoëthis, aut herpeticis, callosis, aut ostracosis, aut circumglabris, aut pruriginosis, aut intemperatis & tetris & his omnino, quæ cicatricem difficile admittunt, his quippe omnibus admirabile compertum est exinanitus auxilium, quod & Ægyptii medici experiëntiâ docti, factitare feliciter consuevere, quemadmodum adnotavit Prosper Alp. lib. 3. Med. Æg. c. 11. id consecutus sum quod isti magni chirurgiæ procures, ut nempe ulcera antiqua & dysepulota postea facile solidarentur. Nimirum cum Eques quidam cæsareus 30. ann. ex refrigeratione inferiorum, (quod circa festum St. Martini in paludosis locis permultos dies laborare coactus esset,) faciente etiam multum huc reliquo pravo victu durâq; diætâ militari, in ulcera furarum incideret, quæ dura atq; livore stipata hætenus per annum frustra medicata fuerant: Id ego perspicuiens ordinato prius (1) purgante & spec. dia ♀ Myns. c. ̄ d. (2) R ̄ c. Calc. viv. (3) Δ ̄ c. spin. viper. (4) dec. lign. ulcera postea κατὰ σκευὸν undiq; profundis incisuris cultello incisorio factis DN. Fr. Cosmas suavis meo exasperabat: ex vulneribus ater crassus sanguis proliciebatur,

cumq; postea labia callosa excisione absum-  
sisset, datis postea insuper aliquibus internis  
medicamentis post duas septimanas ulceribus  
solidatis & livore penitus discusso lætus abibat.

## OBSERVATIO XCIV.

### *Rheumatismus universalis.*

**Q**Uantum in continuatione medicamen-  
torum indicationibus suis congruorum  
fitum sit, ostendit pluribus celeberr. Hoffm. in  
dissert. de prudenti medicamentorum conti-  
nuatione. Certe quamvis multa sunt, quæ me-  
dici sua agere volentis diligentiam infructuo-  
sam reddunt, non facile tamen ille magis sine  
suo in sanando ægro frustrabitur, quam si is  
vel nimis obsequiosus precibus ægri (qui sa-  
nus prius varietate ciborum delectari solitus,  
ægrotus quoq; variis medicamentis in diem  
quin horas quasi mutatis curari gestit) morem  
gerat, vel mutabili ingenio ipse præditus, ad  
quemvis ingressum ad infirmos aliud semper  
medicamentum præscribat. Hinc axiomati  
illi, quod pauca medicum nobilitent, omninò  
mos gerendus est, studendumque, ut acquisi-  
tis generosis remediis, id quod morbo præci-  
puè quadrare experimur, debitâ continuatio-  
ne suum effectum plenè adipiscatur. Gra-  
tulari hâc in re sibi poterunt medici nosodo-  
chiis præfecti, imprimis vero nosocomiis or-  
dinis A.A.R.R.F.F. Misericordiæ præpositi: a-  
pud hos enim sicut ex medici ordinarii judi-  
cio





cio Pharmacopolium iis instruitur remediis, quæ maxime efficacia novit, ita tenentur etiam ægri non alia quam quæ medicus ordinavit sumere, nec medicus cogitur mollitie decumbentium ita morem gerere, ut à salutaris continuatione medicamentorum desistat. In pluribus igitur ægris apud Dnn. FF. Misericordix decumbentibus salutarem continuationem medicamentorum multoties expertus, eandem quoque Sartoris socio valde salubrem deprehendi. Hic ipse enim è Marchiâ oriundus 28. ann. temperamenti sanguineo-cholerici, postquam in Prusfiâ & Poloniâ falsis, muriatis, infumatisq; cibis & carnibus, tum quoque piscibus exsiccatis diu fruitus esset, olim sæpe odondalgia excruciat, prægressâ aliquoties ebrietate, rheumatismo ita torquebatur, ut nulli articuli essent, qui non eadem excruciantur, imo nec caput à dolore, nec pectus & abdomen à punctiōibus liberum erat, adeoque æger instar stipitis decumbere cogebatur, cum ☐ spissis, rubicundo-brunnis, pulsuq; forti & celeri. Dato igitur ante omnia infuso laxante c. fol. fenn. & crysall. ☐ postea ex dextro brachio sanguis, vel potius mucus glutinosus extrahebatur, tali cum effectu, ut statim digitos manus dextræ parum contrahere valeret; injungebatur postea usus sequentium remediorum, nimirum primò, mane mixtur. simpl. c. ess. castor. & desuper infus. theif ex beton. veron. trifol. fibr. (2) à meridie

℞ ♂ cyd. c. arcan. ♀. (3) noctu pulv. ex ♂ ♂,  
 cinnab. ☉, lap. ☿. (4) emulsio ex amygd. d. c.  
 sem. 4. frig. toto die imprimis noctu admini-  
 strabatur. His efficiebatur, ut d. 8. Aug. A. 1714.  
 susceptus æger d. 11. jam manus & pedes pau-  
 lò movere valeret, ☐que hodie minus rube-  
 ret; cumq; â V. S. in brachio institutâ tanto-  
 pere levatus esset, non tam ad preces ipsius,  
 quam quod robur pulsus & varicosa venarum  
 brachii distentio repetitionem venæsectionis  
 urgerent, eandem quoq; d. 11. in brachio fini-  
 stro instituebam, loco prioris mixturæ & pul-  
 verum, in usum hodie & sequentibus diebus  
 adscitâ mixturâ ex essent. lumbricor. compos.  
 Hoffm. & pulv. concinnato ex bez. ♂. succ. lap.  
 ☿. cinnab. & ☉ emulsione & infuso theiformi  
 non neglecto. D. 13. magnum juvamen  
 hinc secutum, dolore maximam partem ca-  
 rens jam vegetè in lecto artus movebat, post  
 efflorescentem prurientem purpuram, (quæ  
 per aliquot sequentes dies durabat) ☐que te-  
 nuiolem & statui s. n. propriorem factam; li-  
 nimento postea nervino Wed. articuli ampli-  
 us roborati. Hoc facto sub continuatione præ-  
 dictorum remediorum sanus, salvus & ala-  
 cris d. 21. cum magnâ gratiarum actione (quæ  
 imprimis summæ causæ Deo debeantur) quod  
 ipsum tam cito â torturâ dolorum libera-  
 verim, è valetudinario egredie-  
 batur.

F I N I S.







Handwritten text in the bottom left corner:  
Handwritten: *Handwritten*  
*Handwritten*  
*Handwritten*  
*Handwritten*



